PCT/JP 99/04518 23.08.99

日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT 09/76330 = REC'D 0 8 OCT 1999

JP9914518

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1998年 8月21日

出 願 番 号 Application Number:

平成10年特許願第236169号

出 額 人 Applicant (s):


麒麟麦酒株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年 9月24日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

P98-0472

【提出日】

平成10年 8月21日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

A01K

【発明の名称】

ヒト染色体を保持し子孫伝達する非ヒト動物

【請求項の数】

76

【発明者】

【住所又は居所】

群馬県高崎市宮原町3番地 麒麟麦酒株式会社 医薬探

索研究所内

【氏名】

富塚 一磨

【発明者】

【住所又は居所】

群馬県高崎市宮原町3番地 麒麟麦酒株式会社 医薬探

索研究所内

【氏名】

吉田 均

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県相模原市北里1-15-1 北里大学理学部生

物科学科内

【氏名】

花岡 和則

【発明者】

【住所又は居所】

鳥取県米子市西町86 鳥取大学医学部生命科学科内

【氏名】

押村 光雄

【発明者】

【住所又は居所】

群馬県高崎市宮原町3番地 麒麟麦酒株式会社 医薬探

索研究所内

【氏名】

石田 功

【特許出願人】

【識別番号】

000253503

【氏名又は名称】

麒麟麦酒株式会社



【代理人】

【識別番号】

100091096

【弁理士】

【氏名又は名称】 平木 祐輔

【選任した代理人】

【識別番号】

100096183

【弁理士】

【氏名又は名称】 石井 貞次

【選任した代理人】

【識別番号】 100096121

【弁理士】

【氏名又は名称】 間山 世津子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015244

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809317

【プルーフの要否】

要

14-10 2001

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 ヒト染色体を保持し子孫伝達する非ヒト動物 【特許請求の範囲】

【請求項1】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、キメラ非ヒト動物の作製法。

【請求項2】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する細胞の作製方法。

【請求項3】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片が670kbを越える請求項1または2記載の方法。

【請求項4】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片が1Mb(百万塩基対)以上である請求項3記載の方法。

【請求項5】 外来染色体あるいはその断片が抗体をコードする領域を含む ものである請求項1または2記載の方法。

【請求項6】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルが、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞とミクロセル形成能の高い細胞とを融合させて作製されたハイブリッド細胞から誘導されたものである請求項1または2記載の方法。

【請求項7】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルが、前記ハイブリッド細胞から誘導されたミクロセルをさらにミクロセル形成能の高い細胞と融合させて作製された細胞から誘導されたものである請求項6記載の方法。

【請求項8】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞が ヒト正常2倍体細胞である請求項6記載の方法。 【請求項9】 ミクロセル形成能の高い細胞がマウスA9細胞である請求項6~8のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】 分化多能性を保持する細胞が、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚性生殖細胞およびそれらの変異体から成る群より選択されるものである請求項1または2記載の方法。

【請求項11】 外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞がその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されているものである請求項1または2記載の方法。

【請求項12】 外来染色体あるいはその断片が少なくとも2種の目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞がその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されているものである請求項11記載の方法。

【請求項13】 分化多能性を保持する細胞において、前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されている請求項11記載の方法。

【請求項14】 前記目的の遺伝子が抗体遺伝子である請求項11記載の方法。

【請求項15】 前記抗体遺伝子が抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子である請求項14記載の方法。

【請求項16】 外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、その外来染色体あるいはその断片上の前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞に、該目的の遺伝子を含む外来染色体あるいはその断片を移入した後、該細胞と前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物の胚とのキメラを作製する請求項1記載の方法。

【請求項17】 前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物が標的遺伝子相同組み換え法により作製されたものである請求項16記載の方法。

【請求項18】 キメラ非ヒト動物が、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現し、該外来染色体あるいはその断片を子孫に伝達可能なものである請求項1記載の方法。

【請求項19】 キメラ非ヒト動物が哺乳動物である請求項1記載の方法。

【請求項20】 哺乳動物がマウスである請求項19記載の方法。

【請求項21】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む分化 多能性を保持する細胞。

【請求項22】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片が670k bを越える請求項21記載の細胞。

【請求項23】 外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞においてはその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている請求項21記載の細胞。

【請求項24】 外来染色体あるいはその断片が少なくとも2種の目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞においてはその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている請求項23記載の細胞。

【請求項25】 分化多能性を保持する細胞において、前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されている請求項23記載の細胞。

【請求項26】 前記外来染色体あるいはその断片が抗体遺伝子を含むものである請求項21記載の細胞。

【請求項27】 前記抗体遺伝子が抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子である請求項26記載の細胞。

【請求項28】 分化多能性を保持する細胞が、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚性生殖細胞およびそれらの変異体から成る群より選択されるものである請求項21記載の細胞。

【請求項29】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、 該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物、または 、前記の単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫。

【請求項30】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片が670kbを越える請求項29記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項31】 外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている請求項29記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項32】 外来染色体あるいはその断片が少なくとも2種の目的の遺伝子を含むものであり、該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている請求項31記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項33】 前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されている請求項31記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項34】 前記目的の遺伝子が抗体遺伝子である請求項31記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項35】 前記抗体遺伝子が抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子である請求項34記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫。

【請求項36】 請求項29記載のキメラ非ヒト動物またはその子孫の交配により得られる単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する非ヒト動物、または、単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫。

【請求項37】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、 該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する請求項29記載のキメラ非 ヒト動物もしくはその子孫または請求項36記載の非ヒト動物もしくはその子孫 を、該遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物と交 配させることにより作製された非ヒト動物、または、前記の単一もしくは複数の 外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝 子を発現するその子孫。 【請求項38】 請求項29記載のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、請求項36記載の非ヒト動物もしくはその子孫、または請求項37記載の非ヒト動物もしくはその子孫に由来する組織。

【請求項39】 請求項29記載のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、請求項36記載の非ヒト動物もしくはその子孫、または請求項37記載の非ヒト動物もしくはその子孫に由来する細胞。

【請求項40】 B細胞である請求項39記載の細胞。

【請求項41】 請求項40記載の細胞とミエローマ細胞との融合により作製されたハイブリドーマ。

【請求項42】 請求項29記載のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、請求項36記載の非ヒト動物もしくはその子孫、または請求項37記載の非ヒト動物もしくはその子孫の個体、組織または細胞において、単一または複数の外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現させ、その産物としての生物学的に活性な物質を回収することを特徴とする、生物学的に活性な物質の製造法。

【請求項43】 キメラ非ヒト動物の細胞がB細胞である請求項42記載の方法。

【請求項44】 B細胞がミエローマ細胞と融合して、不死化されている請求項43記載の方法。

【請求項45】 生物学的に活性な物質が抗体である請求項42記載の方法

【請求項46】 抗体が哺乳動物の抗体である請求項45記載の方法。

【請求項47】 哺乳動物の抗体がヒト抗体である請求項46記載の方法。

【請求項48】 請求項42記載の方法により製造できる生物学的に活性な物質。

【請求項49】 670kbを越えるヒト抗体遺伝子の少なくとも一つを保持し、発現する非ヒト動物。

【請求項50】 1Mb以上のヒト抗体遺伝子の少なくとも一つを保持し、 発現する請求項49記載の非ヒト動物。

【請求項51】 ヒト抗体遺伝子が、ヒト重鎖遺伝子、ヒト軽鎖 κ 遺伝子、ヒト軽鎖 λ 遺伝子およびそれらの組み合わせから成る群より選択される請求項49記載の非ヒト動物。

【請求項52】 そのヒト抗体遺伝子と同じあるいは相同の非ヒト動物抗体 遺伝子が欠損している請求項49記載の非ヒト動物。

【請求項53】 そのヒト抗体遺伝子と同じあるいは相同の非ヒト動物抗体遺伝子の欠損が、遺伝子相同組換えによる該非ヒト動物抗体遺伝子の破壊によるものである請求項52記載の非ヒト動物。

【請求項54】 請求項49記載の非ヒト動物の脾臓細胞とミエローマ細胞との融合により得られるハイブリドーマ。

【請求項55】 請求項54記載のハイブリドーマにより産生される抗体。

【請求項56】 ヒト抗体の少なくとも一つのクラスまたはサブクラスを発現する非ヒト動物。

【請求項57】 発現するヒト抗体のクラスまたはサブクラスの遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している請求項56記載の非ヒト動物。

【請求項58】 ヒト抗体のクラスまたはサブクラスが、IgM、IgG、IgE、IgA、IgDおよびそれらのサブクラス、ならびにそれらの組み合わせから選択される請求項56記載の非ヒト動物。

【請求項59】 670kbを越える単一または複数の外来DNAを保持し、該外来DNA上の遺伝子を発現する非ヒト動物。

【請求項60】 発現する外来DNA上の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している請求項59記載の非ヒト動物。

【請求項61】 1Mb以上の単一または複数の外来DNAを保持し、該外来DNA上の遺伝子を発現する請求項59記載の非ヒト動物。

【請求項62】 発現する外来DNA上の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している請求項61記載の非ヒト動物。

【請求項63】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を胚盤胞に由来する培養細胞へ移入し、該細胞の核を除核し

た未受精卵に移植することを特徴とする、トランスジェニック非ヒト動物の作製 法。

【請求項64】 少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞。

【請求項65】 少なくとも2種の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されている請求項64記載の細胞。

【請求項66】 破壊されている内因性遺伝子が抗体遺伝子である請求項64記載の細胞。

【請求項67】 破壊されている抗体遺伝子が抗体重鎖遺伝子および抗体軽 鎖遺伝子である請求項66記載の細胞。

【請求項68】 分化多能性を保持する細胞が、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚性生殖細胞およびそれらの変異体から成る群より選択されるものである請求項64記載の細胞。

【請求項69】 少なくとも2回の相同組換えにより、請求項64記載の細胞を作製する方法。

【請求項70】 薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより分化多能性を保持する細胞の内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊し、該細胞を該薬剤の存在下で培養し、薬剤耐性となった株を選択し、これらの株をスクリーニングすることにより内因性遺伝子の両側の対立遺伝子が破壊された株を得る工程を含む請求項69記載の方法。

【請求項71】 薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより分化多能性を保持する細胞の内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊し、さらに内因性遺伝子の他方の側の対立遺伝子も薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより破壊する請求項69記載の方法。

【請求項72】 内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子と同じ種類である請求項71記載の方法。

【請求項73】 内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子と異なる種類である請求項71記載の方法。

【請求項74】 キメラ非ヒト動物を作製するための請求項21~28のいずれか一項に記載の細胞の使用。

【請求項75】 単一または複数の外来遺伝子あるいはその断片ないしは単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させる受容細胞としての、請求項64~68のいずれか一項に記載の細胞の使用。

【請求項76】 キメラ非ヒト動物を作製するための、請求項64~68のいずれか一項に記載の細胞の使用。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明は、キメラ非ヒト動物、その作製法およびその利用法に関する。本発明のキメラ非ヒト動物を用いれば、これまで不可能であった1Mb(百万塩基対)以上の外来巨大DNA断片を動物個体で保持発現させることが可能になる。従って、これを利用することにより、

- ・生物学的に活性な物質をコードする遺伝子の全長、例えば、ヒト抗体遺伝子 全長を保持し、発現する動物個体の作製が可能になる。この動物から得られる生 物学的に活性な物質、例えば、ヒト抗体は医薬品としての利用価値がある。
- ・ヒト巨大遺伝子(組織適合性抗原、ジストロフィン等)の動物個体における 機能解析が可能になる。
- ・ヒト優性遺伝病及び染色体異常症のモデル動物作製に利用できる。

[0002]

また、本発明は、内因性遺伝子が破壊されている分化多能性保持細胞およびその使用、ならびにミクロセル法を用いたキメラ動物の作製法および該キメラ動物の使用に関する。破壊された内因性遺伝子と同じまたは相同の遺伝子産物をコードする遺伝子を含む外来染色体またはその断片を受容細胞としての本発明の細胞

に移入させて、その細胞から目的とする機能細胞やキメラ非ヒト動物を作製すれば、分化多能性細胞を生殖系列細胞へ分化させなくとも、導入遺伝子を効率良く発現させることが可能になる。これは内因性遺伝子の破壊あるいは導入遺伝子によって、非ヒト動物の生殖細胞に影響を与えるかあるいは生殖細胞への分化を不可能にするような場合にも、分化多能性細胞から目的とする機能細胞や非ヒト動物を作製することによって、内因性遺伝子を欠損し内因性遺伝子産物を低減した状態で、これまで不可能であった1Mb(百万塩基)を超える外来巨大DNA断片をかかる機能細胞やキメラ非ヒト動物の個体、組織または細胞において保持発現させることが可能になる。


[0003]

# 【従来の技術】

外来遺伝子を動物個体において発現させる技術、すなわちトランスジェニック動物作製技術は、その遺伝子の生体内機能に関する情報を得るために有用なばかりでなく、遺伝子発現を制御するDNA配列の同定(例えば、Magramら、Nature、315:338、1985)、ヒト疾患モデル動物の開発(山村ら、マニュアル疾患モデルマウス、中山書店、1994)、さらには家畜の育種(例えば、Mullerら、Experientia、47:923、1991)、それを用いた有用物質の生産に利用されてきた(例えば、Velanderら、P.N.A.S.、89:12003、1992)。遺伝子導入の対象としてはこれまでマウスが最も多く用いられてきた。実験動物として詳細に研究され、胚操作技術も確立されているマウスはこの目的に最も適した哺乳動物であるといえる。

#### [0004]

マウス個体への外来遺伝子導入法は大きく分けて2つ知られている。1つは受精卵前核にDNAを注入する方法(Gordonら,P.N.A.S.,77:7380,1980)であり、もう一つは分化全能性を保持した胚幹細胞(以下ES細胞、という)にDNAを導入し、キメラマウスを作製する方法(Takahashiら,Development,102:259,1988)である。後者の場合、キメラマウスにおいては、ES細胞の貢献した細胞、組織においてのみ、ES細胞由来の生殖細胞を経て得られる子孫においてはすべての細胞、組織で導入遺伝子が保持される。これらの技術を利用して現在までに数多くのトランスジェニックマウスが作製されてきた。



しかし、現状では導入可能なDNAの大きさに限界があり、それがこの技術の利用範囲を大きく制限している。その限界はクローン化可能なDNAの大きさに依存し、これまで最も大きなDNA断片を導入した例の一つは、酵母人工染色体(YAC)にクローニングされた約670kbのDNA断片である(Jakobovitsら、Nature、362:255、1993)。さらに最近になってヒト抗体重鎖遺伝子の可変領域の約8割及び定常領域の一部(Cμ、Cδ、Cγ2)を含む約1MbのYACの導入も報告された(Mendezら、Nature Genetics、15:146、1997)。これらの実験は、YACを保持する酵母とマウスES細胞を融合することにより行なわれた。YACにおいては、約2Mbまでの外来DNAをクローニングできるとされているが(Den Dunnenら、Hum. Mo1.Genet.、1:19、1992)、出芽酵母細胞中では、相同DNA配列同士の組換え頻度が高いことが知られており、反復配列を多く有するヒトDNA断片を完全な形で安定に保持することが困難な場合がある。事実、ヒトゲノムDNAを含むYACライブラリーでは、その20~40%が何らかの組換えを起こしている(Greenら、Genomics、11:584、1991)。

[0006]

もう1つの方法として、ヒト培養細胞から得られる中期染色体を顕微切断し、その断片(10Mb以上と推定される)をマウス受精卵に注入することが試みられた(Richaら、Science、245:175、1989)。この結果得られたマウス個体においてヒト特異的DNA配列(Alu 配列)が検出されたが、ヒト遺伝子発現については確認されていない。また、ここで用いられた染色体調製法では染色体をスライドグラスに固定する際、酢酸メタノールを使用するために、DNA自体が小さく断片化してしまうことが避けられず、注入したDNAが一続きのDNAとして存在している可能性は低い。

いずれにせよ、現在まで1Mbを超える一続きの外来DNA断片をマウス個体へ導入、発現させた例はないといえる。

マウスに導入することが望まれる、有用かつ興味深いヒト遺伝子:抗体(例えば、Cookら, Nature Genetics, 7:162, 1994)、T細胞受容体(Hoodら, Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, Vol. LVIII, 339, 1993)、

組織適合性抗原(Carrolら、P.N.A.S., 84:8535, 1987)、ジストロフィン(Den Dunnenら、前記)等は、そのコード領域自体が1Mbを超える大きさを持つことが知られている。とりわけ、ヒト型抗体の医薬品としての重要性から、ヒトの免疫グロブリン重鎖(~1.5Mb、Cookら、前記)、軽鎖  $\kappa$  (~3Mb、Zachau、Gene, 135:167, 1993)、軽鎖  $\lambda$  (~1.5Mb、Frippiatら、Hum. Mol. Genet., 4:983, 1995)の遺伝子全長を保持し、発現するようなマウスの作製が望まれているがそれは現状の技術では不可能である(日経バイオテク, 1993.7.5.)。

# [0007]

また、ヒトの優性遺伝疾患、先天異常を引き起こす染色体異常症(ダウン症等)の原因遺伝子の多くはクローン化されておらず、染色体上の大まかな位置情報のみ利用可能である。例えば、中期染色体をギムザ染色することによって得られるGバンドは、通常数Mb~10Mb以上の大きさを有している。従って、ある原因遺伝子が特定のGバンド上に存在することが明らかとなっても、これらの異常形質をマウスに導入するためには、原因遺伝子周辺の染色体断片(数Mb以上)を導入することが必要であるが、これも現状の技術では不可能である。

ここに従来技術の限界である1Mbを超える外来DNAをマウス個体に導入し、発現させる技術の開発が望まれている。

動物培養細胞においては、従来技術により上述の限界を越える大きさのDNAを導入することが可能である。これは主に、染色体(ヒトの場合約50~300Mbの大きさを持つ)を媒体として行なわれる。細胞への染色体移入法はいくつか報告されているが(例えば、McBrideら、P.N.A.S.,70:1258、1973)、その中でも望みの染色体を1本だけ導入する方法として最適と考えられているのがミクロセル法である(Koiら、Jpn. J. Cancer Res.,80:413、1989)。ミクロセルと呼ばれる構造体は1本~数本の染色体が核膜、形質膜に包まれたものである。ある種の細胞において紡垂体形成を阻害する薬剤により誘導されるミクロセルを分離し、受容細胞と融合することにより、少数(多くの場合は1本)の染色体を導入することが可能である。この方法により得られた、ヒト染色体を1本だけ保持するモノクロモソーム雑種細胞のライブラリーは既知遺伝子のマッピングや、未知の癌抑制遺伝子、細胞老化遺伝子等の存在する染色体を特定するために利用されてきた

(例えば、Saxonら, EMBO J., 5:3461, 1986)。さらに、ミクロセルにガンマ線を照射することにより、染色体を断片化しその一部を導入することも可能である(Koiら, Science, 260:361, 1993)。すなわち、ミクロセル法は、1Mbを超えるDNAを動物培養細胞に導入する方法として適していると考えられる。

#### [8000]

培養細胞からマウス個体を作り出すことができないかという期待は、分化全能性を安定に保持するES細胞の発見(Evansら,Nature,292:154,1981)により確実に現実のものとなった。このES細胞には外来遺伝子、種々の突然変異、さらには、標的遺伝子組換えによる変異が導入可能となり、マウス個体レベルの遺伝的改変が自在に行なえるようになった(例えば、Mansourら,Nature,336:348,1988)。このようなES細胞で、ジーンターゲッティングによって標的遺伝子を破壊したマウスを作製し、目的遺伝子を導入したトランスジェニックマウスとを交配させ、目的遺伝子を効率良く発現するマウスを作製することができる。例えば、マウスの抗体遺伝子を破壊したマウスとヒト抗体遺伝子を導入したマウスを交配させ、ヒト抗体遺伝子を破壊したマウスとヒト抗体遺伝子を導入したマウスを交配させ、ヒト抗体遺伝子を効率良く発現させることができる。正常二倍体細胞には対立遺伝子(アレル)が存在する。マウスの片側のアレルの抗体重鎖遺伝子を破壊したトランスジェニックマウスでは、マウス血清中のヒト抗体濃度が上昇し、さらに交配によって両側のアレルとも破壊したマウスではさらにヒト抗体濃度が顕著に上昇する(S.D.Wagnerら,Genomics,35:405-414,1996)。

#### [0009]

また片側のアレルの標的遺伝子を破壊した後、選択薬剤を高濃度にし、両側のアレルとも標的遺伝子を欠損させること(ダブルノックアウト)も行われてきた。しかし高濃度選択培養法で得られた標的遺伝子欠損細胞はin vivo での培養が長期にわたること、薬剤による選択圧がきついことなどの理由から生殖細胞への分化能が低下しているおそれがあった(高津・瀧、実験医学別冊 バイオマニュアルリアシリーズ 免疫研究の基礎技術、羊土社、1995)。あるいは、2種類の選択薬剤、例えばネオマイシン耐性細胞に対してハイグロマイシンを用いてダブルノックアウトをした場合には、その二重耐性ES細胞が変異マウスとなる例は少ない(渡部ら、組織培養21、42-45、1995)。また、ES細胞は培養条件によって

分化能や増殖能を失うおそれがあり、2回のジーンターゲッティングではキメラマウスの生殖細胞への分化能を失わないが、第2段階の相同組換え頻度が極めて低いなどから(勝木ら、実験医学 Vol.11 No.20 増刊 1993)、標的遺伝子欠損ホモ接合体を得る場合、とりわけ標的遺伝子が2つ以上の場合には、それぞれの標的遺伝子をヘテロ欠損させたマウスを作製したのち交配して2つ以上の遺伝子をホモに欠損したマウスを作製することが多かった(N. Longberg ら, Nature, 368:856-859, 1994)。破壊するべき遺伝子が近接して存在し、交配によって2つ以上の遺伝子を欠損したマウスが得られない場合には、ES細胞において、2つの標的遺伝子を欠損したマウスが得られない場合には、ES細胞において、2つの標的遺伝子をヘテロに欠損させたマウスを作製し、交配によってホモ欠損マウスを作製することが行われてきた(J.H. van Reeら,Hum Mol Genet 4:1403-1409, 1995)。

## [0010]


分化多能性を持つES細胞を、in vitroで機能細胞に分化させることが試みられている (T. Nakano ら, Science, 265:1098-1101, 1994, A.J. Potocnik ら, The EMBO Journal, 13:5274-5283, 1994)。このような培養システム、例えば成熟 B細胞まで分化を誘導できるシステムは、B細胞の発生・分化過程において機能する未知の増殖・分化因子の同定への利用が期待されている。

一方、巨大DNAの導入という意味では前述のYACベクターにクローニング可能な外来DNA断片の大きさが限界と考えられてきた。その大きさを越えるDNAを培養細胞に導入可能な染色体移入という従来技術がマウス個体レベルへの遺伝子導入に利用されたことはなく、またその達成は困難であると考えられてきた(村松ら、トランスジェニックバイオロジー、講談社サイエンティフィク、p143-,1989)

# [0011]

理由としては、以下のようなものが挙げられる。

・受容細胞を正常核型のマウスES細胞としてこれにヒト染色体導入を行なう場合、それは染色体異常そのものを導入することである。これまで、顕微鏡によって識別可能な染色体レベルの大きな遺伝子異常はマウスの発生にとって多くの場合致死的であると考えられてきた(Groppら, J.Exp.Zool., 228:253, 1983; 相



## [0012]

・我々が得ることのできるヒト染色体は通常、有限増殖の正常繊維芽細胞、あるいは癌細胞等の分化した体細胞のものであり、そのような体細胞由来の染色体が未分化なES細胞に導入された場合、ES細胞を分化させたり (Mullerら, Nature, 311:438, 1984)、老化させてしまうのではないか (Sugawara, Science, 247: 707, 1990) と考えられた。

#### [0013]

・体細胞由来の染色体が初期胚に導入された場合、胚発生過程で生殖細胞由来のそれと同様に正しく機能し、多様な組織、細胞における特異的遺伝子発現を担うことができるかという問題についての研究は非常に少ない。この2者における大きな違いの一つは染色体DNAのメチル化状態と想像される。これは細胞の分化に伴って変化し、組織特異的な遺伝子発現における重要な役割が示唆されている(Ceder, Cell, 53:3, 1988)。例えば、抗体遺伝子の活性化に不可欠な部位特異的DNA組換え反応について、メチル化した基質をB細胞に導入した場合、メチル化の状態は複製後も保持され、組換え反応を阻害するという報告がある(Hsiehら, EMBO J., 11:315, 1992)。また、株化された細胞中では生体内と比較して、de novoのメチル化が起こりやすいとされている(Antequeraら, Cell, 62:503, 1990)。よってこれまでの研究から、繊維芽細胞や、ヒトーマウス雑種細胞のおそらく高度にメチル化されているであろう抗体遺伝子がマウスのB細胞で正常に発現すると想像することは容易ではなかった。

### [0014]

ここで、関連するものとしてIllmenseeらの2つの報告 (P.N.A.S.,75;1914, 1 978; P.N.A.S.,76: 879, 1979 ) に注目しなければならない。1つはヒト肉腫細胞とマウスEC細胞、もう1つはラット肝癌細胞とマウスEC細胞の全細胞融合により得られた融合株からキメラマウスを作製したという報告である。これらの報告においてはその実験結果に数多くの疑問点が指摘され、その信憑性は低いと考えられている (野口ら、マウスのテラトーマ、理工学社、5節、1987)。また、

1日も早い追試が望まれていたにも関わらず、報告から18年を経た現在までこの 実験を再現できたという報告は存在しない。従って、これらの報告によっては、 マウス個体において外来染色体を保持させ、該染色体上の遺伝子を発現させ得た ということはできないと考えられてきた。

こうした状況において、染色体断片ほどの巨大DNAをマウスをはじめとする動物個体に導入し、発現させることは困難とされ、実際この問題について検討がなされたことは上記のIllmenseeらの報告以来ない。

# [0015]

# 【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明は、外来染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその 断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物およびその子孫、並びに前記のキメ ラ非ヒト動物の作製法を提供することを目的とする。

また、本発明は、前記のキメラ非ヒト動物およびその子孫に由来する組織および細胞を提供することを目的とする。

さらに、本発明は、前記のキメラ非ヒト動物およびその子孫に由来する細胞と ミエローマ細胞との融合により作製されたハイブリドーマを提供することも目的 とする。

# [0016]

さらにまた、本発明は、非ヒト動物の個体、組織または細胞を用いて、外来染色体またはその断片上の遺伝子の発現産物である生物学的に活性な物質を製造する方法を提供することを目的とする。

また、本発明は、外来染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物を作製するにあたって、外来染色体またはその断片を移入させる受容細胞として利用可能な分化多能性を保持する細胞を提供することを目的とする。

また、本発明は、前記の分化多能性を保持する細胞の利用方法を提供することも目的とする。

[0017]

# 【課題を解決するための手段】

発明者は前記課題を解決するために鋭意研究を行なった結果、ヒト正常繊維芽細胞由来染色体あるいはその部分断片をミクロセル法によりマウスES細胞に導入し、それを安定に保持する株を得ることに成功した。さらにこのES細胞株から、その正常組織においてヒト染色体を保持し、ヒト抗体重鎖遺伝子を含む複数のヒト遺伝子を発現するキメラマウスを得た。我々はこの一連の方法により、これまで不可能であった巨大DNA断片の個体における保持、及び該DNA 断片上の遺伝子の発現を可能にした。さらに、発明者は、抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子が共にノックアウトされた胚性幹細胞を得ることにも成功した。

[0018]

本発明の要旨は以下の通りである。

- 1. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、 該ミクロセルとの融合により、分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数 の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、キメラ非ヒト動 物の作製法。
- 2. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、 該ミクロセルとの融合により、分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数 の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、単一または複数 の外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する細胞の作製方法。

#### [0019]

1または2の方法においては、単一または複数の外来染色体あるいはその断片が670kbを越えてもよく、さらに、1Mb(百万塩基対)以上であってもよい。外来染色体あるいはその断片は抗体をコードする領域を含むものであってもよい。単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルは、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞とミクロセル形成能の高い細胞とを融合させて作製されたハイブリッド細胞から誘導されたものであってもよい。さらに、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルは、前記ハイブリッド細胞から誘導されたミクロセル形成能

の高い細胞と融合させて作製された細胞から誘導されたものであってもよい。単 一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞はヒト正常2倍体細胞で あってもよい。ミクロセル形成能の高い細胞はマウスA9細胞であってもよい。 分化多能性を保持する細胞は、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚性生殖細胞および それらの変異体から成る群より選択することができる。外来染色体あるいはその 断片が目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞がその外来染 色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が 破壊されているとよい。外来染色体あるいはその断片が少なくとも2種の目的の 遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞がその外来染色体あるいは その断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されてい てもよい。分化多能性を保持する細胞において、前記目的の遺伝子と同じあるい は相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されているとよい。 目的の遺伝子は抗体遺伝子であってもよい。抗体遺伝子は抗体重鎖遺伝子および 抗体軽鎖遺伝子であってもよい。1および2の方法においては、外来染色体ある いはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、その外来染色体あるいはその断 片上の前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されている分 化多能性を保持する細胞に、該目的の遺伝子を含む外来染色体あるいはその断片 を移入した後、該細胞と前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が 欠損している系統の非ヒト動物の胚とのキメラを作製してもよい。前記目的の遺 伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物が標的 遺伝子相同組み換え法により作製することができる。キメラ非ヒト動物は、単一 または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその 断片上の遺伝子を発現し、該外来染色体あるいはその断片を子孫に伝達可能なも のであるとよい。キメラ非ヒト動物は、好ましくは哺乳動物であり、より好まし くはマウスである。

[0020]

3. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する 細胞。

単一または複数の外来染色体あるいはその断片は670kbを越えてもよい。

3の細胞においては、外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞においてはその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されていてもよい。また、外来染色体あるいはその断片が少なくとも2種の目的の遺伝子を含むものであり、分化多能性を保持する細胞においてはその外来染色体あるいはその断片上の該目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されていてもよい。さらに、分化多能性を保持する細胞において、前記目的の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されているとよい。外来染色体あるいはその断片は抗体遺伝子を含んでもよい。抗体遺伝子は抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子であってもよい。分化多能性を保持する細胞は、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚性生殖細胞およびそれらの変異体から成る群より選択することができる。3の細胞は、キメラ非ヒト動物を作製するために使用することができる。

[0021]

4. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物、または、前記の単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫。

単一または複数の外来染色体あるいはその断片は670kbを越えてもよい。 外来染色体あるいはその断片が目的の遺伝子を含むものであり、該目的の遺伝子 と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されていてもよい。外来染色体あるい はその断片が少なくとも2種の目的の遺伝子を含むものであり、該目的の遺伝子 と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されていてもよい。前記目的の遺伝子 と同じあるいは相同の内因性遺伝子が破壊されていてもよい。前記目的の遺伝子 と同じあるいは相同の内因性遺伝子の両側または片側の対立遺伝子が破壊されて いてもよい。前記目的の遺伝子は抗体遺伝子であってもよい。抗体遺伝子は抗体 重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子であってもよい。

[-0-0-2-2-]

5.4のキメラ非ヒト動物またはその子孫の交配により得られる単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺

19 1 1 0 0 0 1

伝子を発現する非ヒト動物、または、単一もしくは複数の外来染色体あるいはそ の断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫

[0023]

6. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する4のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または5の非ヒト動物もしくはその子孫を、該遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物と交配させることにより作製された非ヒト動物、または、前記の単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫。

[0024]

- 7. 4のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、5の非ヒト動物もしくはその子孫、または6の非ヒト動物もしくはその子孫に由来する組織。
- 8.4のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、5の非ヒト動物もしくはその子孫、または6の非ヒト動物もしくはその子孫に由来する細胞。

細胞は、B細胞であってもよいし、動物の組織由来の初代培養細胞あるいは株 化細胞との融合細胞であってもよい。

[0025]

- 9. 上記のB細胞とミエローマ細胞との融合により作製されたハイブリドーマ。
- 10. 4のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫、5の非ヒト動物もしくはその子孫、または6の非ヒト動物もしくはその子孫の個体、組織または細胞において、単一または複数の外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現させ、その産物としての生物学的に活性な物質を回収することを特徴とする、生物学的に活性な物質の製造法。

キメラ非ヒト動物の細胞はB細胞であってもよい。B細胞はミエローマ細胞と融合して、不死化されていてもよい。また、キメラ非ヒト動物の細胞は、動物の組織由来の初代培養細胞あるいは株化細胞との融合細胞であってもよい。生物学的に活性な物質は抗体であってもよい。抗体は、好ましくは哺乳動物の抗体であり、より好ましくはヒト抗体である。

[0026]

- 11. 10の方法により製造できる生物学的に活性な物質。
- 12. 670kbを越えるヒト抗体遺伝子の少なくとも一つを保持し、発現する非ヒト動物。

12の非ヒト動物は、1 M b 以上のヒト抗体遺伝子の少なくとも一つを保持し、発現するとよい。ヒト抗体遺伝子は、ヒト重鎖遺伝子、ヒト軽鎖 κ 遺伝子、ヒト軽鎖 λ 遺伝子またはそれらの組み合わせであってもよい。さらに、12の非ヒト動物においては、そのヒト抗体遺伝子と同じあるいは相同の非ヒト動物抗体遺伝子が欠損しているとよい。そのヒト抗体遺伝子と同じあるいは相同の非ヒト動物抗体遺伝子の欠損は、遺伝子相同組換えによる該非ヒト動物抗体遺伝子の破壊によるものであってもよい。

[0027]

- 13. 12の非ヒト動物の脾臓細胞とミエローマ細胞との融合により得られるハイブリドーマ。
- 14. 13のハイブリドーマにより産生される抗体。

[0028]

15. ヒト抗体の少なくとも一つのクラスまたはサブクラスを発現する非ヒト動物

15の非ヒト動物においては、発現するヒト抗体のクラスまたはサブクラスの遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損していてもよい。ヒト抗体のクラスまたはサブクラスは、IgM、IgG、IgE、IgA、IgDおよびそれらのサブクラス、またはそれらの組み合わせであってもよい。

[0029]

16. 670kbを越える単一または複数の外来DNAを保持し、該外来DNA上の遺伝子を発現する非ヒト動物。

16の非ヒト動物においては、発現する外来DNA上の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子が欠損していてもよい。16の非ヒト動物は、1Mb以上の単一または複数の外来DNAを保持し、該外来DNA上の遺伝子を発現してもよい。発現する外来DNA上の遺伝子と同じあるいは相同の内因性遺伝子は欠損してい

てもよい。

[0030]

17. 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を胚盤胞に由来する培養細胞へ移入し、該細胞の核を除核した未受精卵に移植することを特徴とする、トランスジェニック非ヒト動物の作製法。

[0031]

18. 少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞

18の細胞においては、少なくとも2種の内因性遺伝子の両側または片側の対立 遺伝子が破壊されていてもよい。破壊されている内因性遺伝子は抗体遺伝子であ ってもよい。破壊されている抗体遺伝子は抗体重鎖遺伝子および抗体軽鎖遺伝子 であってもよい。分化多能性を保持する細胞は、胚性癌腫細胞、胚性幹細胞、胚 性生殖細胞およびそれらの変異体から成る群より選択することができる。

[0032]

19. 少なくとも2回の相同組換えにより、18の細胞を作製する方法。

19の方法においては、薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより分化多能性を保持する細胞の内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊し、該細胞を該薬剤の存在下で培養し、薬剤耐性となった株を選択し、これらの株をスクリーニングすることにより内因性遺伝子の両側の対立遺伝子が破壊された株を得る工程を含んでもよい。薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより分化多能性を保持する細胞の内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊し、さらに内因性遺伝子の他方の側の対立遺伝子も薬剤耐性マーカー遺伝子を用いる相同組換えにより破壊してもよい。内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子と同じ種類であってもよい。内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子と同じ種類であってもよい。内因性遺伝子の片側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子が、他方の側の対立遺伝子を破壊するための相同組換えに用いる薬剤耐性マーカー遺伝子と異なる種類であってもよい。

## [0033]

また、本発明は、単一または複数の外来遺伝子あるいはその断片ないしは単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させる受容細胞としての、前記の分化多能性を保持する細胞の利用方法を提供する。単一または複数の外来遺伝子あるいはその断片は、プラスミド、コスミド、YAC等のベクターに組み込まれていてもよく、単一または複数の外来染色体あるいはその断片はミクロセルに含まれていてもよい。移入させる単一または複数の外来染色体あるいはその断片は、分化多能性を保持する細胞において破壊されている内因性遺伝子と同じまたは相同の遺伝子を含むものであるとよいが、特に限定されるものではない。本明細書において、「相同の遺伝子」とは、生物種間または種内において、同種または近似の性質を持つタンパク質をコードする遺伝子をいうものとする。

さらに、本発明は、キメラ非ヒト動物を作製するための、前記の分化多能性を 保持する細胞の利用方法を提供する。

# [0034]

さらにまた、本発明は、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む ミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、前記の少なくとも2種の内 因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の 外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、単一または複数の 外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する細胞の作製方法、および単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、前記の少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、キメラ非ヒト動物の作製法を提供する。単一または複数の外来染色体あるいはその断片は1Mb(百万塩基)を超える大きさを有するものであってもよい。外来染色体あるいはその断片は抗体をコードする領域を含むものであってもよい。単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルは、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞とミクロセル形成能の高い細胞とを融合させて作製されたハイブリッド細胞から誘導されてもよい。また、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含

むミクロセルは、前記ハイブリッド細胞から誘導されたミクロセルをさらにミク ロセル形成能の高い細胞と融合させて作製された細胞から誘導されたものであっ てもよい。単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む細胞はヒト正常 2倍体細胞であってもよい。ミクロセル形成能の高い細胞はマウスA9細胞であ ってもよい。上記のキメラ非ヒト動物の作製法においては、少なくとも2種の内 因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞に、該細胞において破壊 されている内因性遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子を含む外来染色体あるいは その断片を移入した後、該細胞と前記内因性遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子 が欠損している系統の非ヒト動物の胚とのキメラを作製してもよい。少なくとも 2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞において破壊さ れている内因性遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子が欠損している系統の非ヒト 動物は、標的遺伝子相同組み換え法により作製されたものであってもよい。キメ ラ非ヒト動物は、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外 来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現し、該外来染色体あるいはその断片 を子孫に伝達可能なものであるとよい。キメラ非ヒト動物は哺乳動物であるとよ く、より好ましくは、マウスである。

#### [0035]

また、本発明は、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、前記の少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、キメラ非ヒト動物の作製法により作製することができ、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する細胞を提供する。本発明は、さらに、キメラ非ヒト動物を作製するための上記細胞の利用方法も提供する。

#### [0036]

本発明は、上記のキメラ非ヒト動物の作製法により作製することができ、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物、または、前記の単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺

伝子を発現するその子孫を提供する。また、本発明は、上記のキメラ非ヒト動物またはその子孫の交配により得られる単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する非ヒト動物、または、単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫を提供する。さらに、本発明は、上記のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または非ヒト動物もしくはその子孫に由来する組織および細胞を提供する。この細胞はB細胞であってもよい。

[0037]

また、本発明は、上記のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または非ヒト動物もしくはその子孫に由来する細胞とミエローマ細胞との融合により作製されたハイブリドーマを提供する。

本発明は、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する上記のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫を、該遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物と交配させることにより作製された非ヒト動物、または、前記の単一もしくは複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するその子孫を提供する。

[0038]

さらに、本発明は、上記のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または非ヒト動物もしくはその子孫の個体、組織または細胞において、単一または複数の外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現させ、その産物としての生物学的に活性な物質を回収することを特徴とする、生物学的に活性な物質の製造法を提供する。上記のキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または非ヒト動物もしくはその子孫の細胞はB細胞であってもよい。B細胞はミエローマ細胞と融合して、不死化されていてもよい。生物学的に活性な物質は抗体であってもよく、抗体は哺乳動物の抗体であるとよく、より好ましくは、ヒト抗体である。

[0039]

さらにまた、本発明は、上記の単一または複数の外来染色体あるいはその断片

を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物もしくはその子孫または非ヒト動物もしくはその子孫を、該遺伝子と同じあるいは相同の遺伝子が欠損している系統の非ヒト動物と交配させ、誕生した子動物の個体、組織または細胞において、前記の単一または複数の外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現させ、その産物としての生物学的に活性な物質を回収することを特徴とする、生物学的に活性な物質の製造法を提供する。

# [0040]

本発明はまた、外来染色体からなる非ヒト動物及び非ヒト動物細胞への遺伝子 導入用ベクターを提供する。外来染色体は、好ましくはヒトに由来するものであ り、より好ましくはヒト14番染色体断片である。非ヒト動物は、好ましくはマ ウスである。

本明細書においては、対立遺伝子 (allele) を以下「アレル」ということとする。

また、本明細書において、「相同の遺伝子」とは、生物種間または種内において、同種または近似の性質を持つタンパク質をコードする遺伝子をいうものとする。

#### [0041]

## 【発明の実施の形態】

ヒト染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するマウス個体は、

- (1) 標識されたヒト染色体またはその断片を保持する染色体供与細胞の作製
- (2) 分化多能性を保持するマウス細胞へのミクロセル法によるヒト染色体また はその断片の移入
- (3) 上記マウス細胞を用いたキメラマウスの作製
- (4) キメラマウスにおけるヒト染色体保持及び、ヒト遺伝子発現確認 の過程を経ることにより得ることができる。なお、ここでは、ヒト染色体または その断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現する非ヒト動物と して、マウスを例にとった(以下、このマウスを「ヒト染色体導入マウス」と称 する。)。

[0042]

ここでヒト染色体とは、ヒト細胞由来の天然のDNAと蛋白質の複合体のことを指す。正常なヒト染色体は23種(雄は24種)46本存在し、それぞれ約50~300Mbの長さのDNAを含むとされるが、本発明においては独立染色体として安定に複製、分配が可能な部分断片、およびマウス染色体上に転座し、安定に保持されている部分断片も含まれる。そのDNAの大きさは通常1Mb以上だが、それ以下の場合もある。本発明の特徴は大腸菌、酵母等でのクローニングあるいは細胞からのDNA抽出処理等を行なわず、染色体そのものを媒体としてマウス個体でヒト遺伝子を保持、発現させることにある。

また、ヒト染色体導入マウスとは、その正常体細胞の全てまたは一部において、単一あるいは複数のヒト染色体あるいはその断片を保持するものを指す。さらには、その正常体細胞の全てまたは一部において、ヒト染色体上の単一あるいは複数のヒト遺伝子を発現しているものを指す。

[0043]

(1) 標識されたヒト染色体またはその断片を保持する染色体供与細胞の作製 染色体供与細胞としては、1) 受容細胞で選別可能なマーカーで標識されたヒト染色体を保持し、2) それ以外のヒト染色体を含まない、3) ミクロセル形成能が高い細胞、が望ましい。

ヒト染色体提供の材料としては、ヒト由来のあらゆる細胞株、癌細胞、初代培養細胞を用いることが出来るが、染色体の欠失、増幅等の異常の可能性が低く、また培養が容易な点を考慮すると正常繊維芽細胞が適している。

[0044]

まず1) について、ヒト細胞は薬剤 (G418, ピューロマイシン,ハイグロマイシン,ブラストサイジン) 耐性等のマーカー遺伝子を発現するベクターにより形質 転換することができる。ここで用いるマーカー発現制御のためのプロモーターと しては、ヒト細胞のみならず、マウスES細胞のような受容細胞で効率よく働くも のが望ましい。この目的にはSV40エンハンサーと単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼプロモーターの連結したもの (Katohら, Cell Struct.Funct., 12:575, 1987)、マウスPGK-1プロモーター (Sorianoら, Cell, 64:693, 1991) 等を用

いることが出来る。エレクトロポレーション(石田ら、細胞工学実験操作入門、講談社、1992)等による形質転換を実施し、選択することにより、導入されたマーカー遺伝子が、23種46本あるヒト染色体上にランダムに挿入されたようなヒト細胞形質転換体のライブラリーを得ることが出来る。

## [0045]

3)については、多くのヒト正常細胞がミクロセル形成能が非常に低いので、上記の形質転換体をミクロセル形成能の高い細胞例えば、マウスA9細胞 (Oshimu ra,M.,Environ. Health Perspect., 93:57, 1991)と全細胞融合することにより、形成能を付与することが出来る。マウスーヒト雑種細胞では、ヒト染色体が選択的に消失することが知られているが、ここで得られた融合株は、先述のマーカーで選択することにより、マーキングされたヒト染色体を安定に保持することが出来る。

#### [0046]

さらに、2)の条件を満たすために、この細胞融合株からミクロセルを取得し、マウスA9細胞と再度融合することが望ましい。この場合も、ヒト染色体上のマーカーで選択することにより、得られるミクロセル融合株の多くは、1)、2)、3)の条件を満たしたものであると考えられる。マーキングされたヒト染色体の同定は、最終段階で得られるマウスーヒトモノクロモソーム雑種細胞において、PCR(ポリメラーゼチェインリアクション、Saikiら、Science、239:487、1988)、サザンブロット解析(Ausubelら、Current protocols in molecular biology、John Wiley & Sons、Inc.、1994)、FISH(フルオレッセンスインサイチューハイブリダイゼーション、Lawrenceら、Cell、52:51、1988)解析等により調べることが出来る。ある特定の染色体導入を望む場合には、多くのヒト細胞形質転換体クローンについて、それぞれ上記の過程を繰り返して、目的染色体がマーキングされたものを探す。あるいは、ヒト細胞形質転換体クローンの混合物について上記の過程を実施し、得られる多数のマウスーヒトモノクロモソーム雑種細胞についてヒト染色体の同定を行なうことが可能である。

#### [0047]

さらに、導入を望む染色体上のDNA配列を標的とした相同組換え(Thomas ら, C

ell, 51:503, 1987)により、特定の部位にマーカー遺伝子を挿入することも可能である。

マウスーヒト雑種細胞から調製したミクロセルにガンマ線照射することにより、マーキングされたヒト染色体を断片化してマウスA9細胞に導入することも出来る。また、ミクロセルにガンマ線照射しない場合でも、ある割合で部分断片化したヒト染色体が移入されることがある。これらの場合、得られるミクロセル融合株は、マーキングされたヒト染色体の部分断片を保持している。これらは、受容細胞に染色体部分断片を導入したい場合に用いることができる。

## [0048]

E S細胞に導入されるヒト染色体には欠失、転座、置換等の改変を施しうる。 これらは具体的には以下の方法で達成される。

1)上記に既述のマウスーヒト雑種細胞の作製、マウスーヒト雑種細胞からのミクロセル誘導、該ミクロセルとマウスA9細胞の再融合、該再融合細胞からのミクロセル誘導、該ミクロセルとマウスES細胞の融合の各過程において、ヒト染色体の欠失、転座が起こる場合がある。これらの変異染色体を保持する細胞を、染色体の顕微鏡観察、PCR、サザン解析等により適宜選抜する。種々のヒト染色体を保持するマウスA9細胞ライブラリから所望の変異染色体を保持するクローンを選抜することも可能であり、特定のヒト染色体を保持するマウスA9細胞からミクロセルを誘導し、A9細胞あるいはES細胞に融合したもののなかから所望の変異染色体を保持するクローンを選抜することも可能である。また、染色体の断片化はガンマ線照射によりその発生頻度をあげることができる(Koiら、Science, 260:361, 1993)。

#### [0049]

2) ヒト染色体を保持する細胞において、Cre酵素の認識配列であるloxp配列を保持するターゲティングベクターを構築し、相同組換えにより染色体上の所望の位置にloxp配列の挿入されたクローンを取得の後、Cre酵素を細胞内で発現させることにより、部位特異的組換えにより染色体の欠失・転座等の変異体を得る。 W097/49804およびSmithら、Nature Genetics, 9:376, 1995を参照のこと。また、ターゲティングベクターの導入に際しての宿主細胞として、DT

19 1 1 0 2 0 0 2

4 0 細胞 (Diekenら、Nature Genetics, 12:174, 1996 ) のような相同組換え頻 度の高い細胞を用いることもできる。

[0050]

3)ヒト染色体を保持する細胞において、ヒトテロメア配列を保持するターゲテ ィングベクターを構築し、相同組換えにより染色体上の所望の位置にテロメア配 列の挿入されたクローンを取得の後、テロメア・トランケーションによる欠失変 異体を得る。Itzhakiら、Nature Genet.,2,283-287,1992;及びBrownら、P. N . A. S., 93:7125, 1996を参照のこと。また、ターゲティングベクターの導入に 際しての宿主細胞として、DT40細胞 ( Diekenら、前記) のような相同組換 え頻度の高い細胞を用いることもできる。DT40細胞におけるヒト染色体のテ ロメア・トランケーションは本発明において初めて開示された。前記Brownらの 開示はベクターの挿入が染色体上のリピート配列に対するものであり、特定の位 置をターゲットできるものではない。Itzhakiらの開示によれば、ヒトテロメア 配列を導入した腫瘍細胞の一種であるHT1080細胞株を12000株に渡っ て解析した結果8個の相同組換え体を取得し、そのうちわずか1株においてテロ メア配列による欠失を見出したに過ぎない。また、細胞によってはテロメア配列 が挿入されてもトランケーション体が全く得られないという結果も報告されてい るが(Barnettら、Nucleic Acids Res., 21:27, 1993)、発明者らはトランケー ション体を得るためにはともかくも相同組換え体の絶対数を増やすことが必要と 考え、DT40細胞を宿主としたテロメア・トランケーションを試みた。その結 果、予想外のことに取得された8個の相同組換え体のすべてにおいて、トランケ ーションが起こっていることを見出した。

[0051]

以上に開示された導入染色体の改変により、ヒト染色体導入マウスにおいて発現させたくない遺伝子を排除することができる。また、導入される染色体のサイズの縮小化により、導入される染色体断片をヒト染色体導入マウスの子孫に伝達することが可能となる。さらに、染色体の転座、置換により、複数の染色体由来の遺伝子を同一の染色体断片上において発現させること、染色体断片上の複数の遺伝子の一部を異なる遺伝子に置き換えること、すなわち、外来染色体断片をマ

ウス個体及びマウス細胞への遺伝子導入用のベクターとして用いることが可能と なる。

[0052]

(2) 分化多能性を保持するマウス細胞へのヒト染色体またはその断片の移入 これまでに、種々の系統のマウス由来の胚性癌腫細胞(EC細胞、Hanaokaら,D ifferentiation, 48:83, 1991 )、胚性幹細胞(ES細胞、Evansら, Nature, 292 :154, 1981 ) 、胚性生殖細胞(EG細胞、Matsuiら,Cell, 70:841, 1992)がマ ウス初期胚に注入あるいは共培養することによりその正常体細胞に寄与する、す なわちキメラマウス作製可能であることが報告されている。ES、EG細胞はその能 力が特に高く、多くの場合生殖細胞にも寄与し、その細胞由来の子孫を作ること ができる。EC細胞は主に生殖細胞癌から、ES細胞は胚盤胞の内部細胞塊から、EG 細胞は発生初期に出現する始原生殖細胞から得られる。本発明におけるヒト染色 体移入の受容細胞としてはこれらの細胞株及びその変異株、さらにはマウス個体 において全て、あるいは一部の正常体細胞に分化可能なあらゆる未分化細胞を用 いることができる。これらの受容細胞は、キメラマウス、キメラマウス由来の組 織あるいは細胞において、導入されるヒト遺伝子の発現を好適なものとするため 、導入されるヒト遺伝子に相同なマウス遺伝子等の、単一あるいは複数の遺伝子 を標的遺伝子相同組換え法 (Joynerら, Gene Targeting, 1993, IRL PRESS)等の 方法を用いて破壊することも可能である。

[0053]

受容細胞へのヒト染色体移入の材料としては(1)で得られたヒト染色体供与細胞から調製されるミクロセルあるいはガンマ線照射したミクロセルを用いることができる。受容細胞への移入は<清水素行、細胞工学ハンドブック、羊土社、1992>等に記された方法で受容細胞とミクロセルを融合することにより行なう。ミクロセル供与細胞においてはあるヒト染色体またはその断片が受容細胞において選別可能なマーカーを保持している。この中から、(1)と同様PCR、サザンブロット解析、FISH解析等により、導入を目的とする遺伝子あるいは染色体あるいはその断片を保持する株を選択すれば、あらゆるヒト染色体、あるいはその断片を導入することが可能である。また、異なる選択マーカーを保持する複数の染色

体、あるいはその断片を逐次導入することにより、これらを同時に保持する受容 細胞を得ることもできる。さらに、すでにあるヒト染色体を導入した細胞株の中 から、導入染色体数が増加したものを選抜することも可能である。これは通常、 培養液中に添加する選択薬剤の濃度を高めることにより達成される。

## [0054]

ヒト染色体上のマーカー (G418耐性等) により選抜された受容細胞が、供与細胞の保持していたヒト染色体の全部あるいは一部を保持していることは、以下のようにして確認される。選抜された受容細胞から抽出したゲノムDNAを用い、プローブとしてヒト特異的繰り返し配列 (L1、 Alu等、Korenbergら, Cell, 53:391,1988)、ヒト遺伝子等を用いたサザン解析により検出される。また、ヒト遺伝子特異的プライマーによるPCR法、及びヒト染色体特異的プローブ (Lichterら, Human Genetics, 80:224,1988) を用いたフルオレッセンスインサイチューハイブリダイゼーション (FISH) 等の染色体解析により確認することができる。

[0055]

- (3) ヒト染色体導入ES細胞からのキメラマウス作製
- (2)で得られたES細胞株からのキメラマウス作製は、〈相沢慎一,バイオマニュアルシリーズ 8 ジーンターゲティング,羊土社,1995〉等に記された方法で行なう。効率的なキメラマウス作製を行なうための宿主胚の発生時期、系統等の選択については、それぞれのES細胞株についてすでに検討された条件を用いることが望ましい。例えば、CBA×C57BL/6 F1 由来のTT2細胞(野生色、Yagiら,Analytical Biochemistry, 214:70, 1993)についてはBalb/c (白色、日本クレア社)あるいはICR (白色、日本クレア社)由来の8細胞期胚を宿主胚として用いるのが望ましい。

[0056]

(4) キメラマウスにおけるヒト染色体の保持及びヒト遺伝子発現

ES細胞株を注入した胚から誕生したマウスにおけるES細胞の貢献率は、その毛色によりおおまかに判定することができる。但し、毛色に全く貢献が見られないからといって他の組織で貢献がないとは断定できない。より詳細な、キメラマウス各組織におけるヒト染色体の保持は各組織より抽出されたゲノムDNAを用いた

サザン解析、PCR等によって確認することができる。

#### [0057]

導入ヒト染色体上の遺伝子発現は以下のようにして確認される。ヒト染色体由来mRNAの発現は各組織由来RNAを用いたRT-PCR法(Kawasakiら, P.N.A.S., 85:56 98, 1988)、ノーザンブロット法(Ausubelら, 前記)により検出される。蛋白質レベルの発現は、マウスの相同蛋白質との交差反応性を最小にした抗ヒト蛋白質抗体による酵素免疫測定法(ELISA、富山・安東,単クローン抗体実験マニュアル,講談社サイエンティフィク,1987;石川,超高感度酵素免疫測定法,学会出版センター,1993)、ウエスタンブロット法(Ausubelら,前記)あるいは、電気泳動度の違いを利用したアイソザイム分析(Koiら,Jpn.J.Cancer Res.,80:413,1989)等により検出される。さらに、キメラマウス細胞中でのヒト染色体の保持及び該染色体上の遺伝子の発現が、キメラマウス由来初代培養細胞での薬剤耐性マーカー遺伝子発現による耐性細胞の出現より確認できる。

#### [0058]

例えば、ヒト免疫グロブリン重鎖の存在するヒト14番染色体を保持するES細胞から作製されたキメラマウスについて、キメラマウス血清中のヒトIgM、IgG、Ig A等をマウス抗体との交差反応性を最小にした抗ヒトIg抗体による酵素免疫測定法により検出することができる。また、このキメラマウスをヒト由来抗原(例えばヒト血清アルブミン)により免疫し、その脾臓細胞とマウスミエローマを融合することにより得られる、ハイブリドーマ(安東・千葉,単クローン抗体実験操作入門,講談社サイエンティフィク,1991)をELISAによりスクリーニングすることにより、ヒト免疫グロブリン重鎖を産生するハイブリドーマを得ることができる。

#### [0059]

以上、マウスを例にとり、ヒト染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物の作製法を説明したが、本発明において、キメラ非ヒト動物へ移入される染色体またはその断片は、ヒト由来のものに限られず、広く外来染色体またはその断片を移入し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現させることが可能である。ここで、「外来染色体」とは

、分化多能性を保持する細胞へ移入され、キメラ非ヒト動物において、該染色体またはその断片上の遺伝子が発現することを特徴とするものであり、その由来とする生物種は特に限定されるものではない。また、本発明の方法により、キメラマウスのみならず、他のキメラ動物、例えば、ラット、ブタ等の哺乳類その他のキメラ動物も作製することができる。マウス以外の動物種におけるES細胞あるいはES様細胞の樹立はラット(Iannacconeら,Dev. Biol., 163, 288-, 1994)、ブタ(Wheeler ら,Reprod. Fertil. Dev., 6, 563-, 1994)、ウシ(Simsら,Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 6143-6147, 1994)において報告され、さらにメダカ、二ワトリ等でも試みられている(トランスジェニック動物,蛋白質核酸酵素、1995年10月号増刊,共立出版)。また、ヒツジにおいてはES様細胞(ED細胞)さらにはそれを10代以上継代して得られる上皮様細胞由来の核を移植された未受精卵が正常に発生することが知られている(Campbellら,Nature, 380, 64-, 1996)。これらESあるいはES様細胞を受容細胞とした外来染色体移入によってマウスの場合と同様に外来染色体あるいはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物が作製可能である。

# [0060]

また、本発明において、外来染色体あるいはその断片が移入される、分化多能性を保持する細胞は、前述のES細胞、EC細胞、EG細胞に限られるものではない。例えば、骨髄幹細胞に外来染色体あるいはその断片を移入することが可能であり、該骨髄幹細胞の生体への移植により、遺伝病等の治療を行うことが可能である。

キメラ非ヒト動物において、外来染色体を保持するES細胞がその生殖細胞に分化した場合、生殖により得られる子孫にも導入染色体または断片が認められ、その子孫は導入された染色体または断片上の遺伝子を発現する。

#### [0061]

上記のようにして得られるキメラ非ヒト動物またはその子孫を利用して、外来 染色体またはその断片上の遺伝子を発現させ、その産物を回収することにより、 生物学的に活性な物質を製造することができる。具体的には、キメラ非ヒト動物 またはその子孫の個体を外来染色体またはその断片上の遺伝子を発現しうる条件



下で飼育し、その後発現産物を動物の血液、腹水などから回収することができる 。あるいはまた、キメラ非ヒト動物またはその子孫の組織、細胞あるいはそれを 不死化したもの(例えば、ミエローマ細胞との融合により不死化したハイブリド ーマ)などを外来染色体またはその断片上の遺伝子を発現しうる条件下で培養し 、その後発現産物を培養物から回収することができる。さらには、これらキメラ 非ヒト動物またはその子孫の組織、細胞、あるいはそれを不死化したものから抽 出した外来染色体あるいはその断片、または外来染色体またはその断片を構成す るDNA、さらにはまた、キメラ非ヒト動物またはその子孫の組織、細胞、ある いはそれを不死化したものに保持された外来染色体あるいはその断片に由来する cDNAを動物細胞あるいは昆虫細胞(例えば、CHO細胞、BHK細胞、肝ガ ン細胞、ミエローマ細胞、SF9細胞等)に導入し、該細胞を外来染色体または その断片上の遺伝子を発現しうる条件下で培養し、その後発現産物(例えば、特 定の抗原特異的な抗体蛋白質等)を培養物から回収することができる。発現産物 は遠心分離などの公知の方法に従って回収することができ、さらに、硫安分画、 分配クロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィー、吸着クロマトグラフィ ー、分取薄層クロマトグラフィーなどの公知の方法に従って精製することができ る。生物学的に活性な物質は、外来染色体上にコードされているあらゆる物質を 含み、例えば、抗体、特にヒト抗体などを挙げることができる。例えば、得られ たキメラ動物の脾細胞あるいはそのハイブリドーマなどの不死化細胞から該染色 体上のヒト抗体遺伝子をクローニングし、チャイニーズハムスター卵巣細胞(C HO) やミエローマ細胞に導入してヒト抗体を生産することができる(Lynette ら,Biotechnology,10,1121-,1992;Bebbingtonら,Biotechnology,10,169 **-,** 1992).

#### [0062]

本発明により得られるヒト2番、14番、22番染色体(断片)を保持するキメラマウス及びその子孫は、ヒト抗体重鎖(14番染色体上)、軽鎖κ(2番染色体上)、軽鎖λ(2番染色体上)それぞれの遺伝子の機能的配列の大部分を保持し得る。すなわち、酵母人工染色体等を用いてヒト抗体遺伝子の一部を導入した既知のトランスジェニックマウス(Greenら, Nature Genetics, 7, 13-, 1994, Lonb

ergら,Nature,368,856-,1994等)と比較して、ヒトにおいて観察されるものにより近い、非常に多様なヒト抗体レパートリーを発現することが可能である。また、本発明により得られる2番+14番、22番+14番等の染色体(断片)を同時に保持するキメラマウス及びその子孫、並びに、それらを交配することにより得られる2番+14番+22番等の染色体(断片)を同時に保持するマウス及びその子孫は、重鎖、軽鎖の両者がヒト由来である完全なヒト抗体を産生することが可能である。これらのマウスはヒト由来抗原に対してそれを異物とみなして免疫反応を起こし、抗原特異的ヒト抗体を産生することができる。この性質は治療用のヒトモノクローナル抗体、あるいはヒトポリクローナル抗体を得るために非常に有用である(Greenら、前記、Lonbergら、前記)。一方、特定の抗原に対して親和性の高いヒト抗体を得る効率を上げるためには、マウス抗体を産生せず、ヒト抗体のみを産生するマウスを作成することが望まれる(Greenら、前記、Lonbergら、前記)。本発明において、これは典型的には以下の方法Aあるいは Bにより達成される。

[0063]

方法A:マウス抗体欠損ES細胞およびマウス抗体欠損キメラ宿主胚を用いる方法

方法B:ヒト染色体導入キメラマウスよりヒト染色体を保持する子孫を得てマウス抗体遺伝子を欠損するマウス系統との交配を行う方法。

以下にA、Bそれぞれの方法の典型的な例について以下に具体的に記す。

[0064]

# 方法Aの具体的手順

1. マウスES細胞に2コピー存在するマウス抗体重鎖遺伝子の片側のアレルを標的遺伝子相同組み換え法(Joynerら, Gene Targeting, 1993, IRL PRESS)を用いて破壊する。遺伝子破壊箇所には後に部位特異的組換えにより除去可能な配列、例えばloxP配列(Creレコンビナーゼにより組み換え、Sauerら、前記、他にFLPレコンビナーゼ-FRT配列を用いたO'Gormanら, Science, 251, 1351-, 1991の例がある)にはさまれたG418耐性遺伝子等のマーカー遺伝子を挿入する。

[0065]

2. 抗体重鎖遺伝子の片側のアレルが破壊された上記薬剤耐性マウスES細胞を高 濃度の薬剤存在下で培養し、高濃度薬剤耐性となった株を選抜する。これらの株 をスクリーニングすることにより抗体重鎖遺伝子の両側のアレルが破壊された株 が得られる(相沢慎一、前記)。あるいは、抗体重鎖遺伝子の片側のアレルが破 壊された上記薬剤耐性マウスES細胞のもう一方の側のアレルの標的遺伝子も相同 組み換え法を用いて破壊する。予め挿入されたマーカー遺伝子とは別のマーカー 遺伝子を使用することによって、同様な操作を繰り返すことができる。例えば、 G418耐性遺伝子を用いて相同組み換えを行った後、ピューロマイシン耐性遺伝子 を用いて相同組み換えを行い、両側のアレルとも抗体重鎖遺伝子が破壊された株 を得る。予め挿入されたマーカー遺伝子と同じマーカー遺伝子を使用する場合に は、1.で薬剤耐性遺伝子の両側に挿入した組み換え配列の間で、部位特異的組 み換え反応を起こす酵素遺伝子を一時的に導入し、標的遺伝子に挿入されていた 薬剤耐性遺伝子を除去された薬剤感受性株を選抜する。その後、再度標的遺伝子 相同組み換え法によって、マーカー遺伝子を挿入し、両側のアレルとも標的遺伝 子が破壊された株を得る(高津聖志ら、実験医学別冊、免疫研究の基礎技術、p. 255-、1995、羊土社)。

[0066]

3. 2. で得られた抗体重鎖遺伝子の両側のアレルが破壊されたマウスES細胞に 1. で薬剤耐性遺伝子の両側に挿入した組換え配列の間で部位特異的組み換え反応を起こす酵素遺伝子、例えばCreレコンビナーゼ遺伝子(Sauerら、前記)を一時的に導入し、loxP配列の間で組み換え反応が起こって両方の抗体重鎖遺伝子に挿入された薬剤耐性遺伝子が除去された薬剤感受性株を選抜する(高津聖志ら、実験医学別冊、免疫研究の基礎技術、p255-、1995、羊土社)。

[0067]

- 4. マウス抗体軽鎖 κ 遺伝子について上記 1 ~ 3 の過程を繰り返し、最終的に抗体重鎖及び κ 鎖を完全に欠損した薬剤感受性株を取得する。
- 5. 4の株(抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞)を受容細胞としたミクロセル融合により、薬剤耐性マーカー(例えばG418耐性遺伝子)でマーキングされたヒト

抗体重鎖遺伝子を含むヒト14番染色体(断片)を導入する。

[0068]

6.5で得られた株を受容細胞としたミクロセル融合により、5とは異なる薬剤 耐性マーカー (例えばピューロマイシン耐性遺伝子) でマーキングされたヒト抗 体軽鎖遺伝子を含むヒト2番染色体(断片) あるいは22番染色体(断片) または その両者を導入する。

[0069]

7. 自らの抗体を産生することができないマウス系統(例えばRAG-2ノックアウトマウス、Shinkaiら、Cell、68、855-、1992、膜型μ鎖ノックアウトマウス、Kitamuraら、Nature、350、423-、1991)から得た胚を宿主胚として6で得られたES細胞とのキメラマウスを作成する。

[0070]

8. 得られるキメラマウスにおいてほとんどの機能的なBリンパ球はES細胞に由来する(高津聖志ら、実験医学別冊、免疫研究の基礎技術、p234-、羊土社、1995)。このBリンパ球においてはマウス重鎖、κ鎖が欠損しているため、主として導入染色体上の機能的なヒト抗体遺伝子よりヒトの抗体のみが産生される。

[0071]

#### 方法Bの具体的手順

- 1. ヒト抗体重鎖、軽鎖 κ または軽鎖 λ を含むヒト染色体あるいはその断片を保持するキメラマウスからそれらを安定に保持する継代可能な子孫を得る。

体遺伝子よりヒトの抗体のみが産生される。

なお、上記のAおよびBの方法は、ヒト抗体のみならず、外来染色体上に存在 するあらゆる遺伝子の産物を効率的に得るために、用いることができる。

[0072]

# 【実施例】

以下に実施例を示して具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものでない。

(実施例1) G418耐性標識されたヒト染色体(断片)を保持する染色体供与細胞の作製

G418耐性遺伝子を含むプラスミドpSTneoB(Katohら、Cell Struct. Funct., 1 2:575, 1987; Japanese Collection of Research Biologicals (JCRB), Deposit Number: VE039)を制限酵素SalI(宝酒造)で線状化し、ヒト正常繊維芽細胞HF L-1 (RIKEN Cell Bankより入手、RCB0251)へ導入した。HFL-1細胞をトリプシン処理し、5x10<sup>6</sup>個/mlとなるようにダルベッコのリン酸バッファー (PBS) に懸濁してから10μgDNA存在下でジーンパルサー(バイオラッド)を用いてエレクトロポレーションを行なった(石田ら、細胞工学実験操作入門、講談社、1992)。25μFの容量で1000Vの電圧を4mm長のエレクトロポレーションセル(165-2088、バイオラッド)を用いて室温で印加した。エレクトロポレーションした細胞を15%牛胎児血清(FBS)を添加したイーグルF12培地(以下F12、という)を含む100mm組織培養用プラスチックシャーレ(コーニング)3~6枚に播種した。1日後に200μg/mlのG418(GENETICIN、シグマ)を含む15%FBSを添加したF12培地と置き換えた。2~3週間後に生じたコロニー100個程度を一つの集団として52グループにそれぞれまとめ、100mmシャーレに再び播種し培養した。

[0073]

マウスA9細胞 (Oshimura, Environ.Health Perspect.,93:57, 1991, JCRB0211 ) を10%牛胎児血清 (FBS) を添加したダルベッコ改変イーグル培地 (以下DMEM 、という) 中、 100 mm シャーレで培養した。52グループのG418耐性HFL-1 細胞を15%牛胎児血清 (FBS) と200 μg/mlのG418を添加したF12中で、それぞれ100mmシャーレで培養した。マウスA9細胞とHFL-1 細胞をトリプシン処理後それぞれ四分

の一から半分量ずつ混合し、100mmシャーレに播種し10%牛胎児血清(FBS)を添加したDMEMと15%牛胎児血清(FBS)を添加したF12との等量混合物中で半日から一日培養した。細胞融合は(清水ら、細胞工学ハンドブック、羊土社、p.127-、1992)に記述されている方法に従った。DMEMで細胞表面を2回洗った後、2m1のPEG(1:1.4)溶液で1分間処理し、さらに、2m1のPEG(1:3)溶液に換え1分間処理した。PEG溶液を吸い取り、無血清培地(DMEM)で3回洗った後、通常の培地(10%FBS、DMEM)で1日間培養した。細胞をトリプシン処理により分散し、ウワバイン(1x10<sup>-5</sup>M、シグマ)およびG418(800μg/ml)を含む二重選択培地(10%FBS、DMEM)に懸濁し、100mmシャーレ3枚に播種した。約3週間培養した後、生じたコロニーをトリプシン処理により細胞を分散しG418(800μg/ml)を含む選択培地(10%FBS、DMEM)に懸濁し、100mmシャーレ3枚に播種した。約3週間培養した後、生じたコロニーをトリプシン処理により細胞を分散しG418(800μg/ml)を含む選択培地(10%FBS、DMEM)で培養した。

# [0074]

トリプシン処理により細胞を分散し2グループを一つにまとめて、6本の25cm² 遠心用フラスコ(コースター、3025)にて細胞密度が70~80%飽和程度まで培養した。コルセミド(0.05 $\mu$ g/ml, デメコルシン,和光純薬)を含む培養液(20% FBS、DMEM)に交換し、2日間培養しミクロセルを形成させた。培養液を除去し、予め保温(37℃)しておいたサイトカラシンB( $10\mu$ g/ml,シグマ)溶液を遠心用フラスコに満たし、アクリル製遠心容器に遠心用フラスコを挿入し、34℃、8000rpm ,1時間の遠心を行なった。ミクロセルを無血清培地に懸濁し、フィルターで濾過し精製した。マウスA9細胞を80%飽和の状態まで培養した25cm² フラスコに精製した微小核を加えPEG溶液で融合させた。G418を含む選択培地で培養しコロニーを単離した。各クローンが保持するヒト染色体(2番、4番、14番、22番)は以下の通り同定した。上記以外のすべての実験操作及び試薬等は〈清水ら、細胞工学ハンドブック、羊土社、p.127一〉に従った。

[0075]

#### (1) PCR解析

単離した細胞を培養し、細胞からPuregene DNA Isolation kit (Gentra System社)を用いてゲノムDNAを抽出し、このゲノムDNAを鋳型とし、ヒト染色体特異的なプライマーを用いてPCR法で2、4、14、22番ヒト染色体を保持するクロー

ンを選抜した。PCR増幅は約0.1μgのゲノムDNAを使用し(Innisら、PCR実験マニュアル、HBJ出版局、1991、サーマルサイクラーはGeneAmp 9600、Perkin-Elmer社を使用)に従い行なった。TaqポリメラーゼはPerkin-Elmer社製を用い、反応条件は、94℃5分を1サイクル行なった後、変性94℃15秒、アニーリング54~57℃15秒(プライマーにより適宜変更)、伸長72℃20秒を35サイクル行なった。プライマーは各染色体上に存在する遺伝子(O'Brien、Genetic Maps,6th edition、Book 5、Cold Spring Harbor Laboratory Press、1993 )及び多型性マーカー(Polymorphic STS Primer Pair、BIOS社;Weissenbach ら、Nature 359:794、1992;Walterら、Nature Genetics、7:22、1994等)を用いた。遺伝子プライマーはGenBank、EMBL等のデータベースより入手した塩基配列をもとに作製した。多型性プライマーの名称及び、遺伝子プライマーの配列はそれぞれの染色体について以下の実施例で示した(2番:実施例1、4番:実施例6、14番:実施例9、22番:実施例2)。2番染色体の同定には以下に示す遺伝子マーカー及び多型性マーカー(Polymorphic STS Primer Pair、BIOS社:D2S207、D2S177、D2S156、D2S159 BIOS社)を用いた。

[0076]

Cκ (immunoglobulin kappa constant):5'-TGGAAGGTGGATAACGCCCT (配列番号1),5'-TCATTCTCCTCCAACATTAGCA (配列番号2)

FABP 1 (fatty acid binding protein-1 liver): 5'-GCAATCGGTCTGCCGGAAGA (配列番号3), 5'-TTGGATCACTTTGGACCCAG (配列番号4)

Vk3-2 (immunoglobulin kappa variable) : 5'-CTCTCCTGCAGGGCCAGTCA (配列番号 5), 5'-TGCTGATGGTGAGAGTGAACTC (配列番号 6)

Vk1-2 (immunoglobulin kappa variable) : 5'-AGTCAGGGCATTAGCAGTGC (配列番号7), 5'-GCTGCTGATGGTGAGAGTGA (配列番号8)

[0077]

(2) フルオレッセンス インサイチューハイブリダイゼーション(FISH)

FISH解析は(松原ら、FISH実験プロトコール、秀潤社、1994)に記された方法 に従い、ヒト2番、4番、14番、22番染色体特異的プローブ(CHROMOSOME PAINT ING SYSTEM, Cambio社)を用いて行なった。 [0078]

例えば、2番染色体を保持するクローンは26グループ(745クローン)中10グループに1個以上のクローンを得た。このうち用いた2番染色体特異的なプライマーすべてに陽性であったのは5クローンだった。これらのクローンをFISH解析した。FISH解析は(松原ら、FISH実験プロトコール、秀潤社、1994)に記された方法に従い、ヒト2番染色体特異的プローブ(CHROMOSOME PAINTING SYSTEM,CANBIO社)を用いて行なった。すべてのプライマーに陽性な細胞ではヒト2番染色体がほぼ完全な形で観察され、1部のプライマーのみ陽性なクローンのうちいくつかのクローンではヒト2番染色体よりも小さな独立染色体が観察され、あるいはヒト2番染色体以外の染色体と融合しているような形の染色体を持つ細胞も観察された(図1)。図1において、横列がクローン名、縦列はPCRに使用したプライマーを示す。●は陽性を、×は陰性を示した。また、FISHにより観察されたヒト2番染色体の存在形態を最下行に示した。記載のないものは実施していない。

同様にして、ヒト4番、14番、22番染色体を保持するA9細胞を得た。

[0079]

(実施例2)マウスES細胞へのミクロセル法によるヒト22番染色体導入

染色体供与細胞として、(実施例1)で得られたヒト22番染色体を保持するマウスA9細胞株(以下A9/#22、という)を用いた。染色体受容細胞としてはマウスES細胞株E14(Martin L. Hooperより入手、Hooperら、Nature、326:292、1987)を用いた。E14の培養法は〈相沢慎一、バイオマニュアルシリーズ 8、ジーンターゲティング、羊土社、1995〉に記された方法に従い、栄養細胞としては、マイトマイシンC(シグマ)処理したG418耐性STO細胞株(大阪大学、近藤寿人教授より入手)を用いた。まず清水ら(細胞工学ハンドブック、羊土社、1992)の報告した方法に従い、約10<sup>8</sup>個のA9/#22からミクロセルを調製した。得られたミクロセルは全量を5mlのDMEMに懸濁した。約10<sup>7</sup>個のE14をトリプシンで分散させた後、DMEMで3回洗浄し、5mlのDMEMに懸濁した後、ミクロセルとあわせ、1250rpm、10分間遠心して上清を除いた。沈殿をタッピングによりよくほぐし、1:1.4PEG溶液(5g PEG1000、〈和光純薬〉、1 ml DMSO〈シグマ〉を6mlDMEMに溶解)0.5mlを加えて室温で1分30秒静置した後、10mlのDMEMをゆっくりと加えた。直ちに1250rp

m、10分間遠心して上清を除き、沈殿を30mlのES細胞用培地に懸濁し、あらかじめ栄養細胞をまいた直径100mmの組織培養用プラスチックシャーレ(コーニング)3枚に播種した。24時間後に300 $\mu$ g/mlのG418 (GENETICIN,シグマ)を加えた培地と交換し、その後毎日培地交換を行なった。1週間~10日後には薬剤耐性コロニーが出現する。その出現頻度はE14細胞 $10^7$ 個あたり $0\sim5$  個であった。そのコロニーをピックアップし増殖させ、 $5\times10^6$ 個あたり1mlの保存用培地 (ES細胞用培地+10%DMSO〈シグマ〉)に懸濁し、-80℃にて凍結保存した。同時に各薬剤耐性株について $10^6\sim10^7$ 個の細胞からゲノムDNAをPuregene DNA Isolation Kit (Gentra System社)により調製した。

[0080]

ヒト22番染色体の断片化はミクロセルにガンマ線照射することにより行なった (Koiら, Science, 260:361, 1993)。約 $10^8$ 個のA9/#22より取得したミクロセルを 5m1のDMEMに懸濁し、ガンマセル40(カナダ原子力公社製)により、氷上で 60G yのガンマ線を照射した( $1.2Gy/分\times50分$ )。ガンマ線照射したミクロセルは未 照射ミクロセルと同様に融合、薬剤耐性株選抜を行なった結果、薬剤耐性株の出 現頻度は E14細胞  $10^7$  個 あたり  $1\sim7$  個 であった。薬剤耐性株については未照射の 場合と同様にして凍結保存、DNA取得を行なった。

未照射ミクロセル薬剤耐性株E14/#22-9、E14/#22-10、ガンマ線照射ミクロセル薬剤耐性株E14/#22-14、E14/#22-25における導入染色体の保持は以下の(1)~(3)により確認した。

[0081]

#### (1) PCR解析(図2)

薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト22番染色体上に存在する遺伝子 (Genet ic Maps, 前記)及び多型性マーカー (Polymorphic STS Primer Pair, BIOS社: D22S315, D22S275, D22S278, D22S272, D22S274; Nature 359:794, 1992)の存在をPCR法により検出した。GenBank、EMBL等のデータベースより入手した塩基配列をもとに作製した遺伝子プライマーオリゴヌクレオチドの配列を記す。

[0082]

PVALB (parvalbumin) : 5'-TGGTGGCTGAAAGCTAAGAA (配列番号9), 5'-CCAGAAGAA

TGGTGTCATTA (配列番号10)

MB (myoglobin) : 5'-TCCAGGTTCTGCAGAGCAAG (配列番号11), 5'-TGTAGTTGGAGGCC ATGTCC (配列番号12)

DIA1 (cytochrome b-5 reductase) : 5'-CCCCACCCATGATCCAGTAC (配列番号13),5'-GCCCTCAGAAGACGAAGCAG (配列番号14)

Igλ (immunoglobulin lambda): 5'-GAGAGTTGCAGAAGGGGTGACT (配列番号15), 5'-GGAGACCACCAAACCCTCCAAA (配列番号16)

ARSA (arylsulfatase A): 5'-GGCTATGGGGACCTGGGCTG (配列番号17), 5'-CAGAGA CACAGGCACGTAGAAG (配列番号18)

[0083]

約0.1μgのゲノムDNAを鋳型として上記の10種のプライマーについてPCR増幅(Innisら,前記)を行なった。その結果、未照射の2株は全てのプライマー、ガンマ線照射した2株については一部のプライマーについて期待される長さの増幅産物が検出された。以上の結果を図2に示す。図2において、左側にヒト22番染色体のGバンド像に基づく模式的な染色体地図、また、位置が明らかになっているいくつかのマーカーについてはどのバンドに位置するかを示した(0'Brien, GEN ETIC MAPS, 6th edition, BOOK 5等)。遺伝子及び多型性マーカーの並び方は、現在までに入手出来る情報(Science, HUMAN GENETIC MAP, 1994, Nature Genetics, 7:22, 1994, Nature 359:794, 1992等)を基に、大まかな位置関係を示したもので、順序は必ずしも正確ではない。4種のG418耐性E14細胞株について、PC Rにより期待される増幅産物が検出されたマーカーは■で、検出されなかったマーカーを口で示した。下側にはFISH解析による観察結果を示した。A9/#22は、染色体供与細胞である。

[0084]

# (2) サザンブロット解析

サザンブロット解析はヒト特異的な繰り返し配列であるL1配列 (ハプロイドゲノム当たり $10^4\sim10^5$ コピー存在、RIKEN DNA Bankより入手、Nucleic acids research,13;7813,1985,pUK19A由来1.4kb EcoRI-BamHI 断片)をプローブとして、制限酵素 (BglII、宝酒造製) 処理を行なった約 $2\mu$ gのゲノムDNAに対して〈Ausub

elら、Current Protocols in Molecular Biology、John Wiley & Sons、Inc.,19 94〉に記された方法に従い行なった。その結果、各薬剤耐性株DNAにおいてヒトL1 配列とハイブリダイズするバンドが多数検出された。未照射の2株についてはそのパターン及び、各バンドの濃度から推定できるヒト染色体DNAのマウスゲノムDNAに対する量比はA9/#22のそれと同等であった。ガンマ線照射株の全体のシグナル強度はA9/#22と比較した場合、PCR解析で示された欠失の程度と相関していた。

[0085]

(3) フルオレッセンスインサイチューハイブリダイゼーション(FISH)

FISH解析は(松原ら,FISH実験プロトコール,秀潤社,1994)に記された方法に従い、ヒト22番染色体特異的プローブ (CHROMOSOME PAINTING SYSTEM, Cambio社)を用いて行なった。その結果、観察した分裂像のほとんどにおいて、E14/#22-9 はマウス染色体に転座した形で、他の3株は独立した染色体としてヒト22番染色体が検出された。

以上の実験により、得られたG418耐性株E14/#22-9 、E14/#22-10 はヒト22番 染色体の全てあるいは大部分を、E14/#22-14 、E14/#22-25 はその部分断片を保 持することが確かめられた。

[0086]

(実施例3)ヒト22番染色体を保持するES細胞からのキメラマウス作製

一般的なマウス胚取得、培養、ES細胞の胚への注入、仮親子宮への移植等の手技については、〈相沢慎一,バイオマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995〉に記された方法に従った。(実施例2)で得られ、ヒト22番染色体を保持していることが確認されたG418耐性ES細胞株E14/#22-9を凍結ストックより立ち上げ、C57BL/6×C3H F1雌マウス(日本クレア社)をC3H雄マウス(日本クレア社)と交配することにより取得した胚盤胞期胚に胚あたり10~15個注入した。偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のES細胞注入胚を移植した。その結果を(表1)に示す。

[0087]

# 【表1】

表1. ヒト22番染色体 (断片) を保持するE14 細胞株からのキメラマウス作製 ES細胞株/ G418耐性 ES細胞を注入し 子ヴス キメラマウス 毛色への貢献率 ヒト染色体 株番号 た胚盤胞期胚数 の数 の数 ~10% 10-30% 30%~ E14/#22 9 166 29 16 7 3 6

[0088]

計166個の注入胚を移植した結果29匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、 毛色において宿主胚由来の野生色(濃茶)の中にE14細胞由来の薄灰色が認めら れるかどうかにより判定される。誕生した29匹のうち毛色に明らかに薄灰色の部 分のある、すなわち、E14細胞の貢献の認められる個体は16匹であった。また、 最高の貢献率はK22-22における約40%であった。

この結果より、ヒト22番染色体を保持するマウスES細胞株E14/#22-9はキメラ 形成能、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確 認された。

[0089]

(実施例4)ヒト22番染色体を保持するES細胞由来キメラマウス各組織におけるヒト染色体DNAの保持確認

(実施例3)の毛色による判定に加えて、尻尾より調製したゲノムDNAを鋳型としたPCR解析により、導入染色体の保持を確認した。誕生後3週以上を経たキメラマウスから<勝木元也、発生工学実験マニュアル、講談社サイエンティフィク、1987>に記された方法に従い尻尾を取得し、Puregene DNA Isolation Kitを用いてゲノムDNAを抽出した。このゲノムDNAを鋳型として(実施例2)で使用した多型性プライマーのうちPVALB、D22S278を用いて増幅産物の確認を行なった。毛色に貢献の見られた個体のうち10匹について解析を行った結果、全ての個体において少なくともいずれかのプライマーによる増幅産物が確認された。

[0090]

サザン解析は(実施例2)と同様に、ヒトL1配列をプローブとして用い、6個体のキメラマウス、1個体の非キメラマウスの2μgの尻尾ゲノムDNAに対して行なった。その結果、全てのキメラ個体において多数のヒトL1配列の存在が認めら

れ、そのパターンはE14/#22-9と類似していた。マウスゲノムに対する量比は最も多いもので10%程度であった(図3)。図3において、各レーンとも、BglII消化した2μgのゲノムDNAを使用した。<sup>32</sup>P標識ヒトL1配列をプローブとし、シゲナルはイメージアナライザーBAS2000(富士写真フイルム社)により検出した。右より、キメラマウス(K22-6,7,8,9,10,11,12:9は非キメラ)の尻尾由来ゲノムDNAおよびコントロールDNA(C: C は、E14/#22-9 と E14ゲノムDNAを 1:9の重量比で混合したもの)のレーンである。左側にDNA分子量、右側に各キメラ個体のキメラ率を示した。(-: 0%、+: ~10%、++: 10~30%)

さらに、毛色に5%程度の貢献の見られたキメラ個体(K22-7)について脳、肝臓、筋肉、心臓、脾臓、胸腺、卵巣、腎臓からISOGEN(ニッポンジーン社)によりゲノムDNAを取得し、それぞれの組織について、(実施例2)で使用した遺伝子プライマーのうちMB、DIA1を用いてPCR解析を行なった。その結果2つのプライマーとも全ての組織において期待される増幅産物が確認された。DIA1プライマーによる結果を(図4)に示す。PCR産物は2%アガロースゲルにて電気泳動した後、臭化エチジウム染色して検出した。図4の各レーンは左からB:脳、L:肝臓、SM:骨格筋、H:心臓、Sp:脾臓、Th:胸腺、Ov:卵巣、K:腎臓、nc:非キメラマウス尻尾DNA(陰性コントロール)、pc:ヒト繊維芽細胞(HFL-1)DNA(陽性コントロール)を示す。

これらの結果より、E14/#22-9はマウス個体において種々の正常組織に貢献し、かつビト22番染色体を保持していることが確かめられた。

[0091]

(実施例5)ヒト22番染色体を保持するES細胞由来キメラマウスにおけるヒト 遺伝子の発現

ヒト遺伝子発現確認のための試料としては、毛色に5%程度の貢献の見られた個体(K22-7)の尻尾を液体窒素にて凍結後粉砕したものを用いた。これは皮膚、骨、筋肉、血液等の組織の混合したものである。これよりISOGEN(ニッポンジーン)を使用して総RNAを抽出し、RT-PCR法により、ヒト-ミオグロビン(MB)、ヒト-チトクローム b5 レダクターゼ(DIA1)のmRNAの検出を行なった。RT-PCRはくInnisら、PCR実験マニュアル、HBJ出版局、1991>に記された方法に従って行なっ

た。逆転写反応用プライマーは、ランダムヘキサマーオリゴヌクレオチド(終濃度100pmol、宝酒造製)を、逆転写酵素はBRL社製(スーパースクリプト)を使用した。cDNAを鋳型とした増幅に用いたプライマーを記す。

[0092]

MB: 5'-TTAAGGGTCACCCAGAGACT (配列番号19), 5'-TGTAGTTGGAGGCCATGTCC (配列番号20)

DIA1:5'-CAAAAAGTCCAACCCTATCA (配列番号21),5'-GCCCTCAGAAGACGAAGCAG (配列番号22)

[0093]

その結果、両遺伝子のmRNAに特異的な増幅産物が検出された(図5)。RT-PCR 産物は2%アガロースゲルにて電気泳動した後、臭化エチジウム染色して検出した。図5において、M はマーカー(HindIII消化 2 DNA+HaeIII消化 φ X174DNA,宝酒造)、MBはヒトミオグロビン、DIA1はヒトチトクロームb5レダクターセ、WTは野生型C3Hマウスを示す。

[0094]

さらに同じ個体(K22-7) について、脳、心臓、胸腺、肝臓、脾臓、腎臓、卵巣、骨格筋からISOGENを使用して総RNAを抽出し、上記の2種のプライマーにより各臓器のRT-PCRを行った。その結果、DIA1は全ての臓器で、MBは心臓と骨格筋のみで期待される増幅産物が確認された(図6)。ミオグロビンは筋細胞特異的に発現することが知られており(Bassel-Dubyら, MCB, 12:5024, 1992)、この結果は導入したヒト染色体上の遺伝子がマウス個体で正常な組織特異的発現制御を受け得ることを示している。PCR産物は2%アガロースゲルにて電気泳動した後、臭化エチジウム染色して検出した。図6において、各レーンは左からB:脳、H:心臓、Th:胸腺、L:肝臓、Sp: 脾臓、K:腎臓、Ov: 卵巣、SM: 骨格筋、M:マーカー(上記)を示す。MBの結果において観察される下方のバンドは非特異的産物と考えられる。

すなわち、導入されたヒト22番染色体はキメラマウスの正常組織において機能 し得ることが確かめられた。 [0095]

(実施例6)ヒト4番染色体またはその部分断片のES細胞への導入

染色体供与細胞として、(実施例1)で得られたヒト4番染色体を保持するマウスA9細胞株(以下A9/#4、という)を用いた。染色体受容細胞としてはマウスE S細胞株E14(実施例2と同様)を用いた。ミクロセル融合実験およびG418耐性株の選択は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株の出現頻度はE14細胞10<sup>7</sup>個あたり1~2個であった。薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株E14/#4-4、E14/#4-7、E14#4-11におけるヒト4番染色体またはその断片の保持は以下の(1)~(3)により確認した。

[0096]

# (1) PCR解析(図7)

薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト4番染色体上に存在する遺伝子 (0'Brie n, Genetic Maps,6th edition, Book 5, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993) 及び多型性マーカー (Polymorphic STS Primer Pair BIOS社: D4S395, D4S412, D4S422, D4S413, D4S418, D4S426, F11; Nature 359:794, 1992) の存在をPCR法により検出した。GenBank、EMBL等のデータベースより入手した塩基配列をもとに作製した遺伝子プライマーオリゴヌクレオチドの配列を記す。

[0097]

HD (huntington disease) : 5'-TCGTTCCTGTCGAGGATGAA (配列番号23), 5'-TCACT CCGAAGCTGCCTTTC (配列番号24)

IL-2 (interleukin-2):5'-ATGTACAGGATGCAACTCCTG (配列番号25),5'-TCATCT GTAAATCCAGCAGT (配列番号26)

KIT (c-kit): 5'-GATCCCATCGCAGCTACCGC (配列番号27), 5'-TTCGCCGAGTAGTCGCACGG (配列番号28)

FABP 2 (fatty acid binding protein 2, intestinal) : 5'-GATGAACTAGTCCAG GTGAGTT (配列番号29), 5'-CCTTTTGGCTTCTACTCCTTCA (配列番号30)

[0098]

上記の11種のプライマーについてPCR増幅を行なった結果、3株共に、全て、 あるいは一部のプライマーについて期待される増幅産物が確認された。E14/#4-4 、E14/#4-7株のように一部領域に欠失がみられるものもあった。以上の結果を図7に示す。図7において、左側にヒト4番染色体のGバンド像に基づく模式的な染色体地図、また、位置が明らかになっているいくつかのマーカーについてはどのバンドに位置するかを示した(実施例2参照)。遺伝子及び多型性マーカーの並び方は、現在までに入手出来る情報(実施例2参照)を基に、大まかな位置関係を示したもので、順序は必ずしも正確ではない。3種のG418耐性E14細胞株について、PCRにより期待される増幅産物が検出されたマーカーは■で、検出されなかったマーカーを口で示した。下側にはFISH解析による観察結果を示した。A9/#4は染色体供与細胞を示す。

[0099]

# (2) サザンブロット解析(図8)

サザンブロット解析は(実施例2)と同様に、E14/#4-4、E14/#4-7より取得したゲノムDNAについてヒトL1配列をプローブとして行なった。その結果、両株DNAにおいてヒトL1 配列とハイブリダイズするバンドが多数検出された。A9/#4と比較して、全体のシグナル強度はPCR解析で示された欠失の程度と相関していた。図8において、各レーンとも、Bg1II消化した2μgのゲノムDNAを使用した。<sup>32</sup>P標識ヒトL1配列をプローブとし、シグナルはイメージアナライザーBAS2000(富士写真フイルム社)により検出した。図8において、各レーンは、左から、1:A9/#4 (染色体供与細胞)、2:A9/#4+A9(1:2)、3:A9/#4+A9(1:9)、4:A9、5:E14/#4-7、6:E14/#4-4を示す。2、3は2種のDNAを括弧内に示した比率で混合したものである。左側にDNA分子量を示した。

[0100]

# (3) フルオレッセンスインサイチューハイブリダイゼーション (FISH)

FISH解析は(実施例2)と同様に、ヒト4番染色体特異的プローブ(CHROMOSO ME PAINTING SYSTEM, Cambio社)を用いて行なった。その結果、3株すべてのほとんどの分裂像において、ヒト4番染色体あるいはその部分断片が検出された。 E14/#4-4はマウス染色体に転座した形で、他の2株は独立した染色体として存在していた。観察されるヒト染色体の相対的な大きさは、PCR解析の結果から推測されるそれと一致していた。

以上の実験により、得られたG418耐性株はヒト4番染色体の全てあるいはその 部分断片を保持することが明かとなった。

#### [0101]

(実施例7) ヒト4番染色体部分断片を保持するES細胞からのキメラマウス作製ヒト4番染色体部分断片を保持していることが確認されたG418耐性ES細胞株E14/#4-4、E14/#4-7を凍結ストックより立ち上げ、(実施例3)と同様にして取得した胚盤胞期胚に胚あたり10~15個注入した。偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のES細胞注入胚を移植した。その結果を(表2)に示す。

[0102]

【表2】

表2. ヒト	、4番染色体	本(断片)を保持す	<b>FるE14</b>	細胞株か	らのキメ	ラマウン	ス作製
ES細胞株/ 比染色体	G418耐性 株番号	ES細胞を注入し た肝盤胞期胚数	子がなの数	キメラマウス の数	毛色^ ~10%	の貢献 10-30%	  李   30%~
E14/#4	4	160 80	8 5	5 2	5 1	- 1	-

#### [0103]

計240個の注入胚を移植した結果13匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、 毛色において宿主胚由来の野生色(濃茶)の中にE14細胞由来の薄灰色が認めら れるかどうかにより判定される。誕生した13匹のうち毛色に明らかに薄灰色の部 分のある、すなわち、E14細胞の貢献の認められる個体は7匹であった。また、最 高の貢献率はE14/#4-7由来の1個体において約15%であった。

この結果より、ヒト4番染色体部分断片を保持するマウスES細胞株E14/#4-4、E14/#4-7はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

#### [0104]

(実施例8)ヒト4番染色体部分断片を保持するES細胞由来キメラマウスにおけるヒト染色体DNAの保持及び、G418耐性遺伝子の発現確認

#### (1) PCR解析

(実施例7)で得られたキメラマウスのうちE14/#4-7由来の1個体(K#4-7-1

:キメラ率約5%)、E14/#4-4由来の1個体(K#4-4-41:キメラ率約5%)について(実施例4)と同様に尻尾よりゲノムDNAを調製した。それを鋳型とし、(実施例6)で示した4番染色体解析用プライマーのうちE14/#4-7、E14/#4-4で検出された多型性マーカーF11についてPCR解析を行なった。その結果、2個体とも期待される増幅産物が検出された。

[0105]

# (2) サザン解析(図9)

サザン解析は(実施例 2)と同様、E14/#4-7由来の1個体(K#4-7-1:キメラ率約5%)についてヒトL1配列をプローブとして用い、2μgの尻尾由来ゲノムDNAに対して行なった。その結果、多数のヒトL1配列の存在が認められ、そのパターンはE14/#4-7と類似していた。マウスゲノムに対する量比はE14/#4-7の約10%程度であった。図9において、各レーンとも、BglII消化した2μgの尻尾由来ゲノムDNAを使用した。<sup>32</sup>P標識ヒトL1配列をプローブとし、シグナルはイメージアナライザーBAS2000(富士写真フイルム社)により検出した。左側にDNA分子量を示した。各レーンは左から1:K#4-7-1、2:ブランク、3:E14/#4-7を示す。

[0106]

# (3) 尻尾由来繊維芽細胞のG418耐性試験

キメラマウスのうち、E14/#4-7由来の1個体(K#4-7-1:キメラ率約5%)、E14/#4-4由来の1個体(K#4-4-41:キメラ率約5%)について尻尾から以下のように繊維芽細胞を調製した。DNA調製(実施例4)と同様にキメラマウスの尻尾を5mm~10mm切断し、PBS/1mM EDTAで数回洗浄した後、メスで切れ込みをいれて表皮を除去し、内部の組織をメスで細かく切り刻む。組織細片を5mlのPBS/1mM EDTAをいれたチューブに移し、30分~1時間室温静置する。その後、1mlのPBS/EDTAを残して上清を取り除き、1mlの0.25%トリプシン/PBSを加え、5~10分間室温でタッピングあるいはピペッティングしながら組織をよくほぐす。1000rpm,10分間遠心し、沈殿を2mlのDMEM (10%FCS)に懸濁し、35mmシャーレに播種する。7~10日の培養後、トリプシン処理により細胞をシャーレからはがし、シャーレあたり約10<sup>4</sup>個の細胞を35mmシャーレ2枚に播種し、うち1枚に終濃度400μg/mlのG418を加え、5~7日間培養し、それぞれのシャーレの生細胞を観察する。この条件

で、野生型ICRマウス由来の繊維芽細胞は、G418存在下でほぼ100%死滅する。この結果、2個体共G418耐性の繊維芽細胞の存在が認められた。

これらの結果より、E14/#4-7、E14/#4-4はマウス個体において種々の正常組織に貢献し、かつヒト4番染色体部分断片を保持していることが確認された。

[0107]

(実施例9) マウスES細胞へのヒト14番染色体またはその断片の導入

染色体供与細胞として、(実施例1)で得られたヒト14番染色体を保持するマウスA9細胞株(以下A9/#14、という)を用いた。染色体受容細胞としてはマウスES細胞株TT2(ライフテックオリエンタル社より購入、Yagiら,Analytical Biochem.,214:70,1993)を用いた。TT2の培養法は〈相沢慎一,バイオマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995〉に記された方法に従い、栄養細胞はマイトマイシンC(シグマ)処理したG418耐性初代培養細胞(ライフテックオリエンタル社より購入)を用いた。ミクロセル融合実験およびG418耐性株の選択は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株の出現頻度はTT2細胞10<sup>7</sup>個あたり3~6個であった。薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。

[0108]

ヒト14番染色体の断片化はミクロセルにガンマ線照射することにより行なった (Koiら, Science, 260:361, 1993)。約10<sup>8</sup>個のA9/#14より取得したミクロセルを5mlのDMEMに懸濁し、ガンマセル40(前記)により、氷上で30Gyのガンマ線を 照射した (1.2Gy/分×25分)。ガンマ線照射したミクロセルを未照射ミクロセルと同様に融合、薬剤耐性株選抜を行なった結果、薬剤耐性株の出現頻度はTT 2 細胞10<sup>7</sup>個あたり3個であった。薬剤耐性株については(実施例2)と同様にして凍結保存、DNA取得を行なった。

ガンマ線未照射ミクロセル移入によるG418耐性株1-4、1-5、ガンマ線(30Gy) 照射ミクロセル移入によるG418耐性株3-1、3-2計4株におけるヒト14番染色体または部分断片の保持は以下の(1)、(2)により確認した。

[0109]

(1) PCR解析 (図10)

薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト14番染色体上に存在する遺伝子 (0'Brien, Genetic Maps,6th edition, Book 5, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1993) 及び多型性マーカー (Polymorphic STS Primer Pair BIOS社:D14S43, D14S51, D14S62, D14S65, D14S66, D14S67, D14S72, D14S75, D14S78, D14S81, PCI; Nature 359:794, 1992; Nature Genetics, 7:22, 1994) の存在をPCR法により検出した。GenBank、EMBL等のデータベースより入手した塩基配列をもとに作製した遺伝子プライマーオリゴヌクレオチドの配列を記す。

# [0110]

NP (nucleoside phosphorylase) : 5'-ATAGAGGGTACCCACTCTGG (配列番号31), 5'-AACCAGGTAGGTTGATATGG (配列番号32)

TCRA (T-cell receptor alpha): 5'-AAGTTCCTGTGATGTCAAGC (配列番号33), 5'TCATGAGCAGATTAAACCCG (配列番号34)

MYH6 (myosin heavy chain cardiac): 5'-TGTGAAGGAGGACCAGGTGT (配列番号35), 5'-TGTAGGGGTTGACAGTGACA (配列番号36)

IGA2 (immunoglobulin alpha-2 constant) : 5'-CTGAGAGATGCCTCTGGTGC (配列番号37), 5'-GGCGGTTAGTGGGGGTCTTCA (配列番号38)

IGG1 (immunoglobulin gamma-1 constant) : 5'-GGTGTCGTGGAACTCAGGCG (配列番号39), 5'-CTGGTGCAGGACGGTGAGGA (配列番号40)

IGM (immunoglobulin mu constant) : 5'-GCATCCTGACCGTGTCCGAA (配列番号41), 5'-GGGTCAGTAGCAGGTGCCAG (配列番号42)

IGVH3 (immunoglobulin heavy variable-3):5'-AGTGAGATAAGCAGTGGATG(配列番号43),5'-GTTGTGCTACTCCCATCACT (配列番号44)

# [0111]

薬剤耐性株4株のゲノムDNAを鋳型として、上記の18種のプライマーについて(実施例2) 同様にPCR増幅を行なった結果、全て、あるいは一部のプライマーについて期待される増幅産物が確認された。ガンマ線照射したミクロセルを用いて得られた薬剤耐性株3-1、3-2は、14番染色体の一部領域を欠失している傾向が認められた。また、未照射ミクロセルを用いた場合でも1-4株のごとく欠失がみられるものもあった。以上の結果を図10に示す。図10において、左側にヒト14番染色

体のGバンド像に基づく模式的な染色体地図、また、位置が明らかになっているいくつかのマーカーについてはどのバンドに位置するかを示した(実施例2参照)。遺伝子及び多型性マーカーの並び方は、現在までに入手出来る情報(実施例2参照)を基に、大まかな位置関係を示したもので、順序は必ずしも正確ではない。4種のG418耐性TT2細胞株について、PCRにより期待される増幅産物が検出されたマーカーは■で、検出されなかったマーカーを□で示した。A9/#14 は染色体供与細胞である。右端には実施例11(1)の結果が示されている。

#### [0112]

# (2) フルオレッセンスインサイチューハイブリダイゼーション (FISH)

FISH解析は(松原ら、FISH実験プロトコール、秀潤社、1994)に記された方法に従い、ヒト14番染色体特異的プローブ(CHROMOSOME PAINTING SYSTEM, Cambio社)を用いて行なった。その結果、4株すべてについてほとんどの分裂像に、ヒト14番染色体あるいはその部分断片が、独立した染色体として観察された。観察されるヒト染色体の相対的な大きさは、PCR解析の結果から推測されるそれと一致していた。

以上の実験により、得られたG418耐性株1-4、1-5、3-1、3-2はヒト14番染色体の全てあるいはその部分断片を保持することが確かめられた。

#### [0113]

(実施例10) ヒト14番染色体断片を保持するES細胞からのキメラマウス作製

(実施例9)で得られ、ヒト14番染色体を保持していることが確認されたG418 耐性ES細胞株4株(1-4、3-1、3-2、1-5)を凍結ストックより立ち上げ、 ICRあるいはMCH(ICR)(日本クレア社)雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり8~10個注入した。ES培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。その結果を(表3)に示す

#### [0114]

【表3】

表3. ヒト14番染色体 (断片) を保持するTT2 細胞株からのキメラマウス作製

ES細胞株/	G418耐性	ES細胞を注入した8細胞期胚数	子では	キメラマウス	毛色~	への貢献	<b>幸</b>
th染色体	株番号		の数	の数	~20%	20-50%	50-80%
TT2/#14	1-4 1-5 3-1 3-2	98 110 103 183	20 14 11 19	1 2 2 3	- 1 1 -	- 1 2	1 1 - 1

#### [0115]

計494個の注入胚を移植した結果、64匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚 (ICR) 由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した64匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は8匹であった。また、最高の貢献率は1-4由来の1個体における約80%であった。

この結果より、ヒト14番染色体またはその断片を保持するG418耐性ES細胞株(1-4、1-5、3-1、3-2)はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

#### [0116]

(実施例11) ヒト14番染色体断片を保持するES細胞由来キメラマウスにおける ヒト14番染色体断片の保持確認

(実施例10)で得られたキメラマウスにおけるヒト14番染色体部分断片の保持は以下の(1)~(3)により確認した。

# (1) 各種組織由来DNAを用いたPCR解析

キメラマウスのうち3-1由来の1個体(K3-1-1:キメラ率約25%)について(実施例4)と同様に尻尾よりゲノムDNAを調製した。それを鋳型とし、(実施例9)で示した14番染色体解析用プライマーのうち3-1で検出された14種全てについてPCR解析を行なった。その結果、14種すべてについて期待される増幅産物が検出された(図10)。

#### [0117]

さらに、同じ個体(K3-1-1)について脳、腎臓、脾臓、心臓、肝臓、胸腺から Puregene DNA Isolation KitによりゲノムDNAを取得し、それぞれの組織につい て、IGMプライマー(実施例9)を用いたPCR解析を行なった。その結果全ての組織において期待される増幅産物が確認された(図11)。PCR産物は2%アガロースゲルにて電気泳動した後、臭化エチジウム染色して検出した。図11において、各レーンは左からB:脳、K:腎臓、Sp:脾臓、H:心臓、L:肝臓、Th:胸腺、pc:ヒト繊維芽細胞(HFL-1)DNA(陽性コントロール)、nc:非キメラマウス尻尾DNA(陰性コントロール)、N:マーカー(HindIII消化 λ DNA+HaeIII消化 φ X174DNA,宝酒造)を示す。

[0118]

# (2) 尻尾由来繊維芽細胞のG418耐性試験

キメラマウスのうち、3-2由来の2個体(K3-2-1:キメラ率約25%,K3-2-3:キ メラ率約50%)、1-4由来の1個体(K1-4-1:キメラ率約80%)について尻尾から以 下のように繊維芽細胞を調製した。DNA調製(実施例4)と同様に3~6週令の キメラマウスの尻尾を5mm~10mm切断し、PBS/1mM EDTAで数回洗浄した後、メス で切れ込みをいれて表皮を除去し、内部の組織をメスで細かく切り刻む。組織細 片を5mlのPBS/1mM EDTAをいれたチューブに移し、30分~1 時間室温静置する。 その後、1mlのPBS/EDTAを残して上清を取り除き、1mlの0.25%トリプシン/PBSを 加え、5~10分間室温でタッピングあるいはピペッティングしながら組織をよく ほぐす。1000rpm,10分間遠心し、沈殿を2mlのDMEM(10%FCS)に懸濁し、35mmシ ャーレに播種する。7~10日の培養後、トリプシン処理により細胞をシャーレか らはがし、シャーレあたり約 $10^4$ 個の細胞を35mmシャーレ4枚に播種し、うち2枚に400μg/mlのG418を加え、5~7日間培養し、それぞれのシャーレの生胞数 をカウントする。この条件で、野生型ICRマウス由来の繊維芽細胞は、G418存在 下でほぼ100%死滅する。非選択培地での生細胞数に対する選択培地での生細胞数 の割合は、G418耐性繊維芽細胞の増殖速度が2つの条件で同等であると仮定すれ ば、G418耐性ES細胞株由来繊維芽細胞の繊維芽細胞集団における貢献率を反映し ていると考えられる。この結果、(図12)に示した通り、3個体共G418耐性の繊 維芽細胞の存在が認められた。図12において、耐性率はそれぞれの個体について 2組の選択/非選択35mmシャーレから得られた値を平均した。ICR は野生型ICR マウスを示す。

[0119]

# (3) 尻尾由来G418耐性繊維芽細胞のFISH解析

(実施例2)と同様な方法で、上記(2)で得られたG418耐性繊維芽細胞(K3-2-3,K1-4-1由来)のFISH解析を行なった。プローブはHFL-1細胞(実施例1)より抽出したヒト全DNAをFITC標識した(松原ら,FISH実験プロトコール,秀潤社,1994)ものを用いた。その結果、2個体共、ほとんどの分裂像に独立したヒト染色部分断片が観察された。

これらの結果より、ヒト14番染色体部分断片を保持したTT 2 細胞株はマウス個体において種々の正常組織に貢献し、かつヒト14番染色体部分断片を保持していることが確かめられた。

[0120]

(実施例12) ヒト2番染色体部分断片のES細胞への導入

染色体供与細胞として、(実施例1)で得られたヒト2番染色体部分断片を保持するマウスA9細胞W23(以下A9/#2 W23、という)を用いた。染色体受容細胞としてはマウスES細胞株TT2(実施例9)を用いた。ミクロセル融合実験およびG4 18耐性株の選択は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株の出現頻度はTT2 細胞10<sup>77</sup>個あたり1~3個であった。薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。薬剤耐性株5-1、5-2、5-3におけるヒト2番染色体部分断片の保持は以下の(1)、(2)により確認した。

[0121]

# (1) PCR解析

薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト2番染色体上に存在する遺伝子 (Genet ic Maps,前記) のうち、染色体供与細胞A9/#2 W23において検出された $C\kappa$ 、FAB P1の存在をPCR法により検出した。

各プライマーについてPCR増幅を行なった結果、3株共に、両方のプライマーについて期待される増幅産物が確認された。

[0122]

(2) フルオレッセンスin situハイブリダイゼーション (FISH)

FISH解析は(実施例2)と同様な方法で、ヒト2番染色体特異的プローブ(CH

ROMOSOME PAINTING SYSTEM, Cambio社)を用いて行なった。その結果、3株すべてのほとんどの分裂像において、ヒト2番染色体部分断片が独立した染色体として検出された。その大きさはA9/#2 W23で観察されたものと同等であった。

以上の実験により、得られたG418耐性株はヒト2番染色体部分断片を保持する ことが確かめられた。

[0123]

(実施例13) ヒト2番染色体断片を保持するES細胞からのキメラマウス作製

(実施例12)で得られ、ヒト2番染色体部分断片を保持していることが確認されたG418耐性ES細胞株5-1を凍結ストックより立ち上げ、 ICRあるいはMCH(ICR) (日本クレア社)雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

キメラ作製の結果を(表4)に示す。

[0124]

【表4】

表4. ヒト2番染色体(断片)を保持するTT2 細胞株からのキメラマウス作製 ES細胞株/G418耐性 ES細胞を注入し とい染色体 株番号 た8細胞期胚数 キメラマウス 毛色への貢献率 ~20% 20-50% 50-80% 子マウス の数 の数 7 6 TT2/#2 264 51 18 5 <u>5–1</u> (W23)

#### [0125]

計264個の注入胚を移植した結果、51匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚 (ICR) 由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色 (濃茶) が認められるかどうかにより判定される。誕生した51匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は18匹であった。また、最高の貢献率は約80%であった。

この結果より、ヒト2番染色体部分断片を保持するG418耐性ES細胞(5-1)は キメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を 保持していることが確認された。

#### [0126]

(実施例14) ヒト14番染色体断片導入キメラマウス血清におけるヒト抗体重鎖の 検出

血清中のヒト抗体濃度をエンザイムリンクドイムノソルベントアッセイ(ELISA )を用いて測定した。ELISA は以下に記載されている方法に従った。富山・安東 、単クローン抗体実験マニュアル、講談社、1987;安東・千葉、単クローン抗体 実験操作入門、講談社、1991;石川、超高感度酵素免疫測定法、学会出版センタ - 1993; Ed Harlow and David Lane, Antibodies A Laboratory Manual, Col d Spring Harbor Laboratory, 1988; A. Doyle and J.B. Griffiths, Cell & Ti ssue Culture: Laboratory Procedures, John Wiley & Sons Ltd., 1996 。これ らの文献に記載の方法を参考にして、測定系によっては反応時間や温度を4℃で 終夜行うなどの改良を行った。測定しようとするヒト免疫グロブリンに対する抗 体あるいは抗原を、0.5 から10μg/ml程度に(100から5000倍) に希釈し、ELISA プレートを4℃で一晩コーティングした。血清試料の測定では、ブロッキング、 試料および標識抗体の希釈に5%マウス血清 (シグマ、M5905)を添加したPBSを、 ハイブリドーマ培養上清の測定には1%牛胎児血清を添加したPBSを用いた。20倍 にキメラマウス血清を希釈する場合にはPBSを用いて希釈した。コーティングし たプレートを洗浄した後、ブロッキングを1時間以上行った。プレートを洗浄後 、試料を加え30分以上インキュベートした。プレート洗浄後100 から5000倍に希 釈した酵素標識抗ヒト免疫グロブリン抗体を加えて、1時間以上インキュベート した後、プレートを洗浄し基質液を加えて発色させた。また測定系によって、基 本的には同じ操作で、ビオチン標識した抗体を用い、プレート洗浄後これにアビ ジンー酵素複合体を加えてインキュベートした後洗浄し基質液を加えた。マイク ロプレートリーダー(バイオテック、EL312e)で吸光度を測定した。

# [0127]

生後29日から35日のキメラマウス (実施例10、K3-1-2, K3-2-2, K3-2-3) より 採血しELISAで解析した。50mMの炭酸ー炭酸水素バッファーpH9.6で希釈した抗ヒトIgMマウスモノクローナル抗体 (シグマ,I6385) を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、マウス血清 (シグマ、M5905) を加えたPBSで希釈した血 清試料を加えた。次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒトIgMヤギ抗体(Tago,2392)を加えてインキュベートした後、ABTS基質(Kirkegaard & Perry Laboratories Inc.,506200)の添加により酵素活性を405nmの吸光度で評価した。精製されたヒトIgM抗体(オルガノン・テクニカ,6001-1590 )またはヒトIgG抗体(シグマ,14506)を標準とした。標準はマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。またヒトIgG測定には抗ヒトIgGヤギ抗体(シグマ,13382)をプレートに固定し、ペルオキシダーゼ標識抗ヒトIgGヤギ抗体(シグマ,A0170)で検出した。その結果を(表5)に示す。ヒトIgMとIgGは共に検出された。

[0128]

また生後27日、34日、41日の3回にわたりヒト14番染色体断片を保持したキメラマウス (実施例10、K3-1-1, K3-2-1) に、PBSに溶解したヒト血清アルブミン (HSA,シグマ,A3782) 2mlをアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Reseach Inc.) と混合しその0.25mg/ml を0.2 mlを免疫した。このキメラマウス血清も同様にELISAによって解析した。その結果を(図13、図14)に示す。結果は、HSAで免疫したキメラマウス血清中のヒト抗体濃度は免疫後上昇し、個体K3-1-1ではヒトIgM18 $\mu$ g/mlとIgG2.6 $\mu$ g/mlが免疫後17日目の血清中に検出された。ヒト染色体を導入していないマウスの血清ではヒト抗体の力価は有意ではなかった。

[0129]

#### 【表5】

表5.キメラマウス血清中のヒト抗体濃度(ELISA)

キメラマウス	IgG (mg/l)	IgM (mg/l)	
K3-1-2	0.37	3.7	
K3-2-2	0.33	5.9	
K3-2-3	0.51	3.4	

[0130]

(実施例15) ヒト14番染色体導入キメラマウスからのヒト抗体重鎖産生ハイブ

#### リドーマ取得

(実施例14) においてヒトアルブミンで免疫したキメラマウス(K3-1-1,実施例14) から生後44日目に脾臓を取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリ

ドーマを作製した。ハイブリドーマの作製法は〈安東、単クローン抗体実験操作 入門、講談社サイエンティフィク,1991〉に記された方法に従い、ミエローマ細 胞としては、P3X63-Ag.8.653(大日本製薬より購入、05-565)を使用した。96穴 プレート10枚にまき込み、1週間培養後培養上清をELISA法で解析した。ELISA法 は抗ヒトIgMマウスモノクローナル抗体(シグマ、I6385)をプレートに固定化し て実施例14と同様に行ない、陽性のクローンを6個得た。またHSAを抗原とし50m Mの炭酸 - 炭酸水素バッファーpH9.6で濃度  $5 \mu g/ml$ の溶液とし、ELISAプレートの全ウエルに100μlづつ分注した。ペルオキシダーゼで標識した抗ヒトIgA+IgG+ IgMヤギ抗体 (Kirkegaard & Perry Laboratories Inc., 04-10-17) を用いて検 出した。プレート10枚中陽性のクローンを1つ確認した。このクローンは6個の ヒトIgM陽性クローンのうちの1つであった。このクローン(H4B7)をさらに培 養し、培養上清を希釈しHSAを抗原として上述のようにペルオキシダーゼ標識抗 ヒトIgMヤギ抗体(Tago, 2392)を用いてELISAを行なったところ、培養上清の 希釈率の増加にともなって吸光度の減少が認められた。一方ヒトIgM(オルガノ ン・テクニカ,6001-1590)を培地によって2 μg/mlに希釈した試料では希釈率に よらず吸光度は低かった。これはハイブリドーマH4B7が生産する抗体がHSAに特 異性のある抗体であることを示唆するものである(図15)。図15において、横軸 は培養上清試料の希釈率を縦軸は405nmにおける吸光度を示した。

# [0131]

(実施例16) G418耐性マーキングされたヒト2番染色体断片のピューロマイシン耐性による再マーキング

G418耐性で標識されたヒト2番染色体断片を保持するA9細胞(W23)(実施例1、図1参照)を100mmシャーレでG418(800  $\mu$  g/ml)を含む選択培地(10%FBS、D MEM)で培養した。ピューロマイシン耐性遺伝子を含むプラスミドpPGKPuro (WH ITEHEAD INSTITUTE,Dr.Peter W.Laird から分与)をトランスフェクション前に制限酵素SalI(宝酒造)で線状化した。細胞をトリプシン処理し、 $5x10^6$  個/ml となるようにダルベッコのリン酸バッファー(PBS)に懸濁してから $10 \mu$  gDNA存在下でジーンパルサー(バイオラッド)を用いてエレクトロポレーション(実施例1参照)を行なった。 $25 \mu$ Fの容量で10000Vの電圧を4 mm長のエレクトロポレー

ションセル(実施例1)を用いて室温で印加した。エレクトロポレーションした 細胞を100mmシャーレ3~6枚に播種した。1日後に10μg/mlのピューロマイシン(シグマ,P-7255)およびG418(800μg/ml)を含む二重選択培地と置き換えた。2~3週間後に生じたコロニー200個程度を一つの集団としてまとめた。この 細胞を3つの集団についてそれぞれ25cm²フラスコ2~3本中で培養し、ミクロセルを形成させ25cm²フラスコで培養したマウスA9細胞と実施例1と同様に融合した。100mmシャーレ2枚に移しG418とピューロマイシンを含む上記の二重選択培地で培養し、3つの集団のうち1つの集団から2つの二重薬剤耐性クローンが得られた。このクローンではヒト2番染色体断片にピューロマイシン耐性マーカーが導入された可能性が高い。

[0132]

(実施例17) ヒト染色体導入ES細胞における導入ヒト染色体倍加

G418耐性遺伝子でマーキングされたヒト14番染色体断片を保持するES細胞株(E14/#14-36)を、高濃度のG418を添加した培地中で培養することにより、ヒト染色体が倍化したES細胞のクローンを取得した(バイオマニュアルシリーズ8、ジーンターゲティング、羊土社、1995)。G418耐性マウス初代細胞(ライフテックオリエンタルより購入)をマイトマイシン処理することなく100mmシャーレに播種し栄養細胞とした。この100mmシャーレにE14/#14-36を播種し、半日後G418濃度16mg/mlの培地と交換した。1~2日毎に培地交換し1週間後にG418濃度を10mg/mlとして培養を続け、生じたコロニーの中から15個を取り出し培養し、染色体をヒト14番特異的プローブ(実施例9参照)を用いてFISH解析した。結果として8クローンでヒト14番染色体断片が倍化していた。

[0133]

(実施例18) ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞株の取得

(実施例16) において取得した二重薬剤耐性クローンのうちPG1をミクロセル 供与細胞、野性型A9細胞を受容細胞としたミクロセル移入実験により、PG1が保 持するヒト2番染色体部分断片がさらにピューロマイシン耐性遺伝子によりマー キングされていることを確認した。ミクロセル取得及びA9細胞との融合は(実施

例1)と同様に行なった。その結果、ミクロセル融合10日後に計59個のG418耐性 コロニーが出現した。これらのコロニーについて 8 μg/mlのピューロマイシンを 含む培地に交換後、さらに3日間培養したところ、45個 (76%) のコロニーが生 存した。ミクロセル法においては、1つの受容細胞に、多くの場合1本あるいは 少数の染色体のみが移入されることから、両耐性遺伝子が高率に同時に移入され ることは、すなわち、PG1が保持するG418耐性標識されたヒト2番染色体部分断片 がピューロマイシン耐性遺伝子によりマーキングされていることを示している。 さらに、ヒト2番染色体部分断片上の各マーカー遺伝子検出のため、A9/#2 W23 (G418耐性のみ: 実施例16) についてはpSTneoB (実施例1)、PG1についてはpP GKPuro (実施例16)をプローブとしたFISH解析を行なった(松原ら,FISH実験プ ロトコール,秀潤社,1994)。その結果、A9/#2 W23では(実施例12)で確認さ れたヒト2番染色体部分断片のそれぞれの姉妹染色分体上に1個づつ、計2個のシ グナルが観察された。これは、ヒト2番染色体部分断片上の1箇所にpSTneoBが 挿入されていることを示す。また、PG1では同等の大きさの染色体断片上に計4 個のシグナルが観察された。pSTneoBとpPGKPuroはベクター部分で相同の配列を 持つので、pPGKPuroプローブではpSTneoBも検出される。すなわち、PG1で観察さ れた4個のシグナルのうち、2個はpSTneoB、一方の2個はpPGKPuro由来のシグナ ルと考えられる。この結果より、PG1が保持するヒト2番染色体部分断片は、G41 8耐性、ピューロマイシン耐性両者によりマーキングされていることが確認され た。

#### [0134]

ヒト2番染色体部分断片、14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞取得のため、染色体供与細胞としてこのPG1細胞株を用いた。染色体受容細胞としてはすでにヒト14番染色体部分断片を保持しているG418耐性TT2細胞株1-4(実施例9)を用いた。ミクロセル融合実験およびピューロマイシン耐性株の選択は0.75 $\mu$ g/mlのピューロマイシン濃度で他は(実施例9)のG418耐性株選択の場合と同様に行なった。この結果出現したピューロマイシン耐性株の出現頻度は1-4細胞 $10^7$ 個あたり3~7個であった。これらのピューロマイシン耐性株は300 $\mu$ g/mlのG418存在下でも増殖することからG418耐性も同時に保持していることが確認さ

れた。二重薬剤耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例 2)と同様に行なった。ヒト2番染色体部分断片及び、ヒト14番染色体部分断片の保持は二重薬剤耐性株PG5、PG15、PG16については以下の(1)により、PG15についてはさらに(2)により確認した。

[0135]

# (1) PCR解析

二重薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト2番、14番染色体上に存在する遺伝子(Genetic Maps,前記)のうち、2番染色体については(実施例12; A9/#2 W23)、14番染色体については(実施例9; TT2/#14 1-4)で存在が確認されている各プライマーについてPCR増幅を行なった結果、3株共に、全てのプライマーについて期待される増幅産物が確認された。

[0136]

# (2) フルオレッセンスin situハイブリダイゼーション (FISH)

FISH解析は(実施例11)と同様に、ヒト全DNAをFITC標識したものをプローブとして用いて行なった。その結果、ほとんどの分裂像において、大小2つのヒト染色体断片が確認された。大きい方は(実施例9;TT2/#14 1-4)でヒト14番染色体特異的プローブにより確認された部分断片と、小さい方は(実施例12;TT2/#2 5-1)でヒト2番染色体特異的プローブにより確認された部分断片と同等の大きさであった。(図16)にその結果を示す。図中輝度の低い染色体はマウス由来のもの、FITCの蛍光により輝度の高い大小2つの染色体断片(矢印にて指示)はヒト由来のものであり、それぞれヒト14番、2番染色体部分断片と考えられる。

以上の実験により、得られた二重耐性ES細胞株はヒト2番染色体部分断片、14 番染色体部分断片を同時に保持することが確かめられた。

[0137]

(実施例19) ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞株からのキメラマウス作製

(実施例18)で得られ、ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持していることが確認されたG418、ピューロマイシン二重耐性TT2細胞株PG5、PG15、PG16を凍結ストックより立ち上げ、 ICRまたはMCH(ICR)(日本クレア社)

雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

キメラ作製の結果を(表6)に示す。

[0138]

【表 6】

表6.ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞株 からのキメラマウス作製

ES細胞株/ th染色体	2重耐性 株番号	ES細胞を注入し た8細胞期胚数	子マウス の数	もメラマウス の数	毛色/~10%	の貢献	率 50%~
TT2/ #14+#2	PG5 PG15 PG16	160 168 223	26 15 32	8 3 12	7 1 3	1 2 6	- 3

# [0139]

計551個の注入胚を移植した結果、73匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した73匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は23匹であった。

この結果より、ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持するES 細胞株 (PG5、PG15、PG16) はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

#### [0140]

(実施例20) ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を同時に保持する ES細胞由来キメラマウス血清におけるヒト抗体の検出

(実施例19)で作製したキメラマウスのうち、KPG-15 (9週齢;PG5由来、キメラ率10%)、KPG-18 (5週齢;PG5由来、キメラ率10%)の2匹に対して、PBSに溶解したヒト血清アルブミン (HSA、シグマ、A3782)とアジュバント (MPL+TD M Emulsion、RIBI Immunochem Reseach Inc.)とを混合して0.25mg/mlのHSA溶液を調整し0.2mlを免疫した。免疫直前、及び8日後のキメラマウスより採血し、血清中のヒト抗体μ鎖およびヒト抗体κ鎖をELISA法を用いて検出した(実施例14参照)。50mMの炭酸ー炭酸水素バッファーpH9.6で希釈した抗ヒト抗体κ鎖ヤ

ギ抗体(VECTOR LABORATORIES, INC.、AI-3060)を96穴マイクロタイタープレー トにコーティングし、血清試料を加え、次いでビオチン標識抗ヒト抗体κ鎖ヤギ 抗体 (VECTOR LABORATORIES, INC.、BA-3060) を加えてインキュベートしさらに ビオチン化ワサビペルオキシダーゼとアビジンDHの複合体(VECTOR LABORATORIE S,INC.、Vectastain ABCキットPK4000) を加えてインキュベートした後、ペルオ キシダーゼ基質として3,3',5,5'-テトラメチルベンチジン(TMBZ、住友ベークラ イト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製され たκ鎖を持つ濃度既知のヒトIgG(シグマ、I-3889)を標準としマウス血清を添 加したPBSで段階的に希釈した。μ鎖については50mMの炭酸-炭酸水素バッファ ーpH9.6で希釈した抗ヒトμ鎖マウスモノクローナル抗体(シグマ、I-6385)を 96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでペル オキシダーゼ標識抗ヒトμ鎖マウス抗体(The Binding Site Limited、 MP008) を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加に より酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製されたμ鎖を持つ濃度既知のヒ トIgM(オルガノン・テクニカ、6001-1590)を標準としマウス血清(シグマ、M5 905) を添加したPBSで段階的に希釈した。その結果、2個体とも免疫前において ヒト抗体μ鎖、κ鎖両者が検出され、その血清中濃度は、免疫後上昇した(表7 、表8)。

[0141]

【表7】

表7. キメラマウスKPG15中のヒト抗体濃度 (ELISA) IgM (mg/l) Igκ (mg/l)

		- 0 11 ( 0 7 - 7
免疫前 免疫後8日目	0.19 0.75	1.6 1.7

[0142]

【表 8】

表8. キメラマウスKPG18中のヒト抗体濃度(ELISA) IgM(mg/l) Igκ(mg/l)

	<del></del>	
免疫前	0. 29	0.57
免疫後8日目	3. 4	0.87

[0143]

この結果より、ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持するES 細胞由来キメラマウスにおいてヒト抗体重鎖、軽鎖遺伝子は機能することが確認された。

[0144]

(実施例21) ヒト14番染色体断片導入キメラマウス血清における抗HSAヒト抗体 γ鎖の検出

(実施例10)と同様にして作製したヒト14番染色体断片を保持したキメラマウ ス(K9、K11; 共にTT2細胞株3-2由来、キメラ率はそれぞれ50%、30%) に対して 、生後79日、93日、107日、133日の4回 (K9) 、または生後74日、88日、111日 ( K11) の3回にわたり(実施例20)と同様にHSAを免疫した。このキメラマウス血 清中のヒト血清アルブミンに対するヒトγ鎖を含む抗体をELISA法によって検出 した(実施例14参照)。50mMの炭酸-炭酸水素バッファーpH9.6で希釈したHSA (シグマ、A 3782) を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、試料を 加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒトIgGマウス抗体(ファーミンジェン、0 8007E) を加えてインキュベートした後、ペルオキシダーゼ基質として0-フェニ レンジアミン (OPD、住友ベークライト、ML-11300) の添加により酵素活性を490 nmの吸光度で評価した。HSAで免疫したキメラマウス血清中の抗HSAヒトIgGの力 価は免疫後上昇した。対照ICRマウスでは、HSA免疫後の抗HSAヒトIgGの力価はバ ックグランドレベルであった。結果を(図17)に示した。図17において横軸はキ メラマウスにHSAを免疫してからの日数を、縦軸は490nmにおける吸光度を示した 。この結果より、ヒト14番染色体部分断片を保持するキメラマウスにおいて、HS A抗原刺激に対して抗原特異的ヒトIgGの抗体価上昇が起こることが確認された。

[0145]

(実施例22)ヒト22番染色体断片導入キメラマウス血清におけるヒト抗体λ鎖の 検出

9ヶ月齢のキメラマウス(実施例3、K22-7;キメラ率10%)より採血し、血 清中のヒト抗体λ鎖をELISA法を用いて検出した(実施例14参照)。50mMの炭酸 -炭酸水素バッファーpH9.6で希釈した抗ヒト抗体λ鎖ヤギ抗体(VECTOR LABORA TORIES, INC.、AI-3070)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでビオチン標識抗ヒト抗体 2 鎖ヤギ抗体(VECTOR LABORATOR LES, INC.、BA-3070)を加えてインキュベートしさらにビオチン化ワサビペルオキシダーゼとアビジンDHとの複合体(VECTOR LABORATORIES, INC.、Vectastain ABCキットPK4000)を加えてインキュベートした後、ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された 2 鎖を持つ濃度既知のヒト IgG(シグマ、I-4014)を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。180ng/mlのヒト IgGに相当する濃度のヒト抗体 2 鎖がキメラマウス中に検出された。この結果より、ヒト22番染色体を保持するキメラマウスにおいてヒト抗体 2 鎖遺伝子が機能することが確認された。

#### [0146]

(実施例23) ヒト2番染色体断片導入キメラマウス血清におけるヒト抗体 κ鎖の 検出

5週齢のキメラマウス(実施例13、K2-8、キメラ率は70%)および9週齢のキメラマウス(実施例13、K2-3、K2-4、K2-12、キメラ率はそれぞれ50%、20%、80%)より採血し、血清中のヒト抗体κ鎖をELISA法を用いて検出した(実施例14)。50mMの炭酸一炭酸水素バッファーpH9.6で希釈した抗ヒト抗体κ鎖ヤギ抗体(VECTOR LABORATORIES,INC.、AI-3060)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでビオチン標識抗ヒト抗体κ鎖ヤギ抗体(VECTOR LABORATORIES,INC.、BA-3060)を加えてインキュベートしさらにビオチン化ワサビペルオキシダーゼとアビジンDHの複合体(VECTOR LABORATORIES,INC.、Vectastain ABCキット)を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された κ鎖を持つ濃度既知のヒトIgG(シグマ、I-3889)を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。結果を(表9)に示した。

#### [0147]

# 【表9】

表9. キメラマウス中のヒー・メラマウス	ト抗体 κ 鎖濃度 (ELISA) Ig κ (mg/l)
$\begin{array}{c} & \text{K}2-3 \\ & \text{K}2-4 \\ & \text{K}2-8 \\ & \text{K}2-12 \end{array}$	124 85 25 56

# [0148]

またヒト2番染色体断片を保持したキメラマウス(実施例13、K2-3、およびK2 -4) に生後66日、80日、102日の3回にわたり(実施例20)と同様にHSAを免疫し た。またキメラマウス(K2-12)に生後63日、77日、91日、116日の4回にわたり 、このキメラマウス血清中のHSAに対するヒト抗体κ鎖をELISA法によって検出し た(実施例14参照)。50mMの炭酸-炭酸水素バッファーpH9.6で希釈したHSA( シグマ、A 3782)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、試料を加 え、次いでビオチン標識抗ヒト抗体κ鎖ヤギ抗体(VECTOR LABORATORIES,INC.、 BA-3060) を加えてインキュベートしさらにビオチン化ワサビペルオキシダーゼ とアビジンDHの複合体(VECTOR LABORATORIES, INC.、Vectastain ABCキット)を 加えてインキュベートした後、ペルオキシダーゼ基質としてOPD(住友ベークラ イト、ML-11300)の添加により酵素活性を490nmの吸光度で評価した。HSAで免疫 したキメラマウス血清中の抗HSAヒトκ鎖の力価は免疫後上昇した。一方対照ICR マウスでは、HSA免疫後の抗HSAヒト抗体κ鎖の力価はバックグランドレベルであ った。結果を(図18)に示した。図18において横軸はキメラマウスにHSAを初め て免疫してからの日数を、縦軸は490nmにおける吸光度を示した。これらの結果 より、ヒト2番染色体部分断片を保持するキメラマウスにおいてヒト抗体κ鎖遺 伝子が機能し、さらにはHSA抗原刺激に対して抗原特異的ヒトIgκの抗体価上昇 が起こることが確認された。

#### [0149]

(実施例24) ヒト14番染色体導入キメラマウスからのヒト抗体重鎖 (μ鎖もしくはγ鎖) 産生ハイブリドーマ取得

(実施例21) においてHSAで免疫したキメラマウスK9から生後136日目に脾臓を

取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。ハイブリ ドーマの作製法は〈安東・千葉、単クローン抗体実験操作入門、講談社サイエン ティフィク,1991〉に記された方法に従い、ミエローマ細胞としては、Sp-2/0-A g14(大日本製薬、05-554)を使用した。培養液にORIGEN Hybridoma Cloning Fa ctor (HCF、ボクスイ・ブラウン) を10%添加し96穴プレート8枚にまき込み、3 日後に培養液中にG418を1mg/ml添加した。1~3週間培養後の培養上清をELISA 法で解析した(実施例14参照)。μ鎖は50mMの炭酸ー炭酸水素バッファーpH9.6 で希釈した抗ヒトμ鎖マウスモノクローナル抗体(シグマ、I-6385)を96穴マイ クロタイタープレートにコーティングし、PBSで希釈した試料を加え、次いでペ ルオキシダーゼ標識抗ヒトμ鎖マウス抗体 (The Binding Site Limited、MP008 ) を加えてインキュベートした後、基質として2,2-アジノジー (3-エチルベ ンズチアゾリン-6-スルホン酸)ジアンモニウム塩(ABTS、Kirkegaard&Perry La boratories Inc.、04-10-17) を用いて検出し7個の陽性ウェルを得た。γ鎖につ いては抗ヒトγ鎖マウスモノクローナル抗体(シグマ、I-6260)を96穴マイクロ タイタープレートにコーティングし、PBSで希釈した試料を加え、次いでペルオ キシダーゼ標識抗ヒトγ鎖マウス抗体(ファーミンジェン、 08007E) を加えて インキュベートした後、ABTS(Kirkegaard & Perry Laboratories Inc.、04-10-17) を用いて検出し2個のヒト抗体γ鎖陽性ウェルを得た。

[0150]

(実施例25)ヒト2番染色体導入キメラマウスからのヒト抗体軽鎖産生ハイブリドーマ取得

(実施例23)においてHSAで免疫したキメラマウスK2-3から生後105日目に脾臓を取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。ハイブリドーマの作製法は〈安東・千葉、単クローン抗体実験操作入門、講談社サイエンティフィク,1991〉に記された方法に従い、ミエローマ細胞としては、P3X63Ag8.653(大日本製薬、05-565)を使用した。培養液にHCF(ボクスイ・ブラウン)を10%添加し96穴プレート10枚にまき込み、3日後培養液中にG418を1mg/m1添加し、1~3週間培養しコロニーが出現したウェルの培養上清をELISA法で解析した。ELISA法は(実施例23)と同様に行ない、ヒト抗体κ鎖陽性のクローンを

2個得た。

[0151]

(実施例26) G418耐性マーキングされたヒト22番染色体のピューロマイシン耐性 による再マーキング

G418耐性で標識されたヒト22番染色体を保持するA9細胞(A9/#22γ2;実施例 1で取得)について、(実施例16)と同様な方法でヒト22番染色体のピューロマ イシン耐性による再マーキングを行った。γ2細胞にpPGKPuroをエレクトロポレ ーションして得られた二重薬剤耐性株コロニー200個程度を一つの集団とし、3つ の集団(P1、P2、P3)を供与細胞として野生型マウスA9細胞へのミクロセル移入 を行なった。その結果、P1より6個、P2より1個、P3より3個の二重薬剤耐性ク ローンが得られた。取得した二重薬剤耐性クローンのうちP3由来の6-1 をミクロ セル供与細胞、野性型A9細胞を受容細胞としたミクロセル移入実験により、ヒト 22番染色体がさらにピューロマイシン耐性遺伝子によりマーキングされているこ とを確認した(実施例18)。ミクロセル取得及びA9細胞との融合は(実施例1) と同様に行なった。その結果、ミクロセル移入11日後に28個のG418耐性コロニー が出現した。これらのコロニーについて8μg/mlのピューロマイシンを含む培地 に交換した後、さらに3日間培養したところ、21個(75%)のコロニーが生存した 。ミクロセル法においては、1つの供与細胞に、多くの場合1本あるいは少数の 染色体のみが移入されることから、両耐性遺伝子が高率に同時に移入されること は、すなわち、6-1 が保持するG418耐性標識されたヒト22番染色体がさらにピュ ーロマイシン耐性遺伝子によりマーキングされていることを示している。

[0152]

(実施例27) ヒト抗体重鎖を産生するハイブリドーマからのヒト抗体重鎖可変領域cDNAの取得及び塩基配列決定

(実施例15) において取得されたヒト抗体重鎖 (IgM) を産生するハイブリドーマのうち、H4B7 (HSA特異的) 及びH8F9 (非特異的) より、ISOGEN (ニッポンジーン) を使用して、総RNAを取得した。cDNAの合成は、Ready-To-Go T-primed 1st strandキット (Pharmacia社) を用い各々5μgの総RNAを使用した。得られたcDNAについて下記に示したプライマー (Larrickら, BIO/TECHNOLOGY, 7, 934-

, 1989、Wordら, Int. Immunol., 1, 296-, 1989を参考に作製)によりPCRを行ない、ヒト抗体重鎖可変領域を増幅した。

[0153]

CM1 (ヒトIgM定常領域):5'-TTGTATTTCCAGGAGAAAGTG (配列番号45)

CM2 (同上):5'-GGAGACGAGGGGGAAAAGGG (配列番号46)

HS1 (ヒト重鎖可変領域) : 5'-ATGGACTGGACCTGGAGG (AG)TC (CT)TCT (GT)C (配列番号47) (8種の混合物)

HS 2 (同上):5'-ATGGAG(CT)TTGGGCTGA(GC)CTGG(GC)TTT(CT)T(配列番号48) (16種の混合物)

HS3 (同上): 5'-ATG(AG)A(AC)(AC)(AT)ACT(GT)TG(GT)(AT)(GCT)C(AT)(CT)(GC)(CT)CTG(配列番号49) (6144種の混合物)

\*()はその位置の塩基が()内のいずれかからなる混合物であることを示す。

[0154]

H4B7、H8F9共に、1回目のPCRはHS1×CM1、HS2×CM1、HS3×CM1の3種 のプライマーの組み合わせについて行い(94 $\mathbb{C}$  1 分、50 $\mathbb{C}$  2 分、72 $\mathbb{C}$  3 分、40 $\mathbb{T}$ イクル、パーキンエルマー社、サーマルサイクラー140使用)、そのPCR産物をそ れぞれHS1×CM2、HS2×CM2、HS3×CM2のプライマーで再度増幅した(温度 条件は前記同様、30サイクル)。増幅産物は1.5%アガロース電気泳動後、臭化エ チジウム染色することにより検出した。その結果、H4B7についてはHS3×CM2の プライマーで約490bpの増幅産物が確認された。また、H8F9については、HS3×C M2プライマーで微かなバンドが同様の位置に確認されたのでこのプライマーで 再度増幅した(温度条件は前記同様、30サイクル)。その結果、増幅産物は非常 に強いシグナルとして検出された。これらのPCR産物は、石田ら(遺伝子発現実 験マニュアル、講談社サイエンティフィク、1995)の方法に従い、pBlueScriptI I SK+ (Stratagene社) ベクターのSmaI部位にクローニングした。増幅産物の挿 入されたプラスミドのうち#2、#3、#4 (H4B7) 、#11、#13、#14 (H8F9) につい て、自動蛍光シーケンサー(Applyed Bio System社)により、増幅産物の塩基配 列を決定した。得られた塩基配列及び予想されるアミノ酸配列をすでに報告され ているヒト抗体VH領域(Marksら、Eur. J. Immunol. 21, 985-, 1991)、JH領域

19 1 1 0 2 0 0 1

(Ravetchら, Cell, 27, 583-, 1981) の配列と比較した結果、H4B7、H8F9共に、VH4ファミリー、JH2の組み合わせからなることが判明した。この結果は、ヒト14番染色体部分断片を保持するキメラマウスにおいて、完全な機能的ヒト抗体重鎖蛋白質が産生されていることを示している。

[0155]

(実施例28) ヒト抗体 κ鎖を発現するキメラマウス脾臓からのヒト抗体 κ鎖cDNA の取得と塩基配列決定

(実施例13) において取得され、(実施例23) においてヒト抗体  $\kappa$  鎖を発現することが確認されたキメラマウスK2-8の脾臓より(実施例5) と同様な方法で合成したcDNAについて、下記のプライマー (Larrickら, BIO/TECHNOLOGY, 7, 934-, 1989、Whitehurstら, Nucleic Acids Res., 20, 4929-, 1992 を参考に作製) によりPCRを行ない、ヒト  $\kappa$  鎖可変領域を増幅した。陰性コントロールとしてK2-8より取得した肝臓由来CDNA及び、(実施例10) のTT2/#14 3-2由来キメラマウスK3-2-2より取得した脾臓由来CDNAを用いた。

[0156]

KC2 (ヒトIg κ鎖定常領域):5'-CAGAGGCAGTTCCAGATTTC (配列番号50)

KC3 (同上):5'-TGGGATAGAAGTTATTCAGC (配列番号51)

KVMIX (ヒトIgκ鎖可変領域):

5'-ATGGACATG(AG)(AG)(AG)(AGT)(CT)CC(ACT)(ACG)G(CT)(GT)CA(CG)CT T(配列番号52) (3456種の混合物)

\*()はその位置の塩基が()内のいずれかからなる混合物であることを示す。

[0 1 5 7]

PCRはKVMIX×KC 2、KVMIX×KC 3 プライマーの組み合わせで94℃15秒、55℃15秒、72℃20秒、40サイクル(パーキンエルマー社、サーマルサイクラー9600使用)の条件で行なった。増幅産物は1.5%アガロース電気泳動後、臭化エチジウム染色することにより検出した。その結果、両者の組み合わせ共に、期待される約420bps(KC 2)、約450bps(KC 3)の長さの増幅産物が検出された。一方、2種の陰性コントロールでは特異的増幅産物は検出されなかった。これらの増幅産物は、石田ら(遺伝子発現実験マニュアル、講談社サイエンティフィク、1995)の方

法に従い、pBlueScriptII SK+ (Stratagene社) ベクターのSmaIあるいはEcoRV部位にクローニングした。増幅産物の挿入されたプラスミドのうちKVMIX×KC2由来のVK-#1クローン 1 種類について、自動蛍光シーケンサー (Applyed Bio System社)により、増幅産物の塩基配列を決定した。得られた塩基配列はヒトIg  $\kappa$ 鎖の開始コドンから定常領域に至るまで終始コドンを含まないので、クローニングされた増幅産物は機能的ヒトIg  $\kappa$ 鎖可変領域をコードしていると考えられる。また、すでに報告されているヒト抗体V  $\kappa$  領域 (Kleinら, Eur. J. Immunol., 23, 3248-, 1993)、 $J\kappa$  領域 (Whitehurstら, 前記)の塩基配列と比較した結果、 $V\kappa$ 3ファミリー、 $J\kappa$ 4の組み合わせからなることが判明した。この結果は、ヒト2番染色体部分断片を保持するキメラマウスにおいて、完全な機能的ヒト抗体  $\kappa$  鎖蛋白質が産生されていることを示している。

# [0158]

(実施例29) ヒト14番染色体断片を保持するキメラマウスの血清中のヒト抗体 γ鎖サブクラスおよびμ鎖の検出、および定量

(実施例10)の生後11週齢のキメラマウス(K15AおよびK16A;1-4 由来、キメラ率70、50%)より採血し、血清中のヒト抗体γ鎖サブクラス濃度を(実施例14)に従いELISA法を用いて検出した。

[ヒトIgG1の測定] 抗ヒトIgG抗体(シグマ、I-6260) をPBSで希釈し、96穴マイクロタイタープレートをコーティングした。血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識した抗ヒトIgG1抗体(ファーミンジェン、08027E) を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された濃度既知のヒトIgG1(シグマ、I-3889) を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。

### [0159]

[ヒトIgG2の測定] 抗ヒトIgG2抗体(シグマ、I-9513) をPBSで希釈し、96穴 マイクロタイタープレートをコーティングした。血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識した抗ヒトIgG抗体(シグマ、A-0170) を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト、ML-1120T) の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された濃度既知のヒトIgG2(シグマ、I-4139) を標準と

しマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。

### [0160]

[ヒトIgG3の測定] 抗ヒトIgG3抗体(シグマ、I-7260) を100mMグリシン塩酸バッファーpH2.5で希釈し5分間室温で放置した後、100mMリン酸バッファーpH7.0で10倍に希釈し、96穴マイクロタイタープレートをコーティングした。血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識した抗ヒトIgG抗体(ファーミンジェン、08007E) を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト、ML-1120T) の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された濃度既知のヒトIgG3(シグマ、I-4389) を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。

# [0161]

[ヒトIgG4の測定] 抗ヒトIgG4抗体 (シグマ、I-7635) を100mMグリシン塩酸バッファーpH2.5で希釈し5分間室温で放置した後、100mMリン酸バッファーpH7.0で10倍に希釈し、96穴マイクロタイタープレートをコーティングした。血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識した抗ヒトIgG抗体 (ファーミンジェン、08007E) を加えてインキュベートした後、TMBZ (住友ベークライト、ML-1120T) の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。精製された濃度既知のヒトIgG4 (シグマ、I-4639) を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。

### [0162]

[ヒトIgMの測定]μ鎖についてはPBSで希釈した抗ヒトμ鎖マウスモノクローナル抗体(シグマ、I-6385)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒトμ鎖マウス抗体 (The Binding Site Limited、MP008)を加えてインキュベートした後、ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ (住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価し、精製されたμ鎖を持つ濃度既知のヒトIgM (オルガノン・テクニカ、6001-1590)を標準としマウス血清(シグマ、M5905)を添加したPBSで段階的に希釈した。

結果を表10に示す。キメラマウスK15AとK16Aの2個体でIgG1,IgG2,IgG3,IgG4

のすべてのサブクラスおよびIgMが検出された。

[0163]

## 【表10】

表10. キメラマウス中のヒト抗体IgGサブクラスおよびIgM濃度(ELISA)

キメラマウス	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgM (mg/l)
K15A	2.25	1.96	0.17	0.43	7.09
K16A	0.30	0.69	0.10	0.07	0.87

[0164]

(実施例30)ヒト22番染色体を保持するマウスES細胞株(TT2)の取得

ヒト22番染色体を保持するマウスES細胞(TT 2)取得のため、染色体供与細胞として(実施例26)で取得した6-1 (A9/#22, G418, ピューロマイシン耐性)細胞株を用いた。染色体受容細胞としては野生型TT 2 細胞株(実施例9)を用いた。シクロセル融合実験およびピューロマイシン耐性株の選択は0.75μg/mlのピューロマイシン濃度で他は(実施例9)のG418耐性株選択の場合と同様に行なった。この結果出現したピューロマイシン耐性株の出現頻度はTT 2 細胞10<sup>7</sup>個あたり1~2個であった。ピューロマイシン耐性株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。ヒト22番染色体の保持はピューロマイシン耐性株PG22-1について以下の(1)、(2)により確認した。

[0165]

### (1) PCR解析

ピューロマイシン耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト22番染色体上に存在する遺伝子(Genetic Maps,前記)のうち、(実施例2;A9/#22)で存在が確認されている10種のプライマーについてPCR増幅を行なった結果、(実施例2;A9/#22)に存在した全てのマーカーが検出された。

[0166]

(2)サザンブロット解析(実施例2)で示した方法に従い、ヒトL1配列をプローブとして用い、陰性コントロール野生型TT2、染色体供与細胞6-1、ピューロマイシン耐性TT2細胞株PG22-1由来のゲノムDNAについて行った。その結果を(図19)に示す。図中左側にDNA分子量を示した。PG22-1におけるバンドパターンは6-1のそれと一致し、シグナル強度も同程度であることから、6-1細胞株中の

22番染色体は確かにPG22-1に移入されたことが確認された。

以上の実験によりピューロマイシン耐性TT 2 細胞株PG22-1はヒト22番染色体の全てあるいは大部分を保持することが確認された。

# [0167]

(実施例31) ヒト22番染色体を保持するマウスES細胞株 (TT2) からのキメラマウス作製

(実施例30)で得られ、ヒト22番染色体を保持していることが確認されたピューロマイシン耐性TT 2 細胞株PG22-1を凍結ストックより立ち上げ、 ICRまたはMC H(ICR)(日本クレア社)雄雌マウスの交配により得られた 8 細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

# [0168]

キメラ作製の結果を(表11)に示す。計266個の注入胚を移植した結果、36匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT 2 細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した36匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は8匹であった。

この結果より、ヒト22番染色体を保持するES細胞株(TT2由来、PG22-1)はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

[0169]

# 【表11】

表11. ヒト22番染色体を保持するTT2細胞株からのキメラマウス作製

		ES細胞を注入した た8細胞期胚数				への貢献 20-50%	•	
TT2/#22	PG22-1	266	36	8	4	1	3	

[0170]

(実施例32) ヒト22番染色体を保持するキメラマウスの血清中のヒト抗体 λ鎖 の検出、および定量

(実施例31)のキメラマウスKPG22-1~3の血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法を用いて定量した。生後2ヶ月のキメラマウスより採血し、血清中のヒト抗体 2 鎖をELISA法を用いて検出した。PBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリン 2 鎖抗体(VECTOR LABORATORIES, INC.、IA-3070)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでビオチン標識した抗ヒト免疫グロブリン 2 鎖抗体(VECTOR LABORATORIES, INC.、BA-3070)を加えてインキュベートしさらにビオチン化ワサビペルオキシダーゼとアビジンDHの複合体(VECTOR LABORATORIES, INC.、Vectastain ABCキット)を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友ベークライト, ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価し、精製された 2 鎖を持つ濃度既知のヒト IgM(大日本製薬、U13200)を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈した。結果を表12に示す。この結果より22番染色体を保持するキメラマウスにおいてヒト抗体 2 鎖遺伝子が機能することが確認された。

### [0171]

### 【表12】

表12. キメラマウス中のヒト抗体ル鎖濃度 (ELISA)

キメラマウス	キメラ率%	Ig λ (mg/l)
KPG22-1 KPG22-2 KPG22-3	50 50 20	12 18 24
NPGZZ-3	20	24

### [0172]

(実施例33)ヒト22番染色体導入キメラマウス血清における抗ヒトHSAヒト体 λ鎖の検出

キメラマウス (実施例31、KPG22-3) に生後79日、94日、110日の3回にわたり (実施例20)と同様にHSAを免疫した。血清中のヒト抗体α鎖を(実施例14)に 従いELISA法を用いて検出した。50mMの炭酸-炭酸水素バッファーpH9.6で5μg /mlに希釈したHSA(シグマ、A 3782)を96穴マイクロタイタープレートにコーテ ィングし、血清試料を加え、次いでビオチン標識した抗ヒト免疫グロブリンα鎖 抗体 (VECTOR LABORATORIES, INC.、BA-3070) を加えてインキュベートしさらに ビオチン化ワサビペルオキシダーゼとアビジンDHの複合体(VECTOR LABORATORIE S,INC.、Vectastain ABCキット)を加えてインキュベートした後、TMBZ(住友べ ークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価した。HSA で免疫したキメラマウス血清中の抗HSAヒトα鎖の力価は免疫後上昇した。一方 対照としたICRマウスでは、HSA免疫後の抗HSAヒト抗体α鎖の力価はバックグラ ンドレベルであった。結果を(図20)に示す。図20において横軸はキメラマウス に初めてHSAを免疫してからの日数を、縦軸は450nmにおける吸光度を示した。こ れらの結果より、ヒト22番染色体を保持するキメラマウスにおいてヒト抗体λ鎖 遺伝子が機能し、さらにはHSA抗原刺激に対して抗原特異的ヒトIgλの抗体価上 昇が起こることが確認された。

### [0173]

(実施例34)ヒト22番染色体導入キメラマウスからのヒト抗体軽鎖産生ハイブリドーマ取得

(実施例25)と同様に(実施例33)においてヒトアルブミンで免疫したキメラ

マウスKPG22-3から生後113日目に脾臓を取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。ハイブリドーマの作製法は〈安東・千葉、単クローン抗体実験操作入門、講談社サイエンティフィク,1991〉に記された方法に従い、ミエローマ細胞としては、SP-2/0-Ag14 (大日本製薬、05-554)を使用した。培養液にHCF (エア・ブラウン)を10%添加し96穴プレート5枚にまき込み、1~3週間培養しコロニーが出現したウェルの培養上清をELISA法で解析した。ELISA法は(実施例33)と同様に行ない、ヒト抗体λ鎖陽性のクローンを4個得た

### [0174]

(実施例35) ヒト22番染色体部分断片及び、14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞株の取得

ヒト22番染色体、14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞取得のた め、染色体供与細胞として(実施例26)で取得した6-1 (A9/#22, G418,ピュー ロマイシン耐性) 細胞株を用いた。染色体受容細胞としてはすでにヒト14番染色 体部分断片を保持しているG418耐性TT2細胞株1-4 (実施例9)を用いた。ミク ロセル融合実験およびピューロマイシン耐性株の選択は0.75μg/mlのピューロマ イシン濃度で他は(実施例9)のG418耐性株選択の場合と同様に行なった。この 結果出現したピューロマイシン耐性株の出現頻度は1-4 細胞10<sup>7</sup>個あたり1~2 個であった。これらのピューロマイシン耐性株は300μg/mlのG418存在下でも増 殖することからG418耐性も同時に保持していることが確認された。二重薬剤耐性 株の凍結保存、ゲノムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。ヒト22番染色 体及び、ヒト14番染色体部分断片の保持は二重薬剤耐性株PG22-5について以下の PCR解析により確認した。二重薬剤耐性株ゲノムDNAを鋳型としてヒト22番、14番 染色体上に存在する遺伝子(Genetic Maps,前記)のうち、22番染色体について は(実施例<u>2</u>;A9/#22)、14番染色体については(実施例9;TT2/#14 1-4)で 存在が確認されている各プライマーについてPCR増幅を行なった結果、22番染色 体については10種のうち3種のマーカー (D22S275, D22S315, Ig 1)、14番染色 体についてはTT2/#14 1-4に存在した全てのマーカーが検出された。以上の実験 により、得られた二重耐性TT 2 細胞株はヒト22番染色体部分断片、14番染色体部

分断片を同時に保持することが確かめられた。

# [0175]

(実施例36) ヒト22番染色体部分断片及び、14番染色体部分断片を同時に保持するマウスES細胞株からのキメラマウス作製

(実施例35)で得られ、ヒト22番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持していることが確認されたG418、ピューロマイシン二重耐性TT 2 細胞株PG22-5を凍結ストックより立ち上げ、 ICRまたはMCH(ICR) (日本クレア社) 雄雌マウスの交配により得られた 8 細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地 (実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親IC Rマウス (日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション・胚を移植した。

# [0176]

キメラ作製の結果を(表13)に示す。計302個の注入胚を移植した結果、16匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚 (ICR) 由来の白色の中にTT 2 細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した16匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は5匹であった。

この結果より、ヒト22番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持するES 細胞株 (PG22-5) はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

[0177]

# 【表13】

表13. ヒト22番染色体と14番染色体を保持するTT2細胞株からのキメラマウス 作製

ES細胞株/ 二重耐性 ES細胞を注入し 子マウス キメラ 毛色への貢献率 ヒト染色体 株番号 た8細胞期胚数 の数 マウスの数 ~20% 20-50% 50-80% TT2/#22+#14 PG22-5 302 16 5 3 2 0

[0178]

(実施例37) ヒト22番染色体部分断片及び、14番染色体部分断片を同時に保持するES細胞由来キメラマウス血清中のヒト抗体 λ 鎖およびヒト抗体 μ 鎖の検出・定量

(実施例36)のキメラマウス(KPG22-9、10、および12)に対して、HSAを免疫した。KPG22-9とKPG22-10には生後11週齢で免疫し、その2週間後に採血した。KPG22-12には生後7週齢と9週齢22度免疫し、2度目の免疫の2週間後に採血した。

血清中のヒト抗体μ鎖およびヒト抗体λ鎖さらにヒトλ鎖かつヒトμ鎖を有する抗体を(実施例14)に従いELISA法を用いて検出した。

### [0179]

完全ヒト抗体の検出にはPBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリン A 鎖抗体(Kirke gaard & Perry Laboratories Inc.、01-10-11)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(The Binding Site Limited、 MP008)を加えてインキュベートした後、ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価し、精製された A 鎖を持つ濃度既知のヒトIgM(大日本製薬、U13200)をマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のヒト抗体濃度を求めた。ヒト抗体μ鎖およびヒト抗体

A法を用いて(実施例29)および(実施例32)と同様に検出・定量し 表14に示す。キメラマウスではλ鎖とμ鎖がともに検出された。ヒト つλ鎖を持つ抗体も検出された。この結果より、ヒト22番染色体部分 1番染色体部分断片を保持するES細胞由来キメラマウスにおいてヒト抗 s子とヒト抗体μ鎖遺伝子は同時に機能し、一部のB細胞では重鎖と軽 こヒトである完全抗体が産生されることが確認された。

照として測定したヒト14番染色体のみを保持する(実施例10)のキメラ K9)、ヒト22番染色体のみを保持する(実施例31)のキメラマウス(KP 0血清中のヒト抗体λ鎖かつμ鎖を持つ抗体濃度はバックグランドレベ 、ここでの検出系はヒトα鎖かつμ鎖を持つ完全抗体のみを検出してい 、確認された。

# [0181]

1 ] キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA)

表14.	キメラ	マウス中のヒ	卜 机 体	2 ((1)
		IgM(mg/l)	$Ig \lambda (mg/1)$	IgM, λ (mg/1)
メラマウス	拟 率%			0.043
G22-9	30	2.54	9.9 21.5	0,333
-G22-10	5	4.90 2.71	21.5 7.0	0.048 <0.003
PG22-12 (9	40 50	4.96 3.71 6.66	- 17 C	≥0.003
(9 (PG22-2	50 50	-	17.6	
Ard22-2			<del></del> -	

ミ施例38) ヒト。2染色体部分断片及び、14番染色体部分断片を同時に保持 S細胞由来キメラマウス血清におけるヒト抗体の検出(ヒトκ鎖かつヒトμ

実施例19) で作製したキメラマウスKPG-15 (TT2ES クローンPG5由来、キメ 10%) に対して、生後2から3ヶ月齢の間に、PBSに溶解したヒト血清アルブ (HSA、シグマ、A3782) とアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunoc Reseach Inc.) とを混合して0.25mg/mlのHSA溶液を調整し0.2mlを3回免疫 採血した。また生後6週齢の(実施例19)のキメラマウスKPG-26 (TT2ES ク -ンPG6由来、キメラ率40%)から採血した。血清中の完全ヒト抗体濃度を( 恒例14) に従いELISA法で検出した。PBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリンκ鎖 83

ーゲティング, 羊土社, 1995) TT2F細胞株 (ライフテックオリエンタル社より購 入)を用いた。ミクロセル融合実験およびピューロマイシン耐性株の選択は0.75 μg/mlのピューロマイシン濃度で他は(実施例9)のG418耐性株選択の場合と同 様に行なった。この結果出現したピューロマイシン耐性株の出現頻度はTT2F細胞  $10^7$ 個あたり 5 個であった。これらのピューロマイシン耐性株の凍結保存、ゲノ ムDNA取得は(実施例2)と同様に行なった。ヒト2番染色体部分断片の保持は 薬剤耐性株P-20, P-21について以下のPCR解析により確認した。薬剤耐性株ゲノ ムDNAを鋳型としてヒト2番染色体上に存在する遺伝子 (Genetic Maps,前記) の うち、(実施例1; A9/#2 w23) で存在が確認されているプライマーCκ、FABP1 、 $V \kappa 1$ -2の3種についてPCR増幅を行なった結果、2株共に、3種全てのプライ マーについて期待される増幅産物が確認された。

以上の実験により、得られたピューロマイシン耐性ES細胞株 (TT2F, X0) はヒ ト2番染色体部分断片を保持することが確かめられた。

(実施例40) ヒト2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞株 (TT2F, X0)

(実施例39) で得られ、ヒト2番染色体部分断片を保持していることが確認さ からのキメラマウス作製 れたピューロマイシン耐性TT2F細胞株P-21を凍結ストックより立ち上げ、 たはMCH(ICR) (日本クレア社) 雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚 あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発 生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス (日本クレア社) の子宮に片 側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

計141個の注入胚を移植した結果、20匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は 、毛色において宿主胚 (ICR) 由来の白色の中にTT 2 細胞由来の野生色 (濃茶) が認められるかどうかにより判定される。キメラ作製の結果を(表16)に示す。 誕生した20匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢 献の認められる個体は9匹であった。うち4個体は毛色が完全に野生色の(ES細 胞に由来する) キメラマウスであった。 出証特平11-30 抗体 (Kirkegaard & Perry Laboratories Inc.、01-10-10) を96穴マイクロタイ タープレートにコーティングし、マウス血清 (シグマ、M5905) を加えたPBSで希 釈した血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖 抗体 (The Binding Site Limited、 MP008) を加えてインキュベートした後、ペ ルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵 素活性を450nmの吸光度で評価し、精製されたκ鎖を持つ濃度既知のヒトIgM(オ ルガノン・テクニカ、6001-1590) を標準としマウス血清を添加したPBSで段階的 に希釈した。κ鎖、μ鎖については(実施例20)と同様にして濃度を求めた。結 果を表15に示す。ヒト抗体μ鎖かつκ鎖を持つ抗体が検出された。また対照とし たヒト14番染色体のみを保持する(実施例10)のキメラマウス(K9)、ヒト2番 染色体のみを保持する(実施例13)のキメラマウス(K2-9)血清中のヒト抗体で κ鎖かつμ鎖を持つ抗体濃度は0.002mg/ml以下でバックグランドレベルであった 。この結果より、ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持するES 細胞由来キメラマウスにおいてヒト抗体 κ鎖遺伝子とヒト抗体 μ鎖遺伝子は同時 に機能し、一部のB細胞では重鎖と軽鎖がともにヒトである完全抗体が産生され ることが確認された。

[0183]

【表15】

表15. キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA)

ESグローン	キメラマウス	もり 率%	IgM(mg/l)	Ig κ (mg/l)	IgM, κ (mg/l)
PG-5 PG-6 3-2 5-1	KPG15 KPG26 K9 K2-9	10 40 50 40	0.18 1.52 6.66	1.01 1.26 - 135	0.075 0.018 0.002以下 0.002以下

[0184]

(実施例39) ヒト2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞株 (TT2F, X0) の取得

ヒト2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞(XO)取得のため、染色体供与細胞として(実施例16)で取得したPG1細胞株を用いた。染色体受容細胞としては(39, XO)の染色体構成を持ち、キメラマウスにおいて効率よく卵細胞に分化することが報告されている(相沢慎一、バイオマニュアルシリーズ8,ジーンタ

この結果より、ヒト2番染色体部分断片を保持するES細胞株 (P-21) はキメラ 形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

[0187]

# 【表16】

表16. ヒト2番染色体部分断片を保持するTT2F細胞株からのキメラマウス作製

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ES細胞を注入 した8細胞期 胚数			~20%		、の質献 <sup>3</sup> 50-90%	
TT2F/#2fg.	P-21	141	20	9	0	2	3	4

[0188]

(実施例41) ヒト23染色体部分断片を保持するTT2F由来キメラマウスの血清中のヒト抗体 κ鎖の検出、および定量

(実施例40)の生後約1ヶ月齢のキメラマウス (P-21由来、キメラ率100%、K2-1F~4F) より採血し血清中のヒト抗体 κ鎖濃度を(実施例20)と同様にELISA法を用いて定量した。

結果を表17に示す。使用するES細胞をTT2Fとしてもヒト抗体 κ鎖遺伝子がキメラマウス中で機能することが確認された。

[0189]

# 【表17】

表17. キメラマウス中のヒト抗体 κ 鎖濃度 (ELISA)

キメラマウス	キメラ率%	Ig $\kappa$ (mg/l)
K2-1F	100	66
K2-2F K2-3F	100 100	156 99
K2-4F	100	20

[0190]

(実施例42) ヒト2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞(TT2F, X0) 由来キメラマウスの子孫におけるヒト染色体保持の検出

(実施例40) で得られた雌キメラマウスのうちK2-1F, K2-4F (共に毛色のキメ ラ率100%) について雄ICRマウスとの交配によりES細胞由来の子孫が誕生するか を検討した。この交配においてICR雄マウス(アルビノ、劣性)由来精子により 受精したキメラマウス中のTT2F細胞(野生色:優性)由来の卵子からは野生色、 ICR由来卵子からは白色の子マウスが誕生する。それぞれ1回の交配によって得 られた生存可能な子マウス (K2-1F:10匹、K2-4F:5匹) のすべてがES細胞由来 の毛色である野生色を示した。これらの子マウスの尻尾より調製したゲノムDNA についてヒト染色体断片の保持をPCR法により検討した。P-21 (実施例39) で存 在が確認されている3種のプライマーについてPCR増幅を行なった結果、10匹中4 匹 (K2-1F)、5匹中2匹 (K2-4F) においてP-21で検出された3種のマーカーの 存在が確認された。15匹の子マウスのPCRの結果を(図21)に示す。図中右側に マーカー(φX174, HaeIII断片, ニッポンジーン)および主なバンドのDNA分子 量を、左側にそれぞれのプライマーによって期待される増幅産物の長さを矢印で 示した。右側に陽性コントロールとして親キメラK2-1F、K2-4Fの尻尾由来DNAを 用いた結果も示す。これらの結果は、ヒト2番染色体部分断片を保持するTT2F細 胞株P-21がキメラマウス中で機能的な卵子に分化し、その卵子由来の子孫にヒト 2番染色体部分断片が伝達されたことを示している。

[0191]

(実施例43) ヒト2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞(TT2, XY) 由 来キメラマウスの子孫におけるヒト染色体保持の検出

(実施例13)で得られたキメラマウスのうちK2-18(雄、キメラ率70%)とK2-19(雌、キメラ率60%)及び同腹の非キメラ雌を混合して交配し、ES細胞由来の子孫が誕生するかを検討した。TT2細胞は(40, XY)の染色体構成を持つので雄キメラK2-18において機能的な精子に分化している可能性がある。その場合キメラマウス中のTT2細胞(野生色、優性)由来精子により受精したICR(白色:劣性)由来の卵子からは野生色の子マウスが誕生する。交配によって得られた生存可能

な子マウス計110匹のうち10匹がES細胞由来の毛色である野生色を示した。これらの野生色子マウス10匹のうち7匹の尻尾より調製したゲノムDNAについてヒト染色体断片の保持をPCR法により検討した。5-1株(TT2/#2fg.,実施例12)で存在が確認されている2種のプライマー(Cκ、FABP1)及び、(実施例1)で示したVκ1-2プライマーについてPCR増幅を行なった結果、7匹中2匹において3種のマーカー全ての存在が確認された。この結果は、ヒト2番染色体部分断片を保持するTT2細胞株5-1がキメラマウス中で機能的な精子に分化し、その精子由来の子孫にヒト2番染色体部分断片が伝達されたことを示している。

# [0192]

(実施例44) キメラマウス子孫の血清中のヒト抗体 κ鎖の検出、および定量 (実施例42) のキメラマウス子孫K2-1F-1~10およびK2-4F-1~5の血清中のヒト抗体 κ鎖濃度をELISA法を用いて定量した。生後約4~6週齢のマウスより採血し、血清中のヒト抗体 κ鎖を (実施例20) と同様にELISA法を用いて検出した。結果を (実施例42) で得られた染色体保持の結果と共に表18に示す。キメラマウスから生まれた子孫においてもヒト抗体 κ鎖遺伝子が機能することが確認された。

[0193]

【表18】

表18。 キメラマウス子孫中のヒト抗体 κ 鎖濃度(ELISA)

<del></del> 親キメラマウス	マウス個体番号	ヒト2番染色体断片	Ig κ (mg/l)
K2-1F	#1	-	0.58
K2-1F	#2	+	84.1
K2-1F	#3	+	12.8
K2-1F	#4	+	<b>15.</b> 1
K2-1F	#5		0.52
K2-1F	#6	-	0.58
K2-1F	#7	_	1.30
K2−1F	#8	-	0.90
K2-1F	#9	_	0.56
K2-1F	#10	+	28.8
K2-4F	# <u>1</u>	-	0.04以下
K2-4F	#2	+	23.3
K2-4F	#3	+	11.8
K2-4F	#4	_	0.08
K2-4F	#5	-	0.06

[0194]

(実施例45) ヒト14番染色体部分断片導入キメラマウス脾臓細胞の解析 フローサイトメトリーによる解析は下記の文献に記載の方法に従った。日本生 19 1 2 0 2 0 0 2 0

化学会編、新生化学実験講座12分子免疫学I-免疫細胞・サイトカイン-1989、 東京化学同人;東京大学医科学研究所 制癌研究部編、細胞工学別冊8 新細胞 工学実験プロトコール、1991、秀潤社; A. Doyle and J.B.Griffiths, "Cell & Tissue Culture: Laboratory Procedures", published by John Wiley & Sons Ltd., 1996 。(実施例19)の生後6ヶ月齢のキメラマウス(KPG06; PG16由来、 キメラ率30%)から脾臓をとりだし、塩化アンモニウム水溶液で処理した後ラッ ト血清を1%含むPBS中で、フルオレッセインイソチオシアネート(FITC)標識抗 マウスCD45R(B220)抗体(ファーミンジェン、01124A)で細胞を染色した。洗浄 後5%マウス血清を含むPBS中でビオチン標識抗ヒトIgM 抗体(ファーミンジェ ン、08072D)または対照としてビオチン標識抗ヒトλ鎖抗体(ファーミンジェ ン、08152D)と反応させた後、ストレプトアビジンフィコエリスリン(ファー ミンジェン、13025D) で染色し、フローサイトメトリー(ベクトンデッキンソン 、FACSort)で解析した。また対照としてヒト染色体を保持しないICRマウスも同 様に解析した。図22に結果を示す。図中横軸はヒトIgM 、縦軸はCD45R(B220) を 示す。B細胞マーカーCD45R陽性(FITC)でかつヒトIgM陽性(PE)である細胞集 団が4%増加しており、これによってキメラマウスではヒト抗体μ鎖を細胞表面 に発現している細胞の存在が確認された。

### [0195]

(実施例46) ヒト抗体重鎖、κ鎖、λ鎖をそれぞれ発現するキメラマウス脾臓 由来cDNAからのヒト抗体遺伝子可変領域クローニングと塩基配列決定

(実施例29)、(実施例23)、(実施例32)においてヒト抗体重鎖、κ鎖、λ鎖をそれぞれ発現することが確認されたキメラマウスK15A(1-4 株由来、実施例10に示した方法で作製)、K2-8(実施例13で作製)、KPG22-2(実施例31で作製)の脾臓由来RNAより(実施例5)と同様な方法で合成したcDNAについて、下記のプライマーによりPCRを行ない、それぞれのヒト抗体遺伝子可変領域を増幅した。陰性コントロールとして非キメラマウスICRより取得した脾臓由来cDNAを用いた。参考文献の記載のないプライマーはGenbank等のデータベースより入手した塩基配列をもとに作製した。

[0196]

# · K15A (重鎖)

定常領域用:HIGMEX1-2:5'-CCAAGCTTCAGGAGAAAGTGATGGAGTC (配列番号53)

HIGMEX1-1:5'-CCAAGCTTAGGCAGCCAACGGCCACGCT (VH3BACK Ø 2ndPCR

に使用) (配列番号54)

可変領域用:VH1/5BACK (59℃, 35cycles, Marksら, Eur. J. Immnol., 21, 98 5-, 1991), VH4BACK (59℃, 35cycles, Marksら, 前記), VH3BACK (1stPCR:59℃, 35cycles, Marksら, 前記)

[0197]

# · K2-8 (軽鎖 k)

定常領域用: KC2H: 5'-CCAAGCTTCAGAGGCAGTTCCAGATTTC (配列番号55)

可変領域用: Vk1/4BACK (55℃,40cycles, Marksら, Eur. J. Immnol., 21, 985-, 1991), Vk2BACK (55℃, 40cycles, Marksら,前記), Vk3BACK (55℃,40cycles, Marksら,前記), Vk3BACK (55℃,40cycles, Marksら,前記)

[0198]

### · KPG22-2 (軽鎖 λ)

定常領域用:CaMIX(以下の3種のプライマーを等モル比で混合したもの)

IGL1-CR: 5'-GGGAATTCGGGTAGAAGTCACTGATCAG (配列番号56)

IGL2-CR : 5'-GGGAATTCGGGTAGAAGTCACTTATGAG (配列番号57)

IGL7-CR : 5'-GGGAATTCGGGTAGAAGTCACTTACGAG (配列番号58)

可変領域用: V21LEA1 (55℃, 40cycles, Williamsら, Eur. J. Immunol., 23, 1456-, 1993), V22MIX (55℃, 40cycles,前記のWilliamsらの報告にあるV22LEA1, V22JLEAD を等モル比で混合したもの), V23MIX (55℃, 40 cycles,前記のWilliamsらの報告にあるV23LEA1, V23JLEAD, V23BACK4を等モル比で混合したもの)

[0199]

それぞれ定常領域用×可変領域用(重鎖3種、κ鎖3種、λ鎖3種)の組み合わせで94℃15秒、それぞれの可変領域プライマーに示したアニーリング温度15秒、72℃20秒、それぞれの可変領域プライマーに示したサイクル数(パーキンエル

マー社、サーマルサイクラー9600使用)の条件で行なった。VH3BACKにおける2nd PCRは1stPCRの増幅産物を(HIGMEX1-1×VH3BACK)のプライマーの組み合わせで 再度増幅した。全ての増幅産物は1.5%アガロース電気泳動後、臭化エチジウム染色することにより検出した。その結果、全て組み合わせにおいて、期待される長さ(重鎖:470bp付近、軽鎖  $\kappa$ :400bp付近、軽鎖  $\lambda$ :510bp付近)の増幅産物が 検出された。一方、陰性コントロールでは全てにおいて同じ位置に特異的増幅産物は検出されなかった。これらの増幅産物は、アガロースゲルよりprep.A.gene (バイオラッド)により抽出した後、制限酵素処理(重鎖:HindIII-PstI、軽鎖  $\kappa$ :HindIII-PvuII、軽鎖  $\lambda$ :HindIII-EcoRI)し、pUC119(宝酒造)ベクターの HindIII、PstI 部位(重鎖)、HindIII,HincII部位( $\kappa$ 鎖)、HindIII,EcoRI 部位( $\lambda$ 鎖)にクローニングした。増幅産物の挿入されたプラスミドのうち以下のもの(右側に示したクローン数)について、自動蛍光シーケンサー(Applyed Bio System社)により、増幅産物の塩基配列を決定した。

# [0200]

- ・HIGMEX1-2×VH1/5BACK:10クローン、
- ・HIGMEX1-2×VH4BACK: 8クローン、
- ・HIGMEX1-2 (2nd PCR, HIGMEX1-1)×VH3BACK: 5クローン
- ・KC2H×V к 1/4BACK: 6 クローン、
- ・KC2H×Vκ2BACK: 7クローン、
- · KC2H×V к 3BACK : 4 クローン、
- ·Camix×Valleal: 5クローン、
- ·CaMIX×Va2MIX: 6クローン、
- ·CaMIX×Va3MIX:5クローン

# [0201]

得られた塩基配列をDNASIS(Hitachi Software Engneering) により解析した結果、全てがヒト由来配列であり、 $\kappa$ 鎖、 $\lambda$ 鎖の全て、重鎖の計23種中21種が開始コドンから定常領域に至るまで終始コドンを含まない機能的配列であった。決定された配列からお互いに同一なものを除くと重鎖17種、 $\kappa$ 鎖11種、 $\lambda$ 鎖12種のそれぞれ異なる可変領域配列が同定された。

[0204]

【表19】

表19

V family	V segment	CDR3	J (D)	V primer	Clone
K15A		<del></del>			
VHl	VHI-8	VRSSSWYEYYYYGMDV	J6 (DNI)	VH4BACK	H4-10
	VH1-18	GGITMVRGLIITDWYFDL	J2 (DXP1)	VHIMBACK	H1-7
	VH1-24	APYSGRFDY	J4 (DK1)	VHISBACK	H1-6
	VH1-46	ERYYGSGSYQDYYYYYGMDV	16 (DXP1)	VH1/5BACK	H1-2
	VH1-46	GGYSGYEDYYYYGMDV	J6 (DK1)	VH1/5BACK	
VH2	VH2-5	SYFDWPDFDY	J4 (DXPI)	VH4BACK	H4-14
VH3	VH3-21	EGCSGGSCLPGYYYYGMDV	J6 (DLR2)	VHI/5BACK	
	VH3-23	AHGDPYFDY	J4	VH1/5BACK	H1-3
	VH3-23	DADAFDI	13	VH1/5BACK	H1-8
	VH3-23	SGWDY	J4 (DN1-)	VHJBACK	H3-3
	VH3-23	TGFDL	J2	VH4BACK	H4-4
	VEJ-33	EGGYGSVGDYYYYGMDV	16 (DX5.1)		
	VHG-33	GGYSYGYDYYYYGMDV	16 (DX3-1)		H3-5
	VH3-33	GYSSGWYDY	J4 (DN1=)	VH4BACK	H4-9
VH4	VH4-34	RYSSGWYYFDY	J4 (DNI*)		H4-15
	VH4-59	GRIAVASFDY	J4 (DN1-)	VH4BACK	H4-2
	VH4-59	GSGSYFHFDY	J4	VH4BACK	H4-6
K2-8					
V r l	O18-8	QQHDNLPFT	<b>J3</b> .	V & IBACK	K1-1
	O18-8	QQYDNLPIT	15	V & 1BACK	
	O18-8	QQHDNLPFA	J3	V x 2BACK	K2-2
	Li	QQYNSYPLT	J4	V × 1BACK	
V ~ 2	A17	MQGTHLLT -	<b>J</b> 4	V & 2BACK	
Ì	A17	MOGTHWIT	<b>15</b>	V x 2BACK	
V x 3	A27	QQYGSSPTWT	J1	V & 3BACK	K3-1
	A27	QQYGSSPFT	13	V × 3BACK	K3-4
ļ	A27	QQYGSSPLWT	Лī	V z 3BACK	K3-5
1	A27	QQYGSSPPWT	Ji	V ≈ 3BACK	K3-6
V×6	A26-10	HQSSSLPQT	IJ	V x 2BACK	K2-4
KPG22-2	1				_
VXI	DPL3	AAWDDSLDVV	JC3	V A ILEAI	L1-3
j	DPL5	GTWDSSLSAGV	102	VAILEA1	L1-4
	DPL5	GTWDSSLSAGVV	1C3	VA ILEAI	L1-6
i	DPLS	GTWDSSLSAVV	JC2	V A ILEAI	L1-9
	DPL8	QSYDSSLSGVV	163	V à ILEAI	L1-8
V X 2	DPL10	CSYAGSSTLV	JC2	V A 2MIX	12-4
}	DPL11	SSYTSSSTVV	1C2	V J 2MIX	L2-1
1	DPLII	SSYTSSSTLY	JC2 ·	V A 2MIX	L2-3
	DPL11	CSYTSSSTFV	102	V J 2MIX	L2-7
	DPL12	SSYAGSNNLV	1C3	V J 2MIX	L2-5
	DPL 12	SSYAGSNNFVV	1C3	V A 2MIX	L2-6
V 4 3	DPL16	NSRDSSGNLY	JC2	V J 3MIX	L3-1

[0205]

(実施例48) TT2F ES細胞の抗体遺伝子(重鎖、軽鎖κ) ノックアウト用のター

[0202]

(実施例47) ヒト抗体重鎖、κ鎖、λ鎖をそれぞれ発現するキメラマウス脾臓 由来cDNAからのヒト抗体遺伝子可変領域塩基配列の解析

(実施例46)において決定された塩基配列(重鎖17クローン、κ鎖11クローン 、λ鎖12クローン)について以下の点について解析を行った。

- 1. 各可変領域配列において使用されている既知の生殖系列V遺伝子断片を特定
- 2. 各可変領域配列において使用されている既知の生殖系列J遺伝子断片を特定
- 3. 重鎖可変領域において使用されている既知の生殖系列D断片を特定
- 4. 1、2、3の結果をもとにした重鎖可変領域におけるN領域の付加の同定
- 5. 各可変領域塩基配列から導かれるアミノ酸配列の決定

[0203]

その結果を(表19)に示す。1、2についてはGenbankに登録されている生殖系列V及びJ断片とのホモロジー検索をDNASISにより行い特定した。VH断片は(Cookら, Nature gentics, 7, 162-, 1994)、Vκ断片は(Kleinら, Eur. J. Immunol, 23, 3248-, 1993)、Vλ断片は(Williamsら, 前記)の表記法に従い、各V断片ファミリー名と共に表中に記した。3については(Ichiharaら, The EMBO J., 7, 13, 4141-, 1988)の報告に記された生殖系列D断片とのホモロジー検索をDNASISにより行い、連続して8bp以上一致することを指標として決定し表中に記した。DN\*については(Greenら, Nature Genetics, 7, 13-, 1994)で報告された新しいDNファミリー断片と考えられる。4については1(V)、2(J)、3(D)の結果をもとに、いずれの生殖系列断片にも見いだされない塩基配列をN領域とみなした。その結果、D領域の特定された13種中11種にN領域が観察され、その平均の長さは8.7bpであった。5については各塩基配列をDNASISを使用して1文字表記のアミノ酸配列に変換した。表中にはCDR3領域のみ示した。表中右側に各可変領域のクローニングに使用したプライマー名及び各クローン名を記した。

たのちT4DNAポリメラーゼ (Takara社製 DNA Blunting Kit)により両端を平滑化した。LoxP配列が入ったプラスミドDNA pBS246 (Plasmid pBS246, loxP2 Casset te Vector, U.S. Patent 4959317) は、GIBCO BRL社より購入した。このプラスミドのEcoRI及びSpeI切断部位へXhoIリンカーDNAを挿入することによってXhoI認識配列に変更したものを使用した。この改変pBS246のEcoRV切断部位へ上記STneo DNA 断片を挿入してプラスミドpLoxP-STneo を得た(図23)。

[0208]

2. C57BL/6由来抗体重鎖 $C\mu$  (IgM定常領域)、軽鎖 $J\kappa$ - $C\kappa$  (Ig  $\kappa$  連結領域および定常領域)を含むゲノムDNAクローンの単離

TT2(またはTT2F)細胞は、C57BL/6マウスとCBAマウスのF1マウス由来であることから、C57BL/6マウス由来のゲノムDNAクローンを用いて抗体遺伝子ノックアウト用ベクターを作製することにした。ゲノムDNAライブラリーは、Clontech社adult C57BL/6N male liver由来ラムダDNAライブラリーを使用した。スクリーニングのためにプローブとしては、以下の合成DNA配列(60 mer)を用いた。

[0209]

重鎖Cμプローブ: 5'-ACC TTC ATC GTC CTC TTC CTC AGC CTC TTC TAC AGC ACC ACC GTC ACC CTG TTC AAG-3'(配列番号59)

軽鎖 κプローブ: 5'-TGA TGC TGC ACC AAC TGT ATC CAT CTT CCC ACC ATC CAG T GA GCA GTT AAC ATC TGG AGG-3'(配列番号60)

[0210]

単離されたラムダクローンを解析して、重鎖 $C\mu$ または軽鎖 $J\kappa$ - $C\kappa$ を含むDNA 断片をpBluescript SKII(+) プラスミド (Stratagene社) ヘサブクローニングした (重鎖 $C\mu$ :図24;軽鎖 $J\kappa$ - $C\kappa$ :図25)。これらのDNA断片を用いて、以下のようにTT2(またはTT2F)ES細胞中のマウス抗体遺伝子破壊のためのターゲッティングベクターを作製した。

[0211]

3. マウス抗体重鎖遺伝子破壊用ベクタープラスミドの作製

2で調製したマウス抗体重鎖定常領域を含むゲノムDNAのCμをコードする領域の内で、第2~第4エクソンが含まれるDNA断片(BamHI~XhoI)を1で作製した

ゲッティングベクターの作製

マウス抗体遺伝子(重鎖、軽鎖  $\kappa$ )が破壊されたTT2(またはTT2F)細胞へG418 耐性遺伝子でマーキングされたヒト14番染色体断片(実施例 9)およびピューロマイシン耐性遺伝子でマーキングされたヒト2番(実施例18)または22番染色体(実施例35)を導入することが可能となる。このようなヒト14番+2番またはヒト14番+22番染色体を導入したマウス抗体(重鎖、軽鎖  $\kappa$ )遺伝子破壊TT2(またはTT2F)ES細胞を用いて、(重鎖 +  $\kappa$  鎖:実施例19、重鎖 +  $\lambda$  鎖:実施例36)の方法によって作成されたキメラマウスでは、主に重鎖と軽鎖がヒト由来の抗体が産生されることが期待される。以下に示す図23~図27における制限酵素の略称等は、以下のとおりである。

### [0206]

制限酵素: Kp: KpnI、B: BamHI、Bg2: Bg1II、RI: EcoRI 、RV: EcoRV 、N: Not、S1: SalI、Sca: ScaI 、Sfi: SfiI 、Sm: SmaI、X: XhoI 、(X):ラムダベクター由来のXhoI切断部位、

dK: KpnI切断部位を消失、dX: XhoI切断部位を消失、

(Sm/S1): Sall 平滑後Smal切断部位と結合、(S1/RV): Sall 平滑後EcoRV 切断部位と結合。

点線部分:pBluescript SKII(+) またはpUC18 プラスミドDNA

□ : LoxP配列

### [0207]

1. G418耐性遺伝子の両側にLoxP配列を入れたpLoxP-STneo プラスミドの作製TT2F細胞の抗体遺伝子をノックアウトした後、G418耐性遺伝子を除去するためにG418耐性遺伝子(実施例1)の両端にCreリコンビネース(Sauerら、Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, 5166-, 1988)の認識配列であるLoxP配列(Sauerら、前記)を同じ向きに入れる必要がある。pSTneoBプラスミドDNA(実施例1、Katohら、Cell Struct. Funct., 12:575, 1987; Japanese Collection of Research Biologicals (JCRB), Deposit Number: VEO39)より制限酵素XhoIでG418耐性カセット(STneo)を切り出し、アガロースゲル電気泳動によりDNA断片を精製し

LoxP-STneo遺伝子と置き換えた(図26)。 STneoの転写方向は、抗体重鎖遺伝子の転写方向と同じ向きとなっている。更にこのプラスミドのNotI部位に、DT-AカセットA(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87, 9918-9922, 1990,オリエンタル酵母より購入)[以下、DTと呼ぶ] のApaI、Sall部位をNotI部位に変換したものを挿入した。DT遺伝子の転写方向は、重鎖遺伝子の転写方向と同じ向きとなるものを選択した。このプラスミドDNAは、大腸菌DH5 を用いて増幅し、セシウムクロライド平衡遠心により精製した(細胞工学実験操作入門、1992年講談社刊)。精製したプラスミドDNAは、制限酵素SacIIにより、一箇所切断してTT2F ES 細胞へのトランスフェクションに使用した。形質転換体TT2F ES細胞の中から抗体重鎖部分がターゲッティングベクターと相同組換えが起こったクローンを検出するための形質転換体ゲノムDNAサザンブロット用のプローブとして、Cμの上流に存在するスイッチ領域のDNA断片(約500塩基対)を用いた。このDNA断片は以下の条件で129マウスゲノムDNAをPCR増幅して得た。

# [0212]

センスプライマー:5'-CTG GGG TGA GCC GGA TGT TTT G-3'(配列番号61)
アンチセンスプライマー:5'-CCA ACC CAG CTC AGC CCA GTT C-3'(配列番号62)
テンプレートDNA: EcoRI消化129マウスゲノムDNA 1μg
反応バッファー、デオキシヌクレオチドミックス、TagDNAポリメラーゼは、Taka

反応パッファー、テオキシヌグレオチドミックス、TaqDNAポリメラーセは、 Taka ra社製のものを使用。

反応条件: 94度C,3分,1回 → 94度C,1分;55度C,2分;72度C,2分;3回

→ 94度C, 45秒; 55度C, 1分; 72度C, 1分; 36回

### [0213]

増幅されたDNAがGenbankのデータベースにあるとおり、制限酵素HindIIIで一箇所切断されることを確認して、pBluescriptプラスミドのEcoRV切断部位へサブクローニングした。このプラスミドDNA(S8)を制限酵素BamHIとXhoIで切断して、アガロースゲル電気泳動でPCR断片(約550塩基対)を精製したものをプローブとした。ターゲッティングベクターで形質転換したTT2F ES細胞のゲノムDNAを制限酵素EcoRIとXhoIで消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロットを行ない、上記プローブで検出した。

ッティングベクターを制限酵素SacII(宝酒造)で線状化し、(相沢慎一、バイ オマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995)の方法に従いマ ウスES細胞TT2Fへ導入した。TT2F細胞をトリプシン処理し、2.5x10<sup>7</sup>個/mlとな るようにHBSに懸濁してから5μgDNAを加え、ジーンパルサー(バイオラッド、抵 抗器ユニット接続せず)を用いてエレクトロポレーションを行なった。960μFの 容量で250Vの電圧を4mm長のエレクトロポレーションセルを用いて室温で印加し た。エレクトロポレーションした細胞を20mlのES培地に懸濁し、あらかじめフィ ーダー細胞をまいた100mm組織培養用プラスチックシャーレ(コーニング)2枚に 播種した。同様に10,15μgDNAを用いた実験も行った。1日後に300μg/mlのG41 8 (GENETICIN,シグマ)を含む培地と置き換えた。7~9日後に生じたコロニー計1 76個をピックアップし、それぞれを12穴プレートでコンフルーエントになるまで 増殖させ、その4/5を0.2mlの保存用培地(ES培地+10%DMSO<シグマ>) に懸濁し、 -80℃にて凍結保存した。残りの1/5は12穴ゼラチンコートプレートに播種し、2 日間培養して、10<sup>6</sup>~10<sup>7</sup>個の細胞からゲノムDNAをPuregene DNA Isolation Kit (Gentra System社) により調製した。これらのG418耐性TT2F細胞ゲノムDNAを制 限酵素EcoRIとXhoI(宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザ ンブロットを行ない、実施例48-3に示したプローブで相同組換え体を検出した。 その結果176株中3株が相同組換え体であるという結果を得た。野生型TT2F細胞及 び相同組換え体#131、#141のサザンブロット解析の結果を(図28) 左側3レーン に示す。野生型TT2F細胞ではEcoRI、XhoI消化により2本のバンド(a、b)が検出 された。相同組換え体においては、これらのいずれかのバンドが消失し、新たに 下部にバンド(c)が現われることが予想される。図中#131, #141においてaのバ ンドが消失し、新たにcのバンドが出現している。図中左側にはDNAの大きさを示 した。すなわちこれらのクローンは抗体重鎖遺伝子の片方のアレルが相同組換え により破壊されたものである。

[0217]

(実施例50) 抗体重鎖相同組換え体ES細胞からのキメラマウス作成

(実施例49)で得られた抗体重鎖相同組換え体TT2F細胞株#131を凍結ストックより立ち上げ、 ICRまたはMCH(ICR) (日本クレア社) 雄雌マウスの交配により得

[0214]

# 4. マウス抗体遺伝子軽鎖κ破壊用ベクターの作製

2で調製したマウス抗体軽鎖 κ J 領域および定常 (C) 領域を含むゲノムDNA の C 領域が含まれるDNA断片 (SacII~BglII) を 1 で作製したLoxP-STneo遺伝子の KpnI部位をつぶしたものと置き換えた (図27)。STneo の転写方向は、抗体遺伝子の転写方向と逆向きとなっている。このプラスミドDNAは以下のように構築した。pUC18 プラスミドのマルチクローニング部位の配列 (EcoRI-HindIII)をDN A化学合成によって作製した配列:

- 5'-AATTCCCGCGGGTCGACGGATCCCTCGAGGGTACCA -3'(配列番号63)
- 3'- GGGCGCCCAGCTGCCTAGGGAGCTCCCATGGTTCGA-5'(配列番号64)

EcoRI SacII SalI BamHI XhoI KpnI HindIII

[0215]

に変換した。このプラスミドのEcoRI、SacII 部位へJκを含むEcoRI ~SacII DNA 断片(図25)を挿入した。次に、できたプラスミドのBamHI、XhoI部位へ3'-側 BglII~BglII~XhoI DNA断片(図25)を挿入した。このプラスミドのXhoI部位、SalI部位に順次、DTを含むXhoI~SalI DNA断片、KpnI断片を潰したLoxP-STneoを含むXhoI DNA断片を挿入した。DT遺伝子の転写方向は、軽鎖κ遺伝子の転写方向と同じ向きとなる。このプラスミドDNAは、大腸菌DH5を用いて増幅し、セシウムクロライド平衡遠心により精製した。精製したプラスミドDNAは、制限酵素KpnIにより、一箇所切断してTT2F ES細胞へのトランスフェクションに使用した。形質転換体TT2F ES細胞の中から抗体軽鎖部分がターゲッティングベクターと相同組換えが起こったクローンを検出するための形質転換体ゲノムDNAサザンブロット用のプローブとして、軽鎖Jκ-CκゲノムDNA(図25参照)の3'端のDNA断片(XhoI~EcoRI;約1.4k塩基対)を用いた。ターゲッティングベクターで形質転換したTT2F ES細胞のゲノムDNAを制限酵素EcoRIで消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロットを行ない、上記プローブで検出した。

[0216]

(実施例49) マウスES細胞抗体重鎖遺伝子破壊株の取得

抗体重鎖遺伝子相同組換え体取得の為、実施例48-3で作成した抗体重鎖ターゲ

られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩 培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。計94個の注入胚を移植した結果、22匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2F細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した22匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は18匹であった。うち16個体は毛色の80%以上が野生色の(ES細胞に由来する)雌キメラマウスであった。この結果より、抗体重鎖相同組換え体ES細胞株#131はキメラ形成能を保持していることが確認された。得られたキメラマウスのうち多くの個体は非常に高い貢献率を示す雌であるので、ES細胞が機能的な生殖細胞(卵子)に分化している可能性が高い。キメラマウスのうち100%の貢献率を示す雌キメラ2個体をMCH(ICR)雄マウスと交配した結果、生まれた子マウスはすべて野性色を示した。これらの子マウスは#131由来であり(実施例42参照)、2匹に1匹の割合で破壊された抗体重鎖アレルが伝達していると考えられる。

# [0218]

# (実施例51) 抗体重鎖相同組換え体からの2重破壊株の取得

片側アレルがG418耐性遺伝子の挿入により破壊されたES細胞株において、培養液中のG418濃度を上げて培養することにより得られる高濃度G418耐性株をスクリーニングすれば両側アレル共に破壊された株を取得することが可能なことが報告されている(相沢慎一ら、バイオマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995)。これに基づき、我々はTT2F抗体重鎖相同組換え体#131,#141について両側アレルの破壊株取得の為、以下の実験を行った。まず、#131,#141両株について致死G418濃度検定のため35mmシャーレ各10枚(この実施例においては栄養細胞はマイトマイシン処理をしていないG418耐性初代培養細胞(ライフテックオリエンタル社より購入)を使用した。実施例9参照)に1枚あたり約100個の細胞を播種し、0,0.5,1,2,3,5,8,10,15,20 mg/mlのG418 (GENETICIN、シグマ)をそれぞれ含むES培地中で10日間培養した。その結果3mg/mlの濃度までは明らかなコロニーが認められたが、5mg/mlではコロニー形成は認められなか

容量で250Vの電圧を4mm長のエレクトロポレーションセル(165-2088、バイオラ ッド)を用いて印加した。エレクトロポレーションした細胞を5mlのES培地に懸 濁し、あらかじめフィーダー細胞をまいた60mm組織培養用プラスチックシャーレ (コーニング)1枚に播種した。2日後に細胞をトリプシン処理し、フィーダー細 胞をまいた100mmシャーレ3枚にそれぞれシャーレ1枚当たり100、200、300細胞と なるように再度播種した。ジーンパルサーの設定(抵抗器ユニット接続、抵抗値 無限大)のみ変更した条件でも同様に行った。7日後に生じたコロニー計96個を ピックアップし、トリプシン処理した後2つに分け、フィーダー細胞をまいた48 穴プレート及びゼラチンコート処理のみを行った48穴プレート2枚にそれぞれ播 種した。後者は300 μ/mlのG418 (GENETICIN、シグマ) を含む培地で3日間培養し 、その生存率でG418耐性を判定した。その結果6クローンがG418存在下で死滅し た。これらのG418感受性株を35mmシャーレでコンフルーエントになるまで増殖さ せ、その4/5を0.5mlの保存用培地(ES培地+10%DMSO<シグマ>) に懸濁し、-80℃ にて凍結保存した。残りの1/5は12穴ゼラチンコートプレートに播種し、2日間培 養して、10<sup>6</sup>~10<sup>7</sup>個の細胞からゲノムDNAをPuregene DNA Isolation Kit (Gentr a System社)により調製した。これらのG418感受性TT2F細胞株ゲノムDNAを制限 酵素EcoRI(宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロッ トを行ない、G418耐性遺伝子を含むpSTneoB由来3.2kb XhoI断片(プローブA) でG418耐性遺伝子の除去を確認した。その結果、#131-3において観察される、プ ローブAとハイブリダイズするバンドが、感受性株においては全く検出されなか った。これらの結果より、取得されたG418感受性株において確かにG418耐性マー カー遺伝子が除去されていることが確認された。さらに上記と同様な方法でpBS1 85DNAをEcoRI消化したプローブBを用いてサザン解析を行った結果、これらG418 感受性株にプローブBとハイブリダイズする特異的なバンドは検出されなかった ことから、Creレコンビナーゼを含むpBS185は感受性株染色体に挿入されていな いと考えられる。すなわち、これらの感受性株は実施例48-4に示した抗体軽鎖ノ ックアウトベクター(G418耐性遺伝子の両側にloxP配列が存在する)による形質 転換を行うことができる。このG418感受性株#131-3-5より実施例40の方法に従っ て、キメラマウスを作製した。その結果、毛色のキメラ率100%のマウスが得られ

10 1 1 0 0 1

た。

[0220]

(実施例53) 抗体重鎖欠損ES細胞株へのヒト14番染色体(抗体重鎖)の導入

(実施例52)で得られた、内在性の抗体重鎖を欠損するマウスES細胞株 (TT2F由来、G418感受性)に(実施例9)で示した通りにG418耐性遺伝子によりマーキングされたヒト14番染色体(抗体重鎖遺伝子を含む)をミクロセル法により導入する。得られるG418耐性株においてPCR解析等(実施例9)によりヒト抗体重鎖遺伝子を含むヒト14番染色体(断片)の保持が確認される。

[0221]

(実施例54) ヒト14番染色体(断片)を保持する抗体重鎖欠損ES細胞株へのヒト 2番染色体断片あるいは22番染色体の導入

(実施例53)で得られた、ヒト14番染色体断片を保持する抗体重鎖欠損マウスES細胞株(G418耐性)に(実施例18、35)で示した通りにピューロマイシン耐性遺伝子によりマーキングされたヒト2番染色体断片(抗体軽鎖κ遺伝子を含む)あるいはヒト22番染色体(抗体軽鎖λ遺伝子を含む)をミクロセル法により導入する。得られるピューロマイシン、G418二重薬剤耐性株においてPCR解析等(実施例18、35)によりヒト14番染色体(断片)及び2番染色体断片あるいは22番染色体(断片)の保持が確認される。

[0222]

(実施例55) ヒト抗体重鎖遺伝子を含む14番染色体(断片)を保持する内在性抗体重鎖欠損マウスES細胞からのキメラマウス作成

(実施例53)で取得されるヒト抗体重鎖遺伝子を含む14番染色体(断片)を保持する内在性抗体重鎖遺伝子欠損マウスES細胞株からのキメラマウス作成は(実施例10)で示した方法により行う。ここで得られるキメラマウスにおいては、ES細胞株由来のB細胞で産生されるヒト抗体重鎖が(実施例14)で示した方法により検出される。また、このES細胞由来のB細胞において機能的な抗体重鎖遺伝子は導入染色体上のヒト由来のもののみであるので、ES細胞株由来B細胞の多くはヒト抗体重鎖を産生する。

[0223]

(実施例56) ヒト14番+2番、14番+22番染色体(断片)を保持する内在性抗体 重鎖欠損マウスES細胞からのキメラマウス作成

(実施例54)で取得されるヒト14番+2番、14番+22番染色体(断片)を保持する内在性抗体重鎖遺伝子欠損マウスES細胞株からのキメラマウス作成は(実施例19、36)等で示した方法により行う。ここで得られるキメラマウスにおいては、ES細胞株由来のB細胞でヒト抗体重鎖及び軽鎖 κあるいは軽鎖 λが(実施例14、23、32)で示した方法により検出される。また、(実施例55)と同様にこのES細胞由来のB細胞において機能的な抗体重鎖遺伝子は導入染色体上のヒト由来のもののみであるので、ES細胞由来B細胞の多くはヒト抗体重鎖を産生する。さらに、(実施例37、38)で示したように重鎖、軽鎖が共にヒト由来である完全なヒト抗体分子が検出される。

[0224]

(実施例57) ヒト14番+2番、14番+22番染色体(断片)を保持する内在性抗体 重鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスからのヒト抗体産生ハイブリドーマ取得 (実施例15、25、34)と同様に(実施例56)で作成されるキメラマウスに目的 とする抗原で免疫し、脾臓を取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリ ドーマを作成する。1~3週間培養し培養上清をELISA法で解析する。ELISA法は( 実施例14、15、21、24、25、33、34、37、38)に示した方法で行ない、ヒト抗体 陽性及びヒト抗体陽性かつ免疫した抗原特異的クローンを得る。

[0225]

(実施例58) 抗体重鎖欠損ホモ接合体マウスES細胞からの抗体軽鎖遺伝子破壊株の取得

実施例52で取得した抗体重鎖欠損ホモ接合体TT2F細胞株(G418感受性)においてさらに抗体軽鎖遺伝子を破壊した相同組換え体を以下の手順で取得した。実施例48-4で作製した抗体軽鎖ターゲッティングベクターを制限酵素KpnI(宝酒造)で線状化し、(相沢慎一、バイオマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995)の方法に従い実施例49と同様に上記TT2F細胞株(G418感受性)へ導入した。すなわち、細胞をHBSに懸濁し、2.5 x 10<sup>7</sup> cells/mlの懸濁液とした

後、DNA 5 μg を0.5 mlの細胞懸濁液に加え、エレトクロポレーションセルに96 0μF、250 V の電圧を印加した。7~9日後に生じたコロニーをピックアップし、実施例49に示した方法で凍結保存、ゲノムDNAを取得した。G418耐性株ゲノムDNAを制限酵素EcoRI (宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロット解析を行ない、実施例48-4に示したプローブで相同組換え体を検出した。結果を図29に示す。親株である抗体重鎖欠損ホモ接合体TT2F細胞ではEcoRI消化により1本のバンド(a)が検出された。相同組み換え体においては、このバンドに加えて新たに下部にバンド(b)が現れることが予想される。図中、形質転換株2、5において(b)のバンドが出現している。図中、左側にはDNAの大きさを示した。すなわち、これらのクローンは抗体軽鎖遺伝子の片方のアレルが相同組み換えによって破壊されたものである。解析した120株中28株の相同組み換え体を得た。これらのクローンは、通常の培養条件において、遺伝子破壊以前のTT2F株と比較して、増殖速度および形態に変化が見られず、キメラマウス形成能を保持していることが示唆される。

[0226]

(実施例59) 抗体軽鎖相同組換え体からの2重破壊株の取得

実施例58で得られたTT2F抗体軽鎖相同組換え体(かつ抗体重鎖欠損ホモ接合体)について軽鎖両側アレルの破壊株を以下の手順により取得した。実施例51と同様な方法で高濃度G418耐性株を取得した。G418濃度9~14 mg/mlの5~7日間培養を行った後、G418濃度を4 mg/ml に下げ培養し、培養開始から10~13日後に生じたコロニーをピックアップし、実施例51と同様な方法で凍結保存、DNA取得を行なった。高濃度G418耐性株ゲノムDNAを制限酵素EcoRIとNotI(宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロットを行ない、実施例48-4に示したプローブで両側アレルの破壊された株を検出した。サザンブロット解析の結果を図32に示す。2重破壊株では図32の(a)のバンドが消失し、バンド(b)のみになることが予想される。図中、高濃度G418耐性株2、3、8においてバンドが消失している。すなわち、これらクローンは抗体軽鎖遺伝子の両側のアレルが破壊されたものである。それぞれ独立した片側アレル破壊株3株から得られた高濃度耐性株を解析し、それぞれ59株中36株、43株中2株、49株中1株の抗体軽鎖遺

った。この結果をもとに最小致死濃度を5mg/mlと決定し、4,5,6,7,8mg/mlの 各濃度で高濃度G418耐性株の選抜を行った。#131, #141それぞれについて100mm シャーレ計10枚に1枚当たり約10<sup>6</sup>個の細胞を播種し、上記の各濃度のG418を含む ES培地(5段階、各濃度シャーレ2枚づつ)により培養した。培養開始12日後に7m g, 8mg/mlのシャーレにおいて明らかなコロニー(#131:12株、#141:10株)を ピックアップし、実施例49と同様に凍結保存、DNA取得を行った。これらの高濃 度G418耐性株ゲノムDNAを制限酵素EcoRIとXhoI(宝酒造)で消化し、アガロース ゲル電気泳動で分離後サザンブロットを行ない、実施例48-3に示したプローブで 両側アレルの破壊された株を検出した。その結果#131株由来の1株(#131-3)が 両側アレル破壊株であるという結果を得た。#131由来の6株についてのサザンブ ロット解析の結果を(図28)に示す。野生型TT2F細胞ではEcoRI、XhoI消化によ り2本の野生型バンド(a、b)が検出された。片側アレル相同組換え体(#131,# 141) においては、上部のバンドaが消失し、新たにバンドcが現われた(実施例4 9)。さらに両側アレルが破壊されることにより、もう一方の野生型バンドbが消 失し、破壊型バンドcのみとなることが予想される。図中3(#131-3)のクローン においてこのバンドパターンが観察された。すなわちこのクローンは抗体重鎖遺 伝子の両方のアレルが破壊されたものである。

### [0219]

(実施例52) 抗体重鎖欠損ホモ接合体TT2F細胞株からのG418耐性マーカー遺伝子の除去

実施例51で取得された抗体重鎖両側アレル破壊株(高濃度G418耐性株#131-3)のG418耐性マーカー遺伝子を以下の手順により除去した。G418耐性マーカー遺伝子の両側に挿入したloxP配列(実施例48-1)の間で部位特異的組換えを起こすCreレコンビナーゼ遺伝子を含む発現ベクターpBS185 (BRL)を(相沢慎一、バイオマニュアルシリーズ8,ジーンターゲティング,羊土社,1995、及び高津聖志ら、実験医学別冊、免疫研究の基礎技術、p255-、1995、羊土社)の方法に従い#131-3株へ導入した。#131-3細胞をトリプシン処理し、2.5x10<sup>7</sup>個/mlとなるようにHBSに懸濁してから30μgのpBS185DNAを加え、ジーンパルサー (バイオラッド、抵抗器ユニット接続せず)を用いてエレクトロポレーションを行なった。960μFの

伝子の両側のアレルが破壊されたクローンを取得した。これらのクローンは、通 常の培養条件において、遺伝子破壊以前のTT2F株と比較して、増殖速度および形

態に変化が見られず、キメラマウス形成能を保持していることが示唆される。

[0.227]

(実施例60) 抗体軽鎖欠損ホモ接合体(かつ抗体重鎖欠損ホモ接合体) TT2F細胞 株からのG418耐性マーカー遺伝子の除去

実施例59で取得された抗体軽鎖両側アレル破壊株(高濃度G418耐性株)のG418 耐性マーカー遺伝子を実施例52で示した手順により除去した。G418耐性マーカー遺伝子の両側に挿入したloxP配列(実施例48-1)の間で部位特異的組換えを起こすCreレコンビナーゼ遺伝子を含む発現ベクターpBS185 (BRL)を実施例52の方法に従い上記の株へ導入した。実施例52と同様に得られるG418感受性株を35mmシャーレでコンフルーエントになるまで増殖させ、その4/5を0.5mlの保存用培地(ES 培地+10%DMSO<シグマ>)に懸濁し、-80℃にて凍結保存した。残りの1/5は12穴ゼラチンコートプレートに播種し、2日間培養して、10<sup>6</sup>~10<sup>7</sup>個の細胞からゲノムD NAをPuregene DNA Isolation Kit (Gentra System社)により調製した。これらのG418感受性TT2F細胞ゲノムDNAを制限酵素EcoRI (宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザンブロットを行ない、G418耐性遺伝子を含むpSTneo B由来3.2kbXhoI断片をプローブとし、G418耐性遺伝子の除去を確認した。

[0228]

(実施例61)

(1) 内在性抗体重鎖、κ鎖欠損ES細胞株へのヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)の導入

(実施例78)で得られた内在性の抗体重鎖及びκ鎖の両者を欠損するマウスES 細胞株 (TT2F由来、G418、ピューロマイシン感受性) HKD31に (実施例68-(2))に示す通りヒト14番染色体断片SC20 (ヒト抗体重鎖遺伝子を含む)をミクロセル法により導入した。ミクロセル融合およびG418耐性株の選択は (実施例2)と同様に行った。得られたG418耐性株のうち8株についてIgM、D14S543プライマーを用いたPCR解析 (実施例68)を行った結果、7株中8株において両者が検出された。よってこれらの抗体重鎖、κ鎖欠損ES細胞株は、ヒト14番染色体断片SC20を保

持していることが確認された。

[0229]

(2) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞からのキメラマウス作成

実施例61-(1)で取得されたヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞株HKD31-8からのキメラマウス作成は(実施例10)等で示した方法により行った。計188個の注入胚を移植した結果、25匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した25匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は17匹であった。うち3個体は毛色がほぼ完全(95%以上)に野生色の(ES細胞に由来する)キメラマウスであった。

この結果より、ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞株はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

[0230]

(3) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウス血清におけるヒト抗体 (ヒトμ、γ、 α鎖を有する抗体)の検出

実施例61-(2)で作製したキメラマウス(HKD31-8由来)から生後12週齢(#1)または生後7週齢(#2~4)に採血し、血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法で定量した。PBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(シグマ、I6385)、あるいは抗ヒト免疫グロブリンγ鎖抗体(シグマ、I3382)あるいは抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08091D)を96穴マイクロタイタープレートにコーティングし、マウス血清(シグマ、M5905)を加えたPBSで希釈した血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(The-Binding-Site-Limited、MP008)あるいはペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンγ鎖抗体(シグマ、A0170)を加えてインキュベートした。あるいはビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加るいはピオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加るいはビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加るいはビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加るいはビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加るいはビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(Pharmingen、08092D)を加

えてインキュベートした後、プレートを洗浄し、アビジンーペルオキシダーゼ複合体(Vector、ABCキットPK4000)を加えてインキュベートした。ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を45のnmの吸光度で評価し、精製されたμ鎖、γ鎖、α鎖を持つ濃度既知のヒトイムノグロブリンIgM(CAPPEL、6001-1590)、IgG(シグマ、I4506)、IgA(シグマ、I2636)をマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のヒト抗体濃度を求めた。結果を表20に示す。ヒト抗体μおよびγ鎖濃度が、通常のマウス血清中の抗体濃度とほぼ同レベルに高い、キメラマウス個体が確認された。またヒトα鎖を発現するキメラマウス個体が確認された。さらに(実施例29)の方法に従い、ヒト免疫グロブリンγ鎖サブクラスを検出し、4種のサブクラス(γ1、γ2、γ3、γ4)すべてが検出された。

この結果からヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスにおいてヒト抗体重鎖遺伝子が効率良く発現し、 μ鎖さらにはクラススイッチによってすべての γ鎖サブクラスおよび α鎖も発現することが示された。

### [0231]

### 【表20】

表20 キメラマウス中のヒト抗体濃度 (ELISA)

キメラマウス	拟声率%	_ ヒト	亢体 (mg/l)
#1 #2 #3	90 99	IgM Ig 270 125 370 82	G IgA 0 0.46 0 0.23
#4	<b>9</b> 9 <b>9</b> 5	550 146 340 230	

#### [0232]

(4) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスからのヒト γ鎖を含む抗HSA抗体産生ハイブリドーマの取得

実施例61-(3) で血清中のヒト抗体γ鎖濃度が高いキメラマウス#3 (HKD31-8 由来、キメラ率99%) および#4 (キメラ率95%) に対して、生後16週齢からPBSに溶解したヒト血清アルブミン (HSA、シグマ、A3782) とアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Reseach Inc.) とを混合して0.25mg/mlのHSA溶液を

調整し0.2m1を2週間おきに2回腹腔に免疫し、さらに2週間後にPBSに溶解したヒト血清アルブミンを免疫し、採血した。血清中の抗HSAヒト抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。HSAをコーティングし、ペルオキシダーゼ標識した抗ヒトIg  $\mu$ 抗体(The Binding Site, MP008)、抗ヒトIg  $\gamma$ 抗体(シグマ、A1070)、抗ヒトIg  $\alpha$ 抗体(Kirkegaard & Perry Labolatories Inc., 14-10-01)を用いて検出した。結果を図33に示す。ハイブリドーマの作製法は〈安東、単クローン抗体実験操作入門、講談社サイエンティフィク,1991〉に記された方法に従い、ミエローマ細胞としては、SP-2/0-Ag14(大日本製薬)を使用した。最終免疫の3日後に、キメラマウスからひ臓を取り出し、(実施例24)に従いPEGにて細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。同時に採血し、(実施例29)の方法に従い、血清中のヒトIg  $\gamma$  サブクラスの定量を行った。キメラマウス33の血清中には $\gamma$ 1 が320mg/1、 $\gamma$ 2 が520mg/1、 $\gamma$ 3 が11mg/1、 $\gamma$ 4 が140mg/1 存在した。

### [0233]

融合後の細胞を、ひ細胞数が100万個/mlとなるよう、HCF (エア・ブラウン) を5%添加し、HAT (大日本製薬、No.16-808-49) あるいは1mg/mlのG418を添加し た培地(三光純薬、エス・クローンクローニングメデュームCM-B)に希釈し、各 wellに100 μ l ずつ96 穴プレート分注し培養した。培養8日目に培養上清を採取し 、(実施例14)に従いELISA法によってヒト抗体産生ハイブリドーマのスクリー ニングを行った。CBB緩衝液に溶解し5μg/mlとしたHSA溶液をコーティングし、 ペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンγ鎖抗体(シグマ、A0170)を用い てTMBZ (住友ベークライト、ML-1120T) により検出した。陰性対照の約3倍以上 の吸光度を目安にして判定し、キメラマウス#3より74個、キメラマウス#4より 29個の陽性ウエルを得た。またHSA溶液をコーティングし、ペルオキシダーゼ標 識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(Tago、#2392)を用いてヒトμ鎖を持つ抗HSA 抗体をスクリーニングした。キメラマウス#3の融合処理細胞をまきこんだ96穴 プレート15枚の中でG418選択を行ったプレート4枚の培養上清をスクリーニング し5個の陽性ウエルを得た。HATあるいは1mg/mlのG418による選択でコロニー出現 したウエルはプレート1枚あたり各々、74個および29個であった。ヒトγ鎖を持 つ抗HSA抗体陽性で、細胞数が比較的多いウエルの細胞を48穴プレートに移しさ

らに4日間培養し、培養上清中の抗体のアイソタイプをELISAにより決定した。HS A溶液をコーティングし、アルカリフォスファターゼ標識した抗ヒトIgG1抗体(Z ymed labolatories,Inc.、05-3322)、抗ヒトIgG2抗体(Zymed labolatories,In c.、05-3522)、抗ヒトIgG3抗体(Zymed labolatories,Inc.、05-3622)、抗ヒトIgG4抗体(Zymed labolatories,Inc.、05-3822)を用いて(実施例14)に従いELISAを行い判定した。陽性クローンはヒトIgG1が27、IgG2が11、IgG3が2、IgG4が13クローンあった。キメラマウス#4の融合処理細胞も同様に判定し、細胞数の多いクローン4株を判定し、ヒトIgG1産生クローンを得た。

### [0234]

この結果よりヒト抗体遺伝子(重鎖)を含む14番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスにヒトのタンパク(HSA)を免疫することによって、抗原特異的ヒトIgμ、γおよびα抗体価の上昇が起り、μ鎖およびすべてのヒトγ鎖サブクラスを含む抗HSA抗体産生ハイブリドーマの取得が可能であることが示された。

### [0235]

(実施例62) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞へのヒト2番染色体(軽鎖κ遺伝子を含む)の導入

実施例61-(1)で得られた、内在性抗体重鎖及び κ鎖欠損かつヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持するマウスES細胞株HKD31-8に(実施例18)で示した通りにピューロマイシン耐性遺伝子でマーキングされたヒト2番染色体断片(抗体軽鎖 κ遺伝子を含む)をミクロセル法により導入した。その結果得られたピューロマイシン、G418二重耐性株13株についてPCR解析(実施例18)を行った。使用したプライマーは14番染色体断片についてはIgMおよびD14S543の2種(実施例68)、2番染色体断片についてはVκ1およびFABP1の2種(実施例12)である。その結果、8株において4種全てのマーカーの存在が確認された。そのうちKH13株についてはヒト染色体特異的プローブを用いてFISH解析を行った(実施例9、12)。その結果を図34に示す。KH13においてはプローブにハイブリダイズする独立した染色体小断片が2本観察された。これらの結果より、KH13は14番染する独立した染色体小断片が2本観察された。これらの結果より、KH13は14番染

色体断片および2番染色体断片を同時に保持することが示された。

[0236]

(実施例63) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞へのヒト22番染色体(軽鎖λ遺伝子を含む)の導入

実施例61-(1)で得られた、内在性抗体重鎖及び x 鎖欠損かつヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)を保持するマウスES細胞株HKD31-8に(実施例35)で示した通りにピューロマイシン耐性遺伝子でマーキングされたヒト22番染色体(抗体軽鎖 2 遺伝子を含む)をミクロセル法により導入した。その結果得られたピューロマイシン、G418二重耐性株12株についてPCR解析(実施例35)を行った。使用したプライマーは14番染色体断片についてはIgMおよびD14S543の2種、2 2番染色体断片についてはIg 2、D22S315、D22S275、D22S278、D22S272、D22S274の6種(実施例2)である。その結果、10株において8種全てのマーカーの存在が確認された。残り2株のうちLH13株においては8種中IgM、D14S543、IgI、D22S275、D22S274の5種のマーカーのみが確認されたので、この株は断片化されたヒト22番染色体を含むと考えられる。さらにLH13についてはヒト22番染色体特異的プローブおよびヒト14番染色体特異的プローブを各々用いてFISH解析を行った。その結果、それぞれのプローブにハイブリダイズする独立した染色体断片が観察された。すなわちこの株は14番染色体断片および22番染色体断片を同時に保持することが示された。

[0237]

(実施例64) ヒト2番(抗体軽鎖 κ)、14番(抗体重鎖)、22番(抗体 λ鎖)染 色体あるいはその部分断片を同時に保持する内在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES 細胞の取得

3種のヒト染色体を同時に保持するマウスES細胞を得るために、ヒト2番あるいは22番染色体をブラストサイジン耐性(Izumiら、Exp. Cell. Res., 197, 229, 1991)、ハイグロマイシン耐性(Windら、Cell, 82, 321-, 1995)-等のマーカー遺伝子の挿入によりマーキングする。これは(実施例16、26)に示した方法により行う。(実施例62)で得られた、内在性抗体重鎖及び軽鎖欠損でありかつヒト

14番染色体(断片)及び2番染色体部分断片を保持するマウスES細胞株(TT2F由来、G418耐性、ピューロマイシン耐性)に(実施例9)で示した方法と同様にブラストサイジン耐性あるいはハイグロマイシン耐性等でマーキングされたヒト22番染色体(ヒト抗体軽鎖入遺伝子を含む)を導入する。ES細胞培養用のフィーダー細胞はそれぞれの選択マーカーに適したものを使用する。ハイグロマイシン耐性マーカーを使用する場合は、そのマーカーを保持し、発現するトランスジェニックマウス系統より得た初代培養繊維芽細胞(Johnsonら、Nucleic Acids Research, vol. 23, No. 7, 1273-, 1995)を使用する。得られるG418、ピューロマイシン、ハイグロマイシン(あるいはブラストサイジン)三重耐性株は上記3種のヒト染色体(断片)を保持していることがPCR解析等(実施例9、18、35)により確認される。(実施例63)で得られた内在性抗体重鎖及び軽鎖欠損でありかつヒト14番染色体(断片)及び22番染色体(断片)を保持するマウスES細胞株(TT2F由来、G418耐性、ピューロマイシン耐性)へのハイグロマイシンあるいはブラストサイジン耐性遺伝子でマーキングされたヒト2番染色体断片の導入も同様に行う。

### [0238]

(実施例65) ヒト抗体重鎖および軽鎖遺伝子をそれぞれ含む複数の染色体 (断片) を同時に保持する内在性抗体重鎖、軽鎖遺伝子欠損マウスES細胞からのキメラマウス作成

(実施例61、62、63、64)で取得されるヒト抗体遺伝子を含む染色体(断片)を保持する内在性抗体重鎖、軽鎖遺伝子欠損マウスES細胞株からのキメラマウス作成は(実施例10)等で示した方法により行う。ここで得られるキメラマウスにおいては、宿主胚由来のB細胞で産生されるマウス抗体とES細胞株由来のB細胞で主に産生されるヒト抗体が(実施例14、23、32)で示した方法により検出される。また、このES細胞由来のB細胞において機能的な抗体重鎖及び軽鎖 κ遺伝子は導入染色体上のヒト由来のもののみであるので、ES細胞由来のB細胞の多くはヒト抗体重鎖及び軽鎖 κ を産生する(Lonbergら,Nature,368,856-,1994)。さらに、(実施例37、38)で示した方法により重鎖、軽鎖が共にヒト由来である完全なヒト抗体分子が検出される。

[0239]

(1) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト2番染色体断片(軽鎖 κ遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES 細胞からのキメラマウス作成

実施例62で取得されたヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト2番染色体断片(軽鎖κ遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞株KH13からのキメラマウス作成は(実施例10)等で示した方法により行った。計176個の注入胚を移植した結果、20匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した20匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は7匹であった。

この結果より、ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト2番染色体断片(軽鎖 κ 遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、 κ 鎖遺伝子 欠損マウスES細胞株はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常 組織に分化する能力を保持していることが確認された。

[0240]

(2) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト22番染色体断片(軽鎖 λ鎖遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞からのキメラマウス作成

実施例63で取得されたヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト22番染色体断片(軽鎖 λ 遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞株LH13からのキメラマウス作成は(実施例10)等で示した方法により行った。計114個の注入胚を移植した結果、22匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した22匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は5匹であった。

この結果より、ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)及びヒト22番染

色体断片(軽鎖λ鎖遺伝子を含む)を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖遺伝子欠損マウスES細胞株はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

### [0241]

(3) ヒト2番染色体部分断片及びヒト14番染色体部分断片を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウス血清における完全ヒト抗体の検出・定量

実施例65-(1)で作製したキメラマウス(KH13由来)から生後40日目に採血し、血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。PBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリンκ鎖抗体(Kirkegaard & Perry Labolatories Inc.、01-10-10)あるいは抗ヒト免疫グロブリンκ鎖抗体(Vector、AI-3060)をコーティングし、マウス血清(シグマ、M5905)を加えたPBSで希釈した血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(The Binding Site Limited、MP008)あるいはペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンγ鎖抗体(シグマ、A0170)を加えてインキュベートした。ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価し、精製されたμ鎖とκ鎖を持つ濃度既知のヒトイムノグロブリンIgM(Caltag、13000)、IgG(シグマ、I4506)をマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のヒト抗体濃度を求めた。結果を表21に示す。完全ヒト抗体濃度が内在性遺伝子を破壊しないES細胞から作製されたキメラマウスに比べて、10倍以上高いキメラマウス個体が確認された。またヒトγ鎖を含む完全抗体がキメラマウス血清中に確認された。

この結果よりヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスにおいて、重鎖と軽鎖がともにヒトである完全ヒト抗体濃度が上昇することが確認された。

[0242]

【表21】

表21 キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA) ESクローン キメラマウス キメラ率% IgM, κ(mg/l) IgG, κ(mg/l) KH13 CKH13-1 95 0.1 0.07 KH13 CKH13-2 85 0.9 0.13

[0243]

(4) ヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウス血清における完全ヒト抗体の検出・定量

実施例65-(2)で作製したキメラマウス (LH13由来)からから生後49日目に採血し、血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。PBSで希釈した抗ヒト免疫グロブリン 2 鎖抗体 (Kirkegaard & Perry Labolatories Inc.、01-10-11)あるいは抗ヒト免疫グロブリン 2 鎖抗体 (Vector、AI-3070)をコーティングし、マウス血清(シグマ、M5905)を加えたPBSで希釈した血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリン μ鎖抗体 (The Binding Site Limited、MP008)あるいはペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリン γ 鎖抗体 (シグマ、A0170)を加えてインキュベートした。ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ(住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素活性を450nmの吸光度で評価し、精製された μ鎖と κ鎖を持つ濃度既知のヒトイムノグロブリン IgM (Caltag、13000)、IgG (シグマ、I4506)をマウス血清を添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のヒト抗体濃度を求めた。結果を表22に示す。完全ヒト抗体濃度が内在性遺伝子を破壊しないES細胞から作製されたキメラマウスに比べて、約40倍高いキメラマウス個体が確認された。またヒト γ 鎖を含む完全抗体がキメラマウス血清中に確認された。

この結果よりヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、 κ鎖欠損マウスES細胞由来キメラマウスにおいて、重鎖と軽鎖がともにヒトである完全ヒト抗体濃度が上昇することが確認された。

14410 720

[0244]

【表22】

表22 キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA) ESクローン キメラマウス キメラ率% IgM, 2 (mg/l) IgG, 2 (mg/l) LH13 CLH13-1 95 13 2.6 LH13 CLH13-2 90 2.8 0.36

[0245]

(実施例66) ヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に移入して作製したキメラマウスからの完全ヒト抗体産生ハイブリドーマの取得

(実施例67-(3)) で作製されたキメラマウスCLH13-3 (TT2FESクローンLH13由 来、キメラ率35%) に対して、生後43日目からHSAによる免疫を開始した。PBSに 溶解したヒト血清アルブミン (HSA、シグマ、A3782) とアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Reseach Inc.) とを混合して0.25mg/mlのHSA溶液を 調整し、その0.2mlを1週間おきに2回腹腔に免疫した。さらに1週間後にPBSに溶 解したヒト血清アルブミンを免疫した。1週間おきに採血し、血清中の抗HSAヒト 抗体濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。結果を図35に示す。最終免 疫の3日後に、キメラマウスからひ臓を取り出し、(実施例24)に従いPEGにて細 胞融合し、ハイブリドーマを作製した。融合後の細胞を、ひ細胞数が100万個/ml となるよう、HAT (大日本製薬、No.16-808-49) あるいは1mg/mlのG418を添加し た培地(三光純薬、エス・クローンクローニングメデュームCM-B)に希釈し、96 穴プレートの各wellに100μlずつ分注し培養した。どちらの選択培地にもHCF( エア・ブラウン)を5%添加した。G418、HAT選択のプレート共に、培養6日目に はほぼ全wellにコロニーが生じ、合計約770個のハイブリドーマ陽性ウエルを得 た。培養上清を採取し、(実施例14)に従いELISA法によってヒト抗体産生ハイ ブリドーマのスクリーニングを行った。抗ヒト免疫グロブリンλ鎖抗体(Vector 、AI-3070)をコーティングし、ビオチン標識抗ヒト免疫グロブリンα鎖抗体(V ector、BA-3070) さらにアビジンーペルオキシダーゼ複合体(Vector、ABCキッ トPK4000) を用いてTMBZ (住友ベークライト、ML-1120T) により検出した。陰性 対照の約2倍以上の吸光度を目安にして判定し、17個の陽性ウエルを得た。陽性 ウエルの細胞を24穴プレートに移し、IMDMに10%FBSを添加した培地を用いて培養

した。培養上清を(実施例65-(4))の方法に従いELISAで解析し、16個のウエルで0.09~11mg/mlの、ヒトIgμとIgλを持つ完全ヒト抗体の存在が確認された。(実施例33)に従い、抗HSAヒトλ鎖の抗体価を測定し、1個の陽性ウエルを得た。完全ヒト抗体陽性かつ抗HSAヒトλ鎖陽性ウエルの細胞を〈安東、単クローン抗体実験操作入門、講談社サイエンティフィク,1991〉に記された方法に従い、限界希釈法を用いてクローニングした。抗HSAヒトλ鎖陽性ハイブリドーマを2クローン得た。

### [0246]

この結果よりヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に移入して作製したキメラマウスから完全ヒト抗体を生産するハイブリドーマが得られることが確認された。またHSA抗原刺激に対して、抗原特異的ヒトIgμおよびIgλの抗体価上昇が起こることが確認された。さらにこのキメラマウスからヒトIgμとIgλから成るHSA特異的抗体を生産するハイブリドーマが得られることが確認された

#### [0247]

また染色体が薬剤耐性マーカーを持つため、HATを添加せず、G418を用いてハイブリドーマを選択することが可能であった。このことによってヒト染色体を持つ細胞のみが増殖するため、ハイブリドーマを選択的に得ることができる。また融合後の細胞からヒト染色体の脱落を防ぐことが期待できる。さらに融合に用いるミエローマ細胞がHGPRT酵素(hypoxanthine-guanine-phosphoribosyltrasferase)を持っているような、HAT選択に不向きな細胞であっても使用可能となることが期待される。

#### [0248]

(実施例67) 重鎖遺伝子欠損宿主胚とのキメラマウス作成

(実施例49)で作成した内在性抗体重鎖片側アレル欠損TT2F細胞株由来キメラマウスの子孫のうち野性色を示すものについてサザン解析 (実施例49) 等により欠損アレルを保持する個体を選抜する (期待される確率は1/2である)。これらの抗体重鎖欠損ヘテロ接合体の雌雄個体の交配により生まれる子マウスについて

197-10 2361

サザン解析(実施例49参照)、血清中の抗体重鎖産生(Kitamuraら,Nature, 35 0, 423-,1991)等の解析を行い、両側アレルが欠損し、自身の機能的な抗体をほとんど産生できない抗体重鎖欠損ホモ接合体を得ることができる(期待される確率は1/4である、膜型 $\mu$ 鎖欠損マウスにおける結果はKitamuraら,Nature, 350, 423-,1991参照)。

[0249]

# (1) 抗体重鎖ノックアウトマウス系統の確立

(実施例49)で作成した内在性抗体重鎖片側アレル欠損TT2F細胞株由来キメラマウスの子孫のうち野性色を示すものについてサザン解析を行ない欠損アレルを保持する個体を選抜した。これらの抗体重鎖欠損へテロ接合体の雌雄個体の交配により生まれる子マウスについてサザン解析(実施例49参照)、血清中の抗体μ鎖産生(マウスμ鎖のELISA解析は実施例75参照、Kitamuraら、Nature、350、423-,1991)等の解析を行った結果、両側アレルが欠損し、自身の抗体をほとんど産生できない抗体重鎖欠損ホモ接合体を得ることができた(膜型μ鎖欠損マウスにおける結果はKitamuraら、Nature、350、423-,1991参照)。

すなわち、抗体重鎖片側アレル欠損TT2F細胞株より、抗体重鎖ノックアウトマウス系統を確立することができた。

### [0250]

清浄な環境で飼育したホモ接合体雌雄個体の交配により得られる胚をキメラマウス作成の際の宿主として利用できる。この場合キメラマウスにおいて機能的なB細胞はほとんど注入したES細胞に由来する。RAG-2欠損マウス (Shinkaiら, Cell, 68, 855-, 1992) 等、機能的なB細胞を自ら作ることができない他のマウス系統もこの目的に同様に利用できる。このシステムにおいて (実施例62、63、64)で得られる内在性抗体重鎖及び軽鎖欠損かつヒト14番+2番あるいは14番+22番あるいは14番+2番半22番染色体 (断片)を保持するマウスES細胞株を使用し (実施例10)等に示した方法でキメラマウスを作成する。得られるキメラマウスではES細胞由来のB細胞において機能的なヒト抗体重鎖 (14番染色体上)、軽鎖κ (2番染色体上)、軽鎖λ (22番染色体上)遺伝子より主にヒト抗体を生産する

[0251]

(2) ヒト2番染色体部分断片及びヒト14番染色体部分断片を同時に保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に注入して作製したキメラマウス血清における完全ヒト抗体の検出・定量

(実施例62)で取得されたES細胞株KH10を実施例67-(1)で確立された抗体重鎖ノックアウトマウスの雌雄交配により得られる胚に注入することにより実施例65-(1)と同様な方法でキメラマウスを作製した。7週令のキメラマウスから採血し、血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)(実施例65-(3))に従いELISA法で検出した。結果を表23に示す。ヒトκ鎖とμ鎖またはγ鎖を含む完全抗体がキメラマウス血清中に確認された。また免疫不全宿主胚にES細胞を移入することにより、B細胞はES細胞からのみ分化するため、たとえキメラ率が低くとも完全抗体が得られることが確認された。

[0252]

### 【表23】

表23 キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA)  
ESクローン キメラマウス キメラ率% 
$$IgM, \kappa (mg/l)$$
  $IgG, \kappa (mg/l)$   
KH10 CKH10-1 6 6.1 0.17  
KH10 CKH10-2 3 1.9 0.4

[0253]

(3) ヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、κ鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に注入して作製したキメラマウス血清における完全ヒト抗体の検出・定量

(実施例63)で取得されたES細胞株LH13を実施例67-(1)で確立された抗体重鎖ノックアウトマウスの雌雄交配により得られる胚に注入することによりキメラマウスを作製した(実施例65-(2)と同様な方法による)。誕生したキメラマウスから生後5週齢に採血し、血清中のヒト抗体濃度を(実施例14)(実施例65-(4))に従いELISA法で検出した。結果を表24に示す。ヒトα鎖とμ鎖またはγ鎖を含む完全抗体がキメラマウス血清中に確認された。

[0254]

### 【表24】

表24 キメラマウス中のヒト抗体濃度(ELISA) 区クローン キメラマウス キメラ率% IgM,  $\lambda$  (mg/l) LH13 CLH13-3 35 51 LH13 CLH13-4 85 32 LH13 CLH13-4 30 27

[0255]

(実施例68) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)導入ES細胞由来キメラマウス子孫におけるヒト染色体の保持

(1) 抗体重鎖遺伝子を含むヒト14番染色体断片を保持するヒトーマウス雑種細胞の単離

ヒト2番染色体断片はマウスへの導入後、子孫への伝達が観察された(実施例42)ことから、ヒト14番染色体についても断片を用いることにより子孫への伝達の可能性が高まることが予想される。G418耐性遺伝子でマーキングされたインタクトなヒト14番染色体を保持するA9/#14株(実施例9;Tomizukaら,Nature Genet.vol 16,133-143(1997)に記載されているA9/14-C11株)についてより詳細なFISH解析(実施例9)を行った結果、10%程度の細胞集団が非常に小さく断片化したヒト14番染色体のみを含むことが観察された。この染色体断片は2番染色体断片(実施例12)と同程度のサイズであり、またG418耐性マーカーを含むと考えられる。

### [0256]

断片化ヒト14番染色体を含む細胞クローンの単離のため、A9/#14細胞約300個を10cmシャーレに播種して培養し、10日後に出現したコロニーを31個ピックアップした。これらのクローンよりゲノミックDNAを調製し、(実施例9)と同様な方法で14番染色体特異的プライマー(実施例9に示された18種のうちPCI、NPを除く16種)を用いたPCR解析を行った。その結果、1株(A9/SC20)において16種中IgM、IGG1、IGA2、IGVH3のみが検出された。また、ヒト14番染色体長腕部テロメア近傍のマーカーであるD14S543(Science, HUMAN GENETIC MAP(1994),塩基配列はGenbank等のデータベースより入手)も検出されたことから、この断片(以後SC20断片)は抗体重鎖遺伝子を含む14番染色体テロメア近傍部を含むと考えられ

た。

#### [0257]

SC20断片についてヒト染色体特異的プローブを用いたFISH解析 (Tomizukaら、Nature Genet. vol 16, 133-143(1997)) を行った。その結果このクローンにおいて、コントロール (インタクトな14番染色体を含む) と比較してプローブにハイブリダイズする染色体のサイズが小さくなっていることが観察された。すなわち、A9/SC20は断片化されたヒト14番染色体を含むことが確認された。

### [0258]

さらにSC20断片がヒト14番染色体由来のセントロメア配列を含むかについて調べるため、A9/SC20細胞の染色体標本と、ジゴキシゲニン-11-dUTPで標識したヒト14番、22番セントロメア特異的なαサテライトDNA(コスモバイオより購入)をプローブとしハイブリダイズさせ、参考文献(Tomizukaら, Nature Genetics, 16, 133-143)に記載された方法に従ってFISH解析を行った。その結果、上記プローブとハイブリダイズするシグナルが確認され、SC20断片がヒト由来のセントロメア配列を有することが明らかとなった(図36)。

### [0259]

(2) 14番染色体(断片)のTT2F細胞への導入及びTT2F細胞における安定保持 14 番染色体断片のTT2F細胞へのミクロセル移入は染色体供与細胞としてA9/SC2 0を用い、実施例9に示した方法で行った。G418 (300 μ g/ml)選択の結果5株の耐性株を得た。これらのES細胞株についてと同様にPCR解析(実施例68-(1))およびFISH解析(ヒト染色体特異的プローブ使用,Tomizukaら,前記)によりヒト14番染色体断片の保持を確認した。FISH解析の結果を図37に示す。

マウス個体における導入ヒト染色体の安定保持は導入遺伝子の効率的発現および導入染色体の効率的な子孫への伝達に重要である。ES細胞株の宿主胚注入後は薬剤添加による選択ができないため、導入ヒト染色体が非選択条件でも安定に保持されることが望ましい。

#### <del>-[-0-2-6-0-]--</del>

SC20 断片を含むTT2F(SC20)-21株についてG418非添加培地で長期間培養を行い、この条件におけるSC20断片の保持について検討した。

TT2F(SC20)-21株を選択培地(G418 300 μg/ml)で1週間培養した後、非選択培地で45日間継代培養した(1日おきに8倍希釈で植え継ぎ)。継代0、15、30、45日目に、300-1000個の細胞を35mmシャーレ6枚に播き、そのうち3枚を選択培地、3枚を非選択培地で約1週間培養してコロニーを数えた。選択条件の3枚分のシャーレのコロニー数の合計(A)、非選択条件の3枚分のシャーレのコロニー数の合計(A)、非選択条件の3枚分のシャーレのコロニー数の合計(B)より染色体保持率(A/B)を求めた。比較のため、ヒト2番染色体由来W23断片を含むP-21(実施例40)についても同様(選択培地は0.75μg/ml puromycin入り)な実験を行い、その結果を図38に示した。図38に示した値は3回の独立した実験の平均値である。その結果SC20は45日間の非選択条件での培養後も95%以上という高い保持率を示した。一方、W23断片は同様の条件下で14%の保持率であった。

### [0261]

これまでに、ヒトY染色体由来の人工染色体(ヒトY由来セントロメアを含む)をCHO (ハムスター線維芽細胞)やDT40 (ニワトリBリンパ球細胞)、マウスES細胞に移入した報告がある (Shenら, Hum. Mol. Genet. 6, 1375-1382)。非選択培養下において、その人工染色体はCHOとDT40では安定に保持されていたが、マウスES細胞中では再編成によりマウスのセントロメアを偶然に獲得した染色体のみが、安定に保持されていた。このことから、ヒト由来セントロメアはマウスES細胞中で不安定であるという意見が提出された (Shenら,前記)。

### [0262]

上記の結果はSC20の場合ヒト由来のセントロメアでありながら(実施例68-(1))、マウスES細胞で非常に安定であることを示している。同様にヒトセントロメアを含むことが示唆されるW23断片(Tomizukaら,前記)の場合不安定性が見られたことからES細胞におけるヒト由来染色体の安定性は染色体の種類により異なると考えられる。

以上の結果より、SC20断片はマウス個体への遺伝子導入用のベクターとして非常に有用であることが示された。

### [0263]

(3) ヒト14番染色体(断片)を保持するES細胞株からのキメラマウス作製

実施例68-(2)で取得され、ヒト14番染色体断片の保持が確認されたG418耐性ES細胞株TT2F(SC20)-21を凍結ストックより立ち上げ、ICR(日本クレア社)雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

### [0264]

計188個の注入胚を移植した結果、22匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した22匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は20匹であった。うち2個体は毛色が完全に野生色の(ES細胞に由来する)キメラマウスであった。

### [0265]

この結果より、ヒト2番染色体部分断片を保持するES細胞株TT2F(SC20)-21はキメラ形成能を保持している、すなわちマウス個体の正常組織に分化する能力を保持していることが確認された。

5 週齢のキメラマウス2匹 (TT2F(SC20)-21由来、キメラ率100%、C14m-16, -17) より採血し血清中のヒト抗体IgM、IgG濃度を(実施例14)と同様にELISA法を用いて定量した。結果を表25に示す。

[0266]

### 【表25】

#### [0267]

両方のキメラマウス血清中にヒト抗体 IgM、 IgGが検出された。その値はより大きなヒト14番染色体断片を保持するキメラマウスの値(実施例14)と同等であった。すなわち、SG20断片に含まれるヒト抗体遺伝子は機能的であることが示された。

[0268]

(4) ヒト14番染色体断片を保持するマウスES細胞(TT2F, X0) 由来キメラマウスの子孫におけるヒト染色体保持の検出および血清中ヒト抗体μ鎖、γ鎖の検出、定量

(実施例68-(3))で得られた雌キメラマウスのうちC14m-16, C14m-17 (共に毛色のキメラ率100%)について雄ICRマウスとの交配によりES細胞由来の子孫が誕生するかを検討した。この交配においてICR雄マウス (アルビノ、劣性)由来精子により受精したキメラマウス中のTT2F細胞 (野生色:優性)由来の卵子からは野生色、ICR由来卵子からは白色の子マウスが誕生する。この交配によって得られた生存可能な子マウス計30匹のすべてがES細胞由来の毛色である野生色を示しES細胞の効率的な生殖系列への伝達が示された。これらの子マウスの尻尾より調製したゲノムDNAについてヒト染色体断片の保持をPCR法により検討した。TT2F(SC20)-21で存在が確認されている3種のプライマー (IGVH3, IgM, D14S543)についてPCR増幅を行なった結果、30匹中10匹 (33%)においてTT2F(SC20)-21で検出された3種のマーカーの存在が確認された。すなわち、ヒト14番染色体断片を保持するTT2F細胞株TT2F(SC20)-21がキメラマウス中で機能的な卵子に分化し、その卵子由来のF1子孫にヒト14番染色体断片が伝達されたことが示された。

# [0269]

ヒト14番染色体を保持することが確認された10匹のキメラマウス子孫のうち9 匹について血清中のヒト抗体IgM、IgGの検出、および定量を以下の通り行った。 生後約4~8週齢のマウスより採血し、血清中のヒト抗体μ鎖およびγ鎖を(実施 例14)と同様にELISA法を用いて検出した。その結果(表26)、調べた全ての個 体の血清中においてヒト抗体μ鎖およびγ鎖が検出された。すなわち、キメラマ ウスから生まれたF1子孫においてもヒト抗体重鎖遺伝子が機能することが確認さ れた。



[0270]

### 【表26】

表26 キメラマ 親キメラマウス	ウス中のヒト抗体	<b>対対およびTg</b>	G濃度 (ELISA)
親キメラマウス	マウス個体番号	IgM(mg/1)	IgG(mg/1)
C14m-16	16 <del>-</del> 5	12.9	2.2
C14m-16	16-14	3.5	$\overline{2}$ , $\overline{2}$
C14m-16	16-16	4.1	2.0
C14m-16	16-17	5.5	3.9
C14m-17	17-7	5.7	1.0
C14m-17	17-8	3.6	1.ž
C14m-17	17-19	3.5	<b>0.7</b> 5
C14m-17	17-22	2.4	1.4
C14m-17	17- <u>23</u>	5.3	1.9
			1.0

#### [0271]

さらに、F1子孫のうち雄3個体、雌4個体についてMCH(ICR)マウス(日本クレアより購入)と交配し、誕生したF2子孫について上記に示した尻尾DNAのPCR解析及び、ヒト抗体μ鎖発現解析を行った。その結果、雄経由で30%(142匹中43匹ポジティブ)、雌経由で33%(60匹中20匹ポジティブ)のF2子孫にSC20断片が伝達したことが確認された。

これらの結果より、14番染色体断片(ヒト抗体重鎖遺伝子を含む)を保持し、 ヒト抗体重鎖を発現する継代可能なマウス系統を確立することができた。

#### [0272]

# (5) ヒト14番染色体断片のマウス個体における安定保持

(実施例68-(4)) において取得されたSC20断片を保持するF1子孫3匹 (表26中:16-5、17-8、17-23) をマウス個体におけるSC20断片保持率解析に用いた。マウスにコルセミド (100 µg/ml) を0.3ml腹腔内注射し、頸椎脱臼により安楽死させ、脳、肝臓、脾臓、精巣、骨髄を摘出した。骨髄をのぞくすべての組織をPBS (一) で洗浄した後、組織を解剖用ハサミで細かく切り、KCl (0.075M) により15分間の低調処理、カルノア固定をした。カルノア固定の上清を用いて通常通り標本を作成した。FISH解析はヒト染色体特異的プローブ (Human COT-1 DNA) を用い、参考文献 (Tomizukaら, Nature Genetics, 16, 133-143) に記載された方法に従って行った。脳、脾臓、肝臓、骨髄については任意に選んだ30個以上の間期核についてシグナルの検出されるもの(図39中・)、検出されないもの(図39中・)の数をカウントし保持率を算出した。精巣については、第一減数分裂期像、第二減数分裂期像、精子に分類し、各10個以上についてカウントし保持率を算出

した。その結果、脳、肝臓では3個体とも100%近い保持率を示した。骨髄、脾臓では、保持率の低下が観察された。精巣では、第一減数分裂像で80~100%、精子で30~50%の結果が得られた。SC20断片が安定に保持されていると仮定すると理論的には第一減数分裂で100%、第二減数分裂と精子で50%となる。したがって、精巣でSC20断片は安定に保持されていると考えられた。

また、同時に尻尾より繊維芽細胞を調製し(実施例79)と同様にSC20断片の保持率を検討した。その結果は、16-5:98%、17-8:96%、17-23:98%であった(各々5 0核板についてテスト)。

# [0273]

(6) ヒト14番染色体断片(抗体重鎖遺伝子を含む)の導入による、抗体産生能 欠損マウスの遺伝的救済

B リンパ球の発生に必須な抗体μ鎖遺伝子ノックアウトマウス (実施例67-(1)) は体液性免疫を担う成熟Bリンパ球が欠損していることにより抗体を産生することができない。この欠損を交配によるSC20断片 (ヒト抗体重鎖遺伝子を含む) 導入により救済できるかを検討するため、以下の実験を行った。

# [0274]

(実施例49)で作成した内在性抗体重鎖片側アレル欠損TT2F細胞株由来キメラマウスとMCH(ICR)マウスとの交配により得られた子孫のうち野性色を示すものについてサザン解析を行ない欠損アレルを保持する個体を選抜した。得られた抗体重鎖欠損へテロ接合体の雌個体と(実施例68-(4))で得られたSC20断片を保持するF1子孫雄個体(17-7)を交配した。その結果得られた5匹の子マウスについてSC20断片保持検定のためのPCR解析、血清中ヒト抗体μ鎖、γ鎖測定を行った(実施例68-(4))結果、#2,#3,#5の3個体がSC20断片を保持することが確認された(表27)。また、血清中マウス抗体μ鎖発現解析(実施例75)の結果、#1、#3がマウスμ鎖陰性すなわち内在性抗体重鎖欠損についてホモであることが示された(表27)。これは5個体の尻尾より調製したDNAを用いたサザン解析(実施例49参照)の結果と一致した。マウス、ヒト抗体重鎖共に検出されない個体#1と比較して、抗体重鎖欠損ホモかつ、14番染色体保持の遺伝子型を持つ個体#3においては非常に高濃度のヒト抗体μ鎖(310 mg/l)、γ鎖(860 mg/l)が検出された。また

、(実施例29)の方法に従い、ヒトァサブクラスの定量を行い、4種のサブクラス  $(\gamma 1 \ \chi 2 \ \chi 3 \ \chi 4)$ をすべて検出した。特にヒト $\mu$ 鎖の濃度は野性型マウスにおけるマウス $\mu$ 鎖の濃度 (Mendezら, Nature Genet. 15, 146-156 (1997))に匹敵する。すなわち、この個体においては内在性重鎖遺伝子の欠損による抗体産生不能 (Bリンパ球の欠損:参考文献 Kitamuraら, Nature, 350, 423-,1991)という症状がヒト14染色体断片 SC20 (抗体重鎖遺伝子を含む)の導入により治療され、抗体産生能及びBリンパ球産生能が回復したことを示している。

[0275]

### 【表27】

[0276]

(実施例69) ヒト22番染色体(断片) 導入ES細胞由来キメラマウス子孫におけるヒト染色体の保持

(1) ミクロセル融合を利用したヒト22番染色体の断片化

ヒト2番染色体断片(実施例42)、ヒト14番染色体断片(実施例68-(4))は共にマウスへの導入後、子孫への伝達が観察されたことから、ヒト22番染色体についても断片化することによりマウスにおける子孫への伝達の可能性が高まることが予想される。ミクロセル融合による受容細胞へのヒト染色体移入の際、40~80%の移入クローンは融合時に断片化されたヒト染色体を保持することが観察されている(押村ら、蛋白質 核酸 酵素 vol.35, No.14 1990)が、この現象を利用してヒト22番染色体の断片化を試みた。

[0277]

6-1株(実施例35)を染色体供与細胞、野性型マウスA9細胞を受容細胞とした ミクロセル融合実験(実施例1)を行った結果、73個のG418耐性クローンが得ら れた。得られたクローンよりゲノミックDNAを調製し、Ig スプライマー(実施例2-)を用いたPCRによりスクリーニングした。ヒトIg 2 遺伝子を保持していた67ク ローンについて、22番染色体上の8種のマーカー(D22S315, D22S275, D22S280, D22S278, D22S283, D22S272, D22S282, D22S274; 22番染色体上での順序はNature, vol 377, 367-379, (1995)を参照。プライマーの塩基配列はGenbank等のデータベースより入手)特異的プライマーを用いたPCR解析を行った。その結果25クローンにおいてマーカーの一部が消失していたことから、これらのクローンにおいて22番染色体が断片化していると考えられた(図40)。中でも、クローン#22はIg 2 とD22S315、#28はIg 2以外のマーカーが消失しているため、かなり小さな断片になっていると考えられる(図40)。クローン#28についてヒト染色体特異的プローブを用いたFISH解析(実施例18)を行った結果を図41に示す。このクローンにおいて、コントロール(インタクトな22番染色体を含む)と比較してプローブにハイブリダイズする染色体のサイズが小さくなっていることが観察される。すなわち、ミクロセル融合時に起こる染色体の断片化により、抗体 2 遺伝子を含むヒト22番染色体断片を取得することができた。

[0278]

(2) 22番染色体(断片)のTT2F細胞への導入

22番染色体(断片)のTT2F細胞へのミクロセル移入は実施例2に示した方法で行った。染色体供与細胞としては#22、#28、および6-1を用いた。クローン#22、A9/#22(6-1)についてはピューロマイシン(0.75μg/ml)選択、クローン#28についてはG418(225μg/ml)選択を行いそれぞれ13株(クローン#22より)、5株(6-1より)および3株(クローン#28より)の薬剤耐性株を得た。これらのES細胞株について(実施例69-(1))と同様にPCR解析およびFISH解析によりヒト22番染色体(断片)の保持を確認する。

[0279]

(3) ヒト22番染色体(断片)を保持するES細胞株からのキメラマウス作製 実施例69-(2)で取得され、ヒト22番染色体の保持が確認された薬剤耐性ES細 胞株について(実施例3)の方法によりキメラマウスを作製する。キメラマウス におけるヒト22番染色体(断片)保持確認は(実施例4)の方法により行う。

[0280]

(4) ヒト22番染色体 (断片) の子孫への伝達

ヒト22番染色体(断片)を保持するキメラマウスとICRマウスを混合して交配

(4) 実施例80で得られた抗体 κ鎖ノックアウトマウス系統:実施例80に示した 尻尾DNAのサザン解析により κ鎖欠損ホモあるいはヘテロ個体を検定

[0286]

上記の4系統を互いに交配することにより、これら4つの遺伝子型(2番染色体断片保持、14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモあるいはヘテロ、抗体 κ鎖欠損ホモあるいはヘテロ)を同時に保持する系統の確立を行った。上記4系統を出発材料として数回の交配を経た後、『14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ヘテロ』の遺伝子型を持つ雄個体と『2番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ホモ』あるいは『2番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ホテロ』あるいは『2番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ホテロ』あるいは『2番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ホテロ』あるいは『2番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ホテロ』及び個体IK29『2番染色体断片保持、14番染色体断片保持、14番染色体断片保持、14番染色体断片保持、14番染色体断片保持、14番染色体断片保持、14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体 κ鎖欠損ヘテロ』及び個体IK29『2番染色体断片保持、14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ヘテロあるいは野生型、抗体 κ鎖欠損へテロ』を得た。同じ交配により得られた『2番染色体断片保持、14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ヘテロあるいは野生型、抗体 κ鎖欠損野生型』の遺伝子型の個体(IK28)も含めて図42に血清中各抗体濃度及び遺伝子型を示す。IK23の血清中にはヒト μ鎖とヒト κ鎖からなる完全なヒト抗体が18mg/1の濃度で検出された(実施例38)。

### [0287]

ここで得られた個体同士を交配することにより、『2番染色体断片保持、14番染色体断片保持、抗体重鎖欠損ホモ、抗体  $\kappa$ 鎖欠損ホモ』の遺伝子型を持つ個体を作製することができる。この系統においては、内在性  $\kappa$  鎖遺伝子の欠損がヒト2番染色体断片に含まれるヒト抗体  $\kappa$  鎖遺伝子によって代替される(Lonbergら,Nature, 368, 856-, 1994)ため、HK23よりさらに高い濃度のヒト抗体  $\kappa$  鎖が発現すると考えられる。また、ヒト重鎖と  $\kappa$  鎖からなる完全なヒト抗体の濃度もさらに上昇すると考えられる。

\_\_\_\_[-0\_2-8\_8\_]\_\_\_\_

(実施例74)交配により得られるヒト抗体遺伝子を含むヒト染色体を保持するマウス系統からのヒト抗体産生ハイブリドーマ取得

する。誕生する野生色の子マウスの尻尾より調製したゲノムDNAについてヒト22 番染色体断片の保持をPCR法により検討する(実施例30、42、43参照)。ヒト22 番染色体あるいはその部分断片を保持するマウスES細胞株は(実施例42)及び( 実施例43)で示した通りにキメラマウス中で機能的な卵子あるいは精子に分化し 、それ由来の子孫にヒト22番染色体(断片)が伝達可能である。すなわちヒト抗 体軽鎖 2 遺伝子を含む22番染色体(断片)を保持する継代可能なマウス系統を確 立することができる。

### [0281]

(実施例70) ヒト2番染色体断片及び14番染色体(断片)を同時に保持するマウス個体の交配による作成

(実施例42) あるいは(実施例43)で得られたヒト2番染色体断片を保持するマウス系統と(実施例68)で得られたヒト14番染色体(断片)を保持するマウス系統を交配することにより生まれる子マウスの尻尾より調製したゲノムDNAをPCR法等(実施例9、42、43)により解析して、ヒト2番染色体部分断片及びヒト14番染色体(断片)を同時に保持する個体を得る。

### [0282]

(実施例71) ヒト22番染色体(断片)及び14番染色体(断片)を同時に保持するマウス個体の交配による作成

(実施例69)で得られるヒト22番染色体(断片)を保持するマウス系統と(実施例68)で得られるヒト14番染色体(断片)を保持するマウス系統を交配することにより生まれる子マウスの尻尾より調製したゲノムDNAをPCR法等(実施例30、42、43)により解析して、ヒト22番染色体(断片)及びヒト14番染色体(断片)を同時に保持する個体を得る。

## [0283]

(実施例72) ヒト2番染色体断片、14番染色体(断片)及び22番染色体(断片) を同時に保持するマウス個体の交配による作成

(実施例71)で得られるヒト22番染色体(断片)及びヒト14番染色体(断片)を保持するマウス系統を(実施例42、43)で得られたヒト2番染色体断片を保持するマウス系統と交配することにより生まれる子マウスの尻尾より調製したゲノ

ムDNAをPCR法等(実施例9、30、42、43)により解析して、ヒト22番染色体(断片)及びヒト14番染色体(断片)及びヒト2番染色体部分断片の3種のヒト染色体を同時に保持する個体を得る。あるいは(実施例70)で得られるヒト2番染色体(断片)及びヒト14番染色体(断片)を保持するマウス系統と(実施例69)で得られるヒト22番染色体断片を保持するマウス系統と交配することによっても同様に3種のヒト染色体を同時に保持するマウス個体を得る。

[0284]

(実施例73) 完全なヒト抗体を主として産生するマウス系統の交配による作成ヒト2番+14番(実施例70)、14番+22番(実施例71)、2番+14番+22番(実施例72)染色体を保持するマウス系統を内在性抗体重鎖、軽鎖 κ遺伝子を欠損しているマウス系統と繰り返し交配し、ヒト2番+14番、14番+22番、または2番+14番+22番染色体を保持し、かつ内在性抗体重鎖遺伝子及び軽鎖 κ遺伝子欠損についてホモであるマウス系統をPCR解析等(実施例9、30、42、43)により選抜する。これらの系統においては、主として完全なヒト抗体が産生される(Greenら, Nature Genetics, 7, 13-, 1994, Lonbergら, Nature, 368, 856-, 1994)。

以下、ヒト2番染色体断片及びヒト14番染色体断片を保持し、かつ内在性抗体 重鎖遺伝子及び抗体 κ 鎖遺伝子欠損についてホモであるマウス系統の確立につい て示す。交配に用いた4つの系統及びそれぞれの系統の持つ遺伝子型の検定法は 以下の通りである。

#### [0285]

- (1) 実施例42で得られたヒト2番染色体断片を保持するマウス系統:実施例42に示した尻尾DNAのPCR解析および血清中ヒト抗体 κ鎖発現を指標としてヒト2番染色体断片保持を検定
- (2) 実施例68-(4)で得られたヒト14番染色体断片を保持するマウス系統:実施 例68-(4)に示した尻尾DNAのPCR解析および血清中ヒト抗体μ鎖発現を指標として ヒト14番染色体断片保持を検定
- (3) 実施例67-(1)で得られた抗体重鎖ノックアウトマウス系統:実施例67-(1) に示した尻尾DNAのサザン解析及び、血清中マウス抗体μ鎖発現の有無(実施例7 5) により重鎖欠損ホモあるいはヘテロ個体を検定

(実施例25)と同様に(実施例42、43、68、69、70、71、72、73)で得られるヒト抗体遺伝子を含むヒト染色体を保持するマウス個体に目的とする抗原で免疫し、脾臓を取り出し、ミエローマ細胞と細胞融合し、ハイブリドーマを作成する。1~3週間培養し培養上清をELISA法で解析する。ELISA法は(実施例14、15、21、22、25、33、34、37、38)に示した方法で行ない、ヒト抗体陽性及びヒト抗体陽性かつ免疫した抗原特異的クローンを得る。

[0289]

(実施例75)マウス抗体重鎖両側アレル破壊TT2F細胞株由来キメラマウスの血清中のマウスIgMの検出および定量

(実施例51)で取得されたマウス抗体重鎖両側アレル破壊TT2F細胞株(#131-3)より(実施例40)に示した方法で誕生した子マウスのうちキメラ率がそれぞれ0%、50%、99%の3個体について血清中のマウスIgMの検出および定量を行った。生後約2週齢のキメラマウスより採血し血清中のマウスIgM濃度を(実施例14)のELISA法を用いて定量した。PBSで希釈した抗マウスIgM抗体(Kirkegaard & Perry Laboratories Inc., 01-18-03)を固定し、次いで5%FBSを添加したPBSで希釈した血清試料を加えた。ペルオキシダーゼ標識抗マウスIgM抗体(Kirkegaard & Perry Laboratories Inc., 074-1803)を加え、TMBZを基質とし、450 nmの吸光度を測定した。精製されたマウスIgM(ファーミンジェン、03081D)を標準とし段階的にFBS添加のPBSで希釈した。結果を表28に示す。マウス抗体重鎖の両側アレルが破壊されたTT2F細胞由来のキメラマウスのうち、キメラ率が99%のものはマウスIgM濃度が低く、ES細胞のマウス重鎖遺伝子がほとんど機能しないことが確認された。

[0290]

【表28】

表28. キメラマウス中のマウスIgM濃度 (ELISA)

キメラ率%	I g M (mg/l)	
0 50 99	12 11 1.5	

#### [0291]

(実施例76) ES細胞の抗体遺伝子軽鎖 κ ノックアウト用ターゲティングベクター の作製

実施例48-1と同様にしてピューロマイシン耐性遺伝子の両側にLoxP配列を入れたLoxP-PGKPuroプラスミドを作製した。pPGKPuroプラスミドDNA (Watanabe ら, Biochem Biophys Res Commun 213: 130-137 (1995), Peter W. Laird, Whitehead Institute for Biochemical Research and Massachusetts institute of tech nology, Dept. of Biology, Cambrige, MAより分与) より制限酵素Sallでピューロマイシン耐性カセットPGKPuroを切り出し、平滑化した。LoxP配列を含むプラスミドのSmalおよびEcoRV 切断部位へPGKPuroを挿入し、プラスミドpLoxP-PGKPuro を得た(図30)。さらに、実施例48と同様にしてマウス抗体軽鎖 κ J 領域および定常領域を含むゲノムDNAの定常領域が含まれるDNA断片をLoxP-PGKPuro遺伝子と置き換えた(図31)。

### [0292]

(実施例77) 抗体軽鎖ヘテロ接合体(かつ抗体重鎖欠損ホモ接合体)マウスES細胞からの抗体軽鎖遺伝子両アレル破壊株の取得

(1) 実施例58で取得した抗体軽鎖欠損ヘテロ接合体TT2F細胞株 (HD43) についてピューロマイシン耐性遺伝子の挿入によって、さらに両側アレルが共に破壊された株を取得した。

実施例76で作製した抗体軽鎖ターゲティングベクターを制限酵素KpnIで線状化し、実施例58と同様にHD43株を形質転換した。ピューロマイシン濃度0.75 μg/mlで選択培養を行い、7~9日後に生じたコロニーをピックアップし、実施例49に示した方法で凍結保存、ゲノムDNAを取得した。ピューロマイシン耐性株ゲノムDNAを制限酵素EcoRI(宝酒造)で消化し、アガロースゲル電気泳動で分離後サザン解析を行い、実施例48-4に示したプローブで相同組み換え体を検出した(実施例58,59)。その結果、解析した74株中4株の抗体軽鎖両アレル破壊株を得た。これらのクローンは通常の培養条件において、遺伝子破壊以前のTT2F株と比較して、増殖速度及び形態に変化が見られず、キメラマウス形成能を保持していることが示唆される。

19 1 1 0 2 0 0 1

# [0293]

(2) 抗体重鎖欠損ホモ接合体かつ抗体軽鎖遺伝子両アレル破壊株からのキメラマウス作製

(実施例77-(1))で得られた抗体軽鎖両アレル破壊株TT2F細胞株HD43P-10を凍結ストックより立ち上げ、ICR(日本クレア社)雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地(実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス(日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

### [0294]

計161個の注入胚を移植した結果、37匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した37匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は9匹であった。うち4個体は毛色の80%以上が野生色の(ES細胞に由来する)キメラマウスであった

この結果より、抗体軽鎖両アレル破壊株ES細胞株HD43P-10は高いキメラ形成能を保持していることが確認された。

# [0295]

(実施例78) 抗体軽鎖欠損ホモ接合体(かつ抗体重鎖欠損ホモ接合体) TT2F細胞株からのG418耐性及びピューロマイシン耐性マーカー遺伝子の除去

(実施例77)で取得され、高いキメラ形成能を保持していることが確認された 抗体軽鎖両側アレル破壊株HD43P-10 (ピューロマイシン、G418耐性株)のピューロマイシン及びG418耐性マーカー遺伝子を(実施例52)で示した手順により除去した。G418耐性マーカー遺伝子の両側に挿入したloxP配列(実施例48-1)の間で部位特異的組換えを起こすCreレコンビナーゼ遺伝子を含む発現ベクターpBS185(BRL)を(実施例52)の方法に従い上記の株へ導入した。(実施例52)と同様に得られるピューロマイシン(0.75μg/ml)感受性株(6株)を35mmシャーレでコンフルーエントになるまで増殖させ、その3/5を0.5mlの保存用培地(ES培地+10% DMSO〈シグマ〉)に懸濁し、-80℃にて凍結保存した。残りの2/5は2分して12穴ゼ

ラチンコートプレート2ウエルに播種し、一方は非選択培地、一方は300μg/mlのG418存在下で2日間培養した。その結果、G418存在下で死滅する5株のピューロマイシン、G418感受性株を得た。

### [0296]

(実施例79)ヒト2番染色体断片を保持するマウス系統とC57BL/6系統との交配による血清中ヒト抗体κ鎖発現の上昇

(実施例43、44)に示したヒト2番染色体断片(以後W23断片)を保持するキメラマウス子孫(以後F1(chimera x MCH))の遺伝的背景は、TT2F細胞(実施例39)由来のCBAマウス系統及びC57BL/6マウス系統、そしてキメラマウスとの交配に用いたMCH(ICR)マウス系統の混合したものである。できるだけ均質な遺伝的背景のもとでW23断片の挙動を観察するため、まずMCH(ICR)との戻し交配を行った。F1(chimera x MCH)(任意に選んだ雄8匹、雌6匹を使用)×MCH(ICR)の交配の結果得られた子マウスにつき(実施例43)の方法に従って、W23断片保持を検討した。その結果雄経由で8%(324匹中25匹がポジティブ)、雌経由で22%(148匹中32匹がポジティブ)の子孫にW23断片が伝達することが確認された。ここで得られたF2(F1 x MCH)(任意に選んだ雄8匹、雌8匹を使用)をさらにMCH(ICR)と交配した際の伝達率は雄経由9%(346匹中30匹がポジティブ)、雌経由24%(202匹中48匹がポジティブ)とF1(chimera x MCH)×MCH(ICR)の結果と同様であった。この交配によりF3(F2 x MCH)が得られた。

### [0297]

4週令~12週令のキメラマウス(図43中: chimera、4個体)、F1(chimera x MCH)(19個体)、F2(F1 x MCH)(39個体)、F3(F2 x MCH)(33個体)について(実施例44)と同様の方法により血清中ヒト抗体  $\kappa$  鎖濃度を測定した結果を図43に示す。W23断片を保持する全ての個体の血清中にヒト抗体  $\kappa$  鎖が検出された。一方、F2(F1 x MCH)及びF3(F2 x MCH)においては  $\kappa$  鎖濃度のばらつきが大きくなり、その平均値がchimera及びF1(chimera x MCH)と比較して低下した。

[0298]

MCH(ICR)以外の系統との交配の影響を調べるため、MCH(ICR)との交配実験で使用したものと同じF2(F1 x MCH)個体をC57BL/6N(日本クレアより購入)系統と交

配した。その結果得られたW23断片を保持する個体(F3(F2 x C57BL/6))の26個体について前記と同様な  $\kappa$  鎖濃度測定を行ったところ、キメラマウス及びF1(chimera x MCH)と同等な高い  $\kappa$  鎖濃度を示した(図43)。前述した通り、F3(F2 x MCH)とF3(F2 x C57BL/6)はまったく同じF2(F1 x MCH)個体群を親とすることから、両者の違いは遺伝的背景のみと考えられる。すなわち、遺伝的背景の違いがヒト抗体  $\kappa$  鎖の発現量に影響を与えることが示された。そしてヒト抗体  $\kappa$  鎖の効率的な発現にはMCH(ICR)よりもC57BL/6の遺伝的背景がより望ましいことが明かとなった。同様な実験から、C3H HeN系統(日本クレアより購入)の遺伝的背景もC57BL/6と同等かそれ以上にヒト抗体  $\kappa$  鎖の効率的な発現に望ましいことも示された。

# [0299]

ここで観察された遺伝的背景の抗体 κ 鎖濃度への影響が、個体レベルでの染色体保持率 (安定性) と関係しているかについて以下の実験を行い検討した。F1(chimera x MCH) 個体のうち2F-1 (血清中 κ 鎖濃度:84mg/l)、1F-3 (血清中 κ 鎖濃度:13mg/l)の尻尾由来繊維芽細胞及び骨髄細胞から調製した中期染色体サンプルについてFISH解析 (Tomizukaら,Nature Genetics,16,133-143)を行い、観察した中期分裂像のうちヒト染色体特異的プローブとハイブリダイズするW23断片を含むものの割合を検定した。ここで得られる値は繊維芽細胞及び骨髄細胞におけるW23断片の保持率を示していると考えられる。その結果、2F-1においては繊維芽細胞:51%、骨髄細胞:34%、1F-3においては繊維芽細胞:23%、骨髄細胞:18%という保持率であった(それぞれ50個以上の核板を測定)。これらの結果より、血清中 κ 鎖濃度と繊維芽細胞、骨髄細胞におけるW23断片保持率の間には相関があることが示唆された。すなわち、遺伝的背景は、導入したヒト染色体断片そのものの安定性に影響を与えている可能性が高く、C57BL/6及びC3H系統の遺伝的背景はここ示した2番染色体断片だけでなく他の染色体断片(例えば14番染色体断片)上の遺伝子の効率的発現にも望ましいものと考えられる。

# [0300]

この推察を検証するために(実施例68)で得られたヒト14番染色体断片(以後 SC20断片)を保持し、ヒト抗体重鎖を血清中に発現するF1(chimera x MCH)雄個 体#17-7とMCH(ICR)及びC57BL/6との交配を行った。得られた子孫のうちSC20断片を保持するF2(F1 x MCH):2個体、F2(F1 x C57BL/6):2個体について血清中ヒト鎖濃度(実施例68)及び尻尾由来繊維芽細胞より調製した中期染色体サンプルにおけるSC20断片保持率をW23断片の場合と同様に測定した。その結果、F2(F1 x MCH)のμ鎖濃度:11.0mg/l,1.1mg/l、染色体保持率:74%,54%に対してF2(F1 x C57BL/6)の場合ヒトμ鎖濃度:47mg/l,54mg/l、染色体保持率:84%,88%であり、ヒトμ鎖濃度、染色体保持率共にF2(F1 x C57BL/6)個体の方が高い値を示した。すなわち、W23断片を保持するマウスを用いた結果より推察された通り、C57BL/6の遺伝的背景は導入ヒト染色体の安定保持及び当該染色体上の遺伝子の効率的発現に望ましいことが明らかとなった。

### [0301]

(実施例80) 抗体重鎖欠損かつ抗体 κ 鎖相同組換え体ES細胞株からのキメラマウス作成

(実施例58)で得られた抗体重鎖欠損かつ抗体 κ鎖相同組換え体ES細胞株HD43を凍結ストックより立ち上げ、 ICR (日本クレア社) 雄雌マウスの交配により得られた8細胞期胚に胚あたり10~12個注入した。ES細胞用培地 (実施例9)で一晩培養して胚盤胞に発生させた後、偽妊娠処理後2.5日の仮親ICRマウス (日本クレア社)の子宮に片側の子宮あたり約10個のインジェクション胚を移植した。

#### [0302]

計314個の注入胚を移植した結果、51匹の子マウスが誕生した。キメラ個体は、毛色において宿主胚(ICR)由来の白色の中にTT2細胞由来の野生色(濃茶)が認められるかどうかにより判定される。誕生した51匹のうち毛色に明らかに野生色の部分のある、すなわち、ES細胞の貢献の認められる個体は26匹であった。うち2個体は毛色の100%が野生色の(ES細胞に由来する)雌キメラマウスであった

#### [0303]

- この結果より、抗体重鎖欠損かつ抗体軽鎖鎖相同組換え体ES細胞株HD43はキメラ形成能を保持していることが確認された。得られたキメラマウスのうち100%の 貢献率を示す雌においては、ES細胞が機能的な生殖細胞(卵子)に分化している 可能性が高い。

雌キメラマウス (毛色のキメラ率100%) について雄ICRマウスとの交配によりE S細胞由来の子孫が誕生するかを検討した。この交配においてICR雄マウス (アルビノ、劣性) 由来精子により受精したキメラマウス中のTT2F細胞 (野生色:優性) 由来の卵子からは野生色、ICR由来卵子からは白色の子マウスが誕生する。それぞれ1回の交配によって得られた生存可能な子マウスのすべてがES細胞由来の毛色である野生色を示した。これらの子マウスの尻尾より調製したゲノムDNAについて抗体κ鎖破壊アレルの存在をサザン解析により検討した (実施例58)。その結果抗体κ鎖破壊アレルを持つ個体が得られた。

### [0304]

抗体軽鎖欠損へテロ接合体の雌雄個体の交配により生まれた27匹の子マウスについてサザン解析(実施例58)を行った。その結果7匹において抗体軽鎖野性型アレルが消失し、欠損アレルのみ観察されたことから、これらの個体は抗体軽鎖欠損ホモ個体であると考えられた。また、血清中におけるマウス抗体 κ 鎖および λ 鎖の検出、定量を行った結果を図44に示す。

### [0305]

サザン解析の結果抗体  $\kappa$  鎖欠損ホモと判定された個体(図中4,6,14,22,24,25,26)においては  $\kappa$  鎖の濃度が大きく減少し(残存している  $\kappa$  鎖は母親由来と考えられる)、代わりに  $\lambda$  鎖の濃度が大きく上昇している。これらの結果はこれまでに報告された抗体  $\kappa$  鎖ノックアウトマウスの解析結果(Yong-Rui Zouら,EMBO J. 12,811-820 (1993))と一致している。

すなわち、抗体κ鎖相同組換え体ES細胞株HD43より、抗体κ鎖ノックアウトマウス系統を確立することができた。

# [0306]

(実施例81)ヒト22番染色体上にヒトテロメア配列を挿入するためのターゲティングベクターの作製

ヒト抗体軽鎖 λ 遺伝子(以下 Ig λ 遺伝子と記す)が存在する22番染色体上に相同組み換えによりヒトテロメア配列を挿入し、断片化(J. E. Itzhakiら、Natur e Genet., 2, 283-287, 1992)することを試みた。具体的には、Ig λ 遺伝子の極

近傍(テロメア側)に存在するLIF遺伝子座にヒトテロメア配列を挿入するためのターゲティングベクターを作製した。

ヒトテロメア配列は、J. J. Harringtonら (Nature Genet., 15, 345-355, 1997) にならって、PCRにより合成した。PCR産物をアガロースゲル電気泳動により精製し、DNA blunting Kit (宝酒造) を用いて平滑化した。この平滑化PCR産物をpBluescript SK II(+)(東洋紡)のEco RV部位にライゲーション (DNA Ligation Kit, 宝酒造)により挿入した (pBS-TEL)。このプラスミドpBS-TELのシークエンスを行った結果、Hin dIII - (TTAGGG)n - Eco RI の方向で挿入されていた。

### [0307]

次に、相同組み換えに用いるヒト22番染色体上のLIF遺伝子領域を以下のようにして、PCRで増幅し、プラスミドpBS-TELにクローニングした。PCRに用いたプライマーのシークエンスは以下のようである。

センスプライマー;5'-TCGAACTAGTAGGAGAGTGAACTTGAGGAGGC-3'(配列番号65) アンチセンスプライマー;5'-TCGAACTAGTGATTCAGTGATGCTGTGCAGG-3'(配列番号66) PCR反応被の組成は、10 X LA PCR buffer II (Mg<sup>2+</sup> free)(宝酒造)5 μl、25mM MgCl<sub>2</sub> 5 μl, dNTPmixture(2.5mM each) (宝酒造)8 μl,センスプライマー10pmol,アンチセンスプライマー10pmol,テンプレートDNA (HFL1,ヒト初代繊維芽細胞ゲノム)100ng, LA Taq (5u/μl)(宝酒造)0.5 μl で、滅菌蒸留水を足して全量50μlにした。反応液の調製は全て氷上で行い、予め85℃にセットしてあるサーマルサイクラー (PCR system 9600,パーキンエルマー)のウェルに反応チューブをセットした。94℃で1分加熱後、98℃,10秒、65℃,5分のサイクルを35回行った。PCR産物をアガロースゲル電気泳動により精製し、Spe Iで切断し(プライマー中にSpe I 部位が存在)、pBS-TELのSpe I 部位に挿入した。LIF遺伝子の方向がヒトテロメア配列(TTAGGG)nに対して逆方向に挿入されているものを選択した(M. Giovannini ら、Cytogenet Cell Genet 64,240-244,19

[0308]

次に、ピューロマイシン耐性遺伝子を含むプラスミドpGKPuro (S. Watanabeら

、Biochem. Biophys. Res. Comm., 213, 130-137, 1995) をEco RIで切断後、平滑化し、Not I リンカーを挿入した。Not I 切断によりピューロマイシン耐性遺伝子を切り出し、 pBS-TEL/LIFのNot I 部位に挿入した。ピューロマイシン耐性遺伝子の転写方向がLIF遺伝子の方向と同じものを選択した (pBS-TEL/LIFPuro、図45)。このプラスミドは大腸菌DH5を用いて増幅し、QIAGENカラム (フナコシ)により精製し、トランスフェクションに用いた (後記)。

[0309]

(実施例82) ヒト22番染色体のトリDT40細胞への導入

G418耐性遺伝子でマーキングされたヒト22番染色体を有するマウスA9細胞(富塚ら、Nature Genet. 16, 133-143, 1997、以下A9/#22neoと記す)の培養は、10%ウシ胎児血清(以下FBSで記す)とG418(800  $\mu$ g/ml)を添加したダルベッコ改変イーグル培地(以下DMEMと記す)中で行った。トリDT40細胞の培養は、10% FBS、1%ニワトリ血清、 $10^{-4}$ M 2-メルカプトエタノールを添加したDMEM中で行った

## [0310]

ミクロセルは以下のようにして得た(詳細は、清水ら、細胞工学ハンドブック、羊土社、p127-)。A9/#22neo細胞を12本の25cm<sup>2</sup>遠心用フラスコ(コースター、3025)にて、細胞密度が90%飽和程度まで培養した。コルセミド (0.07 μg/ml、デメコルシン、和光純薬)を添加した培地(DMEM + 20%FBS ) に交換し、さらに2.5-3日間培養し、ミクロセルを形成させた。培養液を除去し、予め37℃で保温したサイトカラシンB (10 μg/ml,シグマ) 溶液を遠心用フラスコに満たし、34℃、8000rpm、1時間の遠心を行った。ミクロセルをDMEMに懸濁し、フィルターろ過により精製した。精製後、1500rpmで10分間遠心し、 DMEM5mlに懸濁した。2 x 10<sup>7</sup>個のDT40を1000rpm、5分間遠心し、 DMEMで2回洗浄し、 DMEM5mlに懸濁した。再度、ミクロセルを1500rpmで10分間遠心し、上清を除かずに、先のDT40懸濁液5mlを静かに重層した。1300rpm、5分間の遠心後、上清を除去し、P HA-P (100 μg/ml、ダフコ)2mlに懸濁し、37℃、5%CO2インキュベター中に15分間静置した。1700rpm、7分間遠心し、上清を除去し、細胞塊をタッピングでほぐした。PEG1500(ポリエチレングリコール、ベーリンガー)1mlを静かに加え、

撹拌しながら1.5-2分間処理した。処理後、 DMEM1mlを約1分間かけて加え、さらにDMEM3mlを約2分間かけて加え、さらにDMEMを足して全量11mlにし、撹拌した。室温で10分間静置した後、1300rpm,5分間遠心し、上清を除去して上記培溶液10mlに懸濁し、直径100mmディッシュ中で24時間培養した。24時間後、G418(1mg/ml)を添加した培地に交換し、24穴プレート(住友ベークライト)3枚に分注し、約2週間選択培養を行い、G418耐性クローンを単離した。

[0311]

### (1) PCR解析

選択培養の結果、約30個のG418耐性クローンが得られた。これらのクローンからPuregene DNA Isolation Kit (Gentra System社)を用いてゲノムDNAを抽出し、これを鋳型にしてヒトIg  $\lambda$  遺伝子特異的プライマーを用いたPCRを行うことによって、  $Ig \lambda$  遺伝子を含んだヒト22番染色体を有するクローンを同定した。用いたヒト $Ig \lambda$  遺伝子特異的プライマーは以下のようである。

[0312]

- 5'-GAGAGTTGCAGAAGGGGTGACT-3'(配列番号67)
- 5'-GGAGACCACCAAACCCTCCAAA-3'(配列番号68)

PCR反応液の組成は、10 X Ex Taq buffer (宝酒造) 5 μl, dNTPmixture(2.5m M each) (宝酒造) 8 μl,各プライマー10pmol,ゲノムDNA100ng, Ex Taq (5u/μl) (宝酒造) 0.5 μl で、滅菌蒸留水を足して全量50 μlにした。反応液の調製は全て氷上で行い、予め85℃にセットしてあるサーマルサイクラー (PCR sy stem 9600,パーキンエルマー) のウェルに反応チューブをセットした。94℃で1分加熱後、98℃,10秒、56℃,30秒、72℃,30秒のサイクルを35回行った。この結果、ヒトIg λ遺伝子を有するクローンが2個同定された。この2クローンに対して、ヒト22番染色体上の多型マーカー (D22S315,D22S280,D22S283,D22S274、Polymorphic STS Primer Pair,BIOS社、J.E.Collinsら、Nature 377 suppl:367,1995) の存在をPCRによって検出した(図46)。PCRの条件はヒトIg λ遺伝子の検出の条件と同じである。〇はマーカーが検出されたことを、×は検出されなかったことを示す。左側は物理的地図に基づく各マーカーの22番染色体上での位置を示す。この結果から、この2クローンはヒト22番染色体のほぼ全長を持つも

[0315]

# (1) PCR解析

選択培養の結果、約80個の耐性クローンが得られた。これらの細胞から前記と同様にゲノムDNAを抽出し、PCRを行い、ヒトテロメア配列がLIF遺伝子座に挿入された相同組み換え体を同定した。プライマーの一方をベクターには含まれないLIF遺伝子領域中に設計し、もう一方のプライマーはベクターに含まれるピューロマイシン耐性遺伝子中に設計した(図47)。プライマーの配列は以下のようである。

[0316]

Puro.1; 5'-GAGCTGCAAGAACTCTTCCTCACG-3'(配列番号69)

LIF1; 5'-ATGACTCTAAGGCAGGAACATCTGTACC-3' (配列番号70)

PCR 反応液の組成は、 $10~X~LA~PCR~buffer~II~(Mg^{2+}~free)$ (宝酒造) $5~\mu$ 1,  $2~5mM~MgCl_2~5~\mu$ 1 ,dNTPmixture(2.5mM~each) (宝酒造) $8~\mu$ 1,各プライマー10~pmol1,テンプレートDNA~100ng, $LA~Taq~(5u/\mu$ 1)(宝酒造) $0.5~\mu$ 1 で、滅菌蒸留水を足して全量 $50~\mu$ 1にした。反応液の調製は全て氷上で行い、予め85℃にセットしてあるサーマルサイクラー(PCR~system~9600,パーキンエルマー)のウェルに反応チューブをセットした。94℃で1分加熱後、98℃,10秒、65℃,10分のサイクルを35回行った。目的の相同組み換え体においてのみ、図47に示した様な6.3kbのPCR座物が検出されるはずである。PCRの結果、8クローンにおいてこの6.3kbの100、が検出された(相同組み換え率;約101%)。この100 ののののがと結果、予想通りの切断パターンが得られ、相同組み換え体であることが確認された。

# [0317]

次に、これら8クローンにおいて、期待通りの断片化が起きているか否かを22番染色体上の遺伝子(Ig λ, LIF, MB, IL2RB, CYP2D6, DIA1, ECGF1, ARSA, J.E. Collinsら、Nature 377 suppl:367, 1995) 及び多型マーカー (D22S315, D22S275, D22S280, D22S281, D22S277, D22S278, D22S283, D22S272, D22S282, D22S274, J.E.Collinsら、Nature 377 suppl:367, 1995) の存在をPCRで検出することによって調べた。

のと考えられた。残りのクローンについては、ヒトIgλ遺伝子は検出されないが 、上記の22番染色体多型マーカーの幾つかが検出された。

[0313]

### (2) FISH解析

上記2クローン中の52-18に対して、実際にヒト22番染色体が細胞中でどのように存在しているかをFISHによって解析した。染色体標本の作製、ハイブリダイゼーション、検出などの基本操作は富塚ら(Nature Genet. 16, 133-143, 1997)に従い、プローブはヒトCOT-1 DNA (ローダミン標識)を用いた。20から30の分裂像を観察した結果、PCRの結果のとおり、ヒト22番染色体のほぼ全長が独立して存在していることが確認できた(図50)。赤色に染まっているのがヒト22番染色体である。

以上の解析結果より、トリDT40細胞株52-18 (以下DT40/#22neoと記す) はヒト 22番染色体のほぼ全長を有すると判断した。

[0314]

(実施例83)トリDT40細胞中でのヒト22番染色体の特異的断片化

(実施例82)で得たDT40/#22neoに対して、(実施例81)で作製したプラスミドpBS-TEL/LIFPuroをトランスフェクションし、ヒト22番染色体をLIF遺伝子座上で特異的に断片化することを試みた。

DT40/#22neo細胞の培養は、G418 (1mg/ml) を添加した(実施例82)と同じ条件で行った。 $10^7$ 個の細胞を冷PBSで1回洗浄し、0.5mlのPBSに懸濁し、氷上に置いた。Eco RIで線状化したpBS-TEL/LIFPuro 25-30  $\mu$ gを細胞に加え、ピペットで混合し、エレクトロポレーション用のキュベット(バイオラッド)に移し、氷中で10分間静置した。キュベットをジーンパルサー(バイオラッド)にセットし、550V, 25 $\mu$ F の条件で電圧印加した。氷中で10分間静置後、培地(前記)を含んだ75cm $^2$ 培養フラスコに細胞を移し、24時間培養した。24時間後、 G418 (1mg/ml) とピューロマイシン(0.3 $\mu$ g/ml, シグマ)を添加した培地に交換し、96穴培養プレート5-8枚に分注し、約2週間の選択培養を行い、耐性クローンを単離した

用いたプライマー配列の一部は以下のようである。残りのプライマー配列に関しては富塚ら (Nature Genet. 16, 133-143, 1997) が用いたものと同じである。LIFについては、上記実験より存在していることは明らかである。

[0318]

CYP2D6

センスプライマー;5'-CTGCGTGTGTAATCGTGTCC-3'(配列番号71)

アンチセンスプライマー;5'-TCTGCTGTGAGTGAACCTGC-3'(配列番号72)

ECGF1

センスプライマー;5'-AGGAGGCACCTTGGATAAGC-3'(配列番号73)

アンチセンスプライマー;5'-TCACTCTGACCCACGATACAGC-3'(配列番号74)

PCR反応液の組成は、10 X Ex Taq buffer (宝酒造) 5  $\mu$ 1, dNTPmixture(2.5m M each) (宝酒造) 8  $\mu$ 1,各プライマー10pmol,ゲノムDNA100ng, Ex Taq (5u/ $\mu$ 1) (宝酒造) 0.5  $\mu$ 1 で、滅菌蒸留水を足して全量50 $\mu$ 1にした。反応液の調製は全て氷上で行い、予め85℃にセットしてあるサーマルサイクラー (PCR system 9600,パーキンエルマー)のウェルに反応チューブをセットした。94℃で1分加熱後、98℃,10秒、56℃ (CYP2D6とECGF1は65℃),30秒、72℃,30秒のサイクルを35回行った。結果を図48に示した。〇、×の表記は前記と同じである。この図から明らかなように、クローン67,68,328,343について、ヒトテロメア配列が挿入されているLIF遺伝子座よりテロメア側の遺伝子及びマーカーは全て検出されていないことが分かる。少なくともこの4クローンに関しては、予想通りのテロメア配列による断片化が起きていることが考えられる。

[0319]

### (2) FISH解析

実際にヒト22番染色体が断片化しているか否かをFISHにより解析した。実験方法は前記と同様であり、プローブはヒトCOT1 DNA(ローダミン標識)とプラスミドpGKPuro (FITC標識)を用いた。 COT1染色により、ほぼ全長のヒト22番染色体を持つDT40/#22neoと比較して断片化しているかが視覚的に判断できる。また、予想通りベクターが挿入されたLIF遺伝子座で断片化していれば、Puroプローブ由来のシグナルを22番染色体断片のテロメアー端に認めることができるはずであ

マ、C-3041)で0.5μg/mlに希釈し96穴プレート(NUNC、442404)に50μlずつ分注しコーティングした。ビオチン標識抗ヒト免疫グロブリン 2 鎖抗体(Vector、BA-3070)とABCキット(Vector、PK4000)を用いてTMBZ(DAKO、S1599)により検出した。陰性対照の約2倍以上の吸光度を目安にして判定した。陽性ウエルの細胞を96穴プレートに移し、IMDMに1mg/mlのG418と10%FBSとを添加した培地を用いて培養した。培養上清をELISAで解析した。 TNF-αを炭酸緩衝液で0.5μg/ml に希釈し96穴プレートに50μlずつ分注しコーティングした。ペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリンμ鎖抗体(Biosorce、AHI0604)を用いてTMBZにより検出した。陰性対照の約2倍以上の吸光度を目安にして判定し、陽性ウェルのうち発色の強い2個のウエルの細胞を(実施例66)と同様に限界希釈法でクローニングし、 TNF-αに結合しヒトIgμとIg2を持つ完全ヒト抗体を生産するハイブリドーマを得た。

[0321]

### (2) 抗TNF-αヒトIgM抗体の取得

(実施例67-(3)) で作製されたキメラマウスCLF13-13 (TT2FESクローンLF13由来、キメラ率50%) に対して、ヒトTNF-αによる免疫を行いハイブリドーマを作製した。PBSに溶解したヒトTumor Necrosis Factor-α (TNF-α、PEPRO TECH E C LTD.、300-01A) とアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Resea ch Inc.) とを混合して0.025mg/mlの TNF-α溶液を調整し、その0.2mlを腹腔に5回にわたって毎週免疫した。5回目の免疫の2週間後にTNF-α溶液を免疫してブーストした。さらにブーストの2週間後にPBSに溶解した0.025mg/mlのTNF-αを免疫した。毎週採血し、血清中の抗TNF-αヒトIgγ濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。図50に示すようにTNF-αに対するヒトIgγ抗体価が上昇した。最終免疫の3日後に、キメラマウスからひ臓を取り出し、(実施例24)に従いPEGにて細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。融合後の細胞を、ひ細胞数が25万個/mlとなるよう、1mg/mlのG418、2%牛胎児血清、 HCF(エア・ブラウン)5%を添加した培地(三光純薬、エス・クローンクローニングメデュームCM-B)に希釈し、各wellに50μlずつ96穴プレート分注し培養した。培養14日目には約60%のwellにコロニーが生じた。培養上清を(実施例14)に従いELISA法によってヒ

ト抗体産生ハイブリドーマのスクリーニングを行った。  $TNF-\alpha$  を炭酸緩衝液で0.5  $\mu$  g/ml に希釈し96穴プレートに50  $\mu$  l ずつ分注しコーティングした。ペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリン  $\gamma$  鎖抗体 (シグマ、A-0170) を用いてTMBZ により検出した。陰性対照の約2倍以上の吸光度を目安にして判定した。陽性ウエルの細胞を96穴プレートに移し、IMDMに10%FBSと1mg/mlの G418とを添加した培地を用いて培養した。培養上清をELISAで解析した。  $TNF-\alpha$  を炭酸緩衝液で0.5  $\mu$  g/ml に希釈し96穴プレートに100  $\mu$  l ずつ分注しコーティングした。ペルオキシダーゼ標識抗ヒト免疫グロブリン  $\lambda$  鎖抗体 (Southern Biotechnology Associates Inc.、2070-05) を用いてTMBZにより検出した。陰性対照の約2倍以上の吸光度を目安にして判定し、2個のウエルでヒトIg  $\gamma$  Elg  $\lambda$  を持つ完全ヒト抗体の存在が確認された。

[0322]

この結果よりヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に移入して作製したキメラマウスにおいてTNF-α抗原刺激に対して、抗原特異的ヒトIgγの抗体価上昇が起こることが確認された。またこれらのキメラマウスからTNF-αに特異的な完全ヒト抗体IgMあるいはIgGを生産するハイブリドーマが得られることが確認された。

[0323]

## (3)糖鎖抗原に対するヒトIgM抗体の取得

(実施例67-(3)) で作製されたキメラマウスCLH13-10 (TT2FESクローンLH13由来、キメラ率60%) およびCLH13-18 (TT2FESクローンLH13由来、キメラ率30%) に対して、ガングリオシドによる免疫を行った。アジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Reseach Inc.、R-700) を2mlのクロロホルム・メタノール (2:1) に溶解した。そのそれぞれ1ml を、1mlのクロロホルム・メタノール (2:1) に溶解した1mgのGM2 (シグマ、 G8397) あるいは1mg のASIALO-GM1 (ISOSEP AB、65/12) と混合した。混合溶液をナス型フラスコに移し、ロタリーエバポレータにて乾燥させた。PBSをそれぞれ1ml添加した後Vortexミキサーを用いて激しく攪拌し、懸濁液を調製した。 GM2とASIALO-GM1とを含んだ懸濁液を等量混合し、

る。結果の一部を図49に示した。全てのクローンにおいて、20から30の分裂像を観察した結果、驚くべきことに相同組み換え体8クローンの全てにおいて、 Puroプローブ由来のシグナル (黄緑色)をテロメアー端に持つヒト22番染色体の小断片 (赤色)が観察された。上記のPCR解析の結果、断片化が起きていないと推察されたクローン (64, 212, 222, 305) に関しては、ほぼ全長のヒト22番染色体を持つ細胞が全細胞の約10%位混在していた。

以上の実験結果より、トリDT40/#22 neo細胞において、LIF遺伝子座にヒトテロメア配列が挿入された相同組み換え体が約10%の効率で得られ、その全てのクローンにおいて(効率100%)、その挿入部位でヒト22番染色体の小断片化が起きていることが分かった。

### [0320]

(実施例84) ヒト14番染色体部分断片及びヒト22番染色体部分断片を保持する内 在性抗体重鎖、軽鎖欠損マウスES細胞を免疫不全マウス宿主胚に移入して作製し たキメラマウスからの完全ヒト抗体産生ハイブリドーマの取得

### (1) 抗TNF-αヒトIgM抗体の取得

(実施例67-(3)) で作製されたキメラマウスCLH13-7 (TT2FESクローンLH13由来、キメラ率50%) に対して、ヒトTNF-αによる免疫を行いハイブリドーマを作製した。PBSに溶解したヒトTumor Necrosis Factor-α (TNF-α、PEPRO TECH E C LTD.、300-01A) とアジュバント (MPL+TDM Emulsion, RIBI Immunochem Reseach Inc.、R-700) とを混合して0.025mg/mlの TNF-α溶液を調整し、その0.2mlを腹腔に免疫した。70日間にわたって1あるいは2週間間隔で免疫し、最終免疫の2週間後にPBSに溶解した0.025mg/mlのTNF-αを0.2ml免疫した。最終免疫の3日後に、キメラマウスからひ臓を取り出し、(実施例24)に従いPEGにて細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。融合後の細胞を、ひ細胞数が25万個/mlとなるよう、1mg/mlのG418、2%牛胎児血清、 HCF (エア・ブラウン) 5%を添加した培地 (三光純薬、エス・クローンクローニングメデュームCM-B) に希釈し、各wellに100μlずつ96穴プレート分注し培養した。培養14日目には約40%のwel1にコロニーが生じた。培養上清を(実施例14)に従いELISA法によって解析し、ヒト抗体産生ハイブリドーマのスクリーニングを行った。 TNF-αを炭酸緩衝液(シグ

その0.2mlを毎週3回キメラマウスCLH13-18には腹腔に、キメラマウスCLH13-10に は皮下にそれぞれ免疫した。毎週採血し、ELISAを(実施例14)の方法に従って 行い、抗体価の上昇を確認した。ガングリオシドGM2あるいはASIALO-GM1をエタ ノールに溶解して $6\mu g/m1$ とし、 $50\mu 1$ ずつELISAプレートに分注した。2時間室温 にて放置し、乾燥させた。ガングリオシドを含まないエタノールのみをプレート に添加し対照とした。2%牛血清アルブミン(BSA、オリエンタル酵母)を添加し たPBSを200μ1/wel1添加し室温で3時間ブロッキングした。洗浄後4%牛胎児血清 (FBS) を添加したPBSで、100倍に希釈したキメラマウス血清を50μ1/well添加 し4℃で一晩放置した。洗浄後0.1%BSA添加のPBSで希釈したペルオキシダーゼ標 識抗ヒトIgM抗体( Biosorce、AHI0604)を50μl/well添加し3時間室温で放置し た。TMBを添加し15分反応させた後、1Nの硫酸を添加して反応を停止させた。450 nmにおける吸光度を測定し、対照としたウェルの吸光度を減じて抗体価の上昇を 求めた。キメラマウスCLH13-18血清中の抗アシアロGM1ヒトIgμの結果を図51 に、キメラマウスCLH13-10血清中の抗GM2ヒトIgμの結果を図 5 2 にそれぞれ示 す。図に示すように、ガングリオシドを免疫することによって、抗原に特異的な ヒトIgμ抗体価の上昇が確認された。すなわち、本発明のヒト抗体生産キメラマ ウスにおいて糖鎖抗原に対する免疫応答が確認された。

#### [0324]

3回目の免疫の3週間後に再度免疫しブーストした。最終免疫の3日後に、キメラマウスからひ臓を取り出し、(実施例24)に従いPEGにて細胞融合し、ハイブリドーマを作製した。

このようにして得られるガングリオシドGM2あるいはASIALO-GM1に対するヒト抗体はHIVの治療やメラノーマなどのガンの治療に有用と考えられる。

#### [0325]

(実施例85) 完全なヒト抗体を主として産生するマウス系統の交配による作製(B)

(実施例73)に示された方法で作成された「SC20断片保持、重鎖欠損ホモあるいはヘテロ、κ鎖欠損ホモまたはヘテロ」である雄あるいは雌個体と、(実施例73)に示された方法で作成された「W23断片保持、重鎖欠損ホモあるいはヘテロ、κ

鎖欠損ホモまたはヘテロ」である雄あるいは雌個体の間の交配を行った。この交配により、SC20断片を保持し、W23断片を保持し、重鎖欠損についてホモであり、κ鎖欠損についてホモであるという4つの条件を満たすマウス個体(ダブルTc/KO)が得られることが期待される。

[0326]

4.5

1, 7

(1) シングルTc/KOマウスの解析

まず、上記の交配により誕生した計189匹のマウスについて、以下の4種(A) ~ (D) の解析を行い、上記、の条件のみを満たす(W23断片を保持せず、κ欠損についてはヘテロあるいは野生型である)個体(シングルTc/KO)の検索を行った。これらの個体においては欠損しているマウス重鎖の代わりに導入したヒト重鎖の働きによってによりBリンパ球が発生する。また、血清中の抗体分子は大部分がヒト重鎖を含むと考えられる。

# [0327]

- (A)SC20断片保持検討のため、各個体より調製したDNAについて(実施例68-(4))と同様な方法でPCR解析を行った。使用したプライマーはSC20断片特異的なD14S543である。
- (B) 内因性重鎖欠損の状態を検討するため、(実施例49)と同様にサザン解析を行った。

[0328]

- (C) W23断片保持検討のため、各個体より調製したDNAについて(実施例1)と同様な方法でPCRを行った。使用したプライマーはW23断片特異的なD2S1331 (Tomizuk aら,Nature Genetics,1997,前記)である。
- (D)内因性 κ鎖欠損の状態を検討するため、(実施例58)と同様にサザン解析を 行った。

これらの解析により189匹中20匹がシングルTc/KO個体であると判定された。

[0329]

シングルTc/KO個体HK83 (5ヶ月令) より $50\mu$ lの血液を採取し、凝固防止のため $2\mu$ lの0.5M EDTA (pH. 8.0) を加えた。この血液サンプルを遠心用チューブに移した後、 $400\mu$ lの滅菌水を加え、30秒後にさらに10%牛胎児血清(FCS)を含む2

活性を450nmの吸光度で評価し、精製された濃度既知のγ鎖を持つマウスイムノグロブリンIgG (Pharmingen、03171D) をFBSを添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のマウス免疫グロブリン濃度を求めた。その結果を(図54)に示す。図中には各Igについて測定値の平均値も示した。シングルTc/K0個体のヒトμ鎖平均濃度は抗体重鎖欠損ヘテロ個体のマウスμ鎖平均濃度を上回った。シングルTc/K0個体についても前記と同様にマウスμ鎖、マウスγ鎖濃度を測定した結果、全てのシングルTc/K0個体においてマウスμ鎖は検出されず(1μg/ml以下)、マウスγ鎖濃度の平均値はヒトγ鎖濃度の1/10程度であった。すなわち、シングルTc/K0個体の血清中においては大部分の抗体分子がヒト重鎖を含むと考えられた。

### [0331]

前記のシングルTc/KOマウス7個体のうち4個体の血清サンプルについて(実施例29)と同様に血清中ヒトィ鎖サブクラス濃度をELISA法により測定した。その結果を(図55)に示す。全てのシングルTc/KO個体において4種のhィサブクラスが検出された。

2個体のシングルTc/KO個体HK45(5ヶ月令)、HK108(3.5ヶ月令)について、PBSに0.25mg/mlの濃度で溶解したヒト血清アルブミン(HSA,シグマ,A3782)0.5mlを0.5mlのアジュバント(TiterMaxGold, Cytex corporation,G-1)と混合しその0.1mlを皮下免疫した。免疫0日目、8日目、15日目のこれらのマウスより採血し、血清中の抗HSAーヒトγ鎖抗体価を(実施例21)と同様にELISA法により測定した。HSAで免疫したシングルTc/KOマウスの両個体の免疫後15日目血清において抗HSA-ヒトγ鎖抗体価の有意な上昇が観察された。すなわち、シングルTc/KOマウスにおいては免疫したヒト由来蛋白質に対する抗原特異的抗体(この場合ヒトγ鎖とマウスκ鎖あるいはマウスλ鎖からなる)が産生されることが示された

### [0332]

#### (2) ダブルTcマウスの解析

誕生した計189匹のマウスについて、以下の4種(A)~(D)の解析を行い、少なくとも、の条件を満たし、ヒト重鎖とヒトκ鎖を同時に発現するマウス個体(

×濃度のPBSを加え、SEROMATIC-2(KA2200、クボタ社製)にて遠心した。遠心後上清を除き、わずかに残った液に沈殿を懸濁しStaining Medium(SM:1mM EDTA,5% FCS,0.05% アジ化ナトリウムを含むPBS)を加えて再度遠心を行った。上清を取り除いた後に残る $10\mu$ 1程度のSMに沈殿を懸濁し、 $1\mu$ 1のFc-block (PharMingen,01241A,anti-mouse CD32/CD16)を加えて1時間氷上で静置した。1時間経過後、さらにPE標識されたanti-mouse CD45R/B220 (PharMingen,01125A)及びFITC標識されたanti-human IgM(Pharmingen,08074D)を各1 $\mu$ 1づつ加え、さらに1時間静置した。染色された細胞をこの後、SMにより前記のように2回洗浄し、最終的に200 $\mu$ 1のSMに懸濁して末梢血有核細胞染色サンプルとした。フローサイトメトリーによる解析はFACS-vantage(Becton Dickinson社製)を使用して行った。その結果を(図53)に示す。マウス抗体重鎖欠損(KO)個体(図中 $\Delta$ H/ $\Delta$ H)においてはB220陽性細胞すなわちBリンパ球が存在しないが、シングルTc/KO個体(図中 $\Delta$ H/ $\Delta$ H,SC20)においてはB220、ヒト $\mu$ 鎖(図中h $\mu$ )の両者が陽性のBリンパ球の細胞集団の存在が確認された。すなわち、シングルTc/KO個体においてはSC20断片の導入によりBリンパ球の欠損が救済されたことが示された。

### [0330]

シングルTc/KOマウス8個体、HK7 (18週令)、HK38 (13週令)、HK45 (13週令)、HK45 (13週令)、HK50 (13週令)、HK61 (13週令)、HK78 (17週令)、HK83 (17週令)、HK83 (17週令)、HK50 (13週令)、HK61 (13週令)、HK78 (17週令)、HK83 (17週令)より採血し、血清中ヒトル鎖濃度、ヒトγ鎖濃度を(実施例14)と同様にELISA法により測定した。また、対照として抗体重鎖欠損へテロであり、抗体 κ鎖欠損についてヘテロあるいは野生型である (ヒト染色体断片を含まない)4 個体 (シングルTc/KOと同腹の子であり、13~18週令である)より取得した血清についてマウスμ鎖を (実施例75)に示した方法で、マウスγ鎖を以下に示す方法により検出した。マウスγ鎖濃度は (実施例14)に従いELISA法で決定した。PBSで希釈した抗マウス免疫グロブリンγ鎖抗体 (シグマ、14280)を96六マイクロタイタープレートにコーティングし、牛胎児血清 (FBS)を加えたPBSで希釈した血清試料を加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロブリンγ鎖抗体 (Caltag、M30107)を加えてインキュベートした。プレートを洗浄し、ペルオキシダーゼ基質としてTMBZ (住友ベークライト、ML-1120T)の添加により酵素

ダブルTc)の検索を行った。

(A) SC20断片保持検討のため、各個体より調製したDNAについて(実施例68-(4))と同様な方法でPCR解析を行った。使用したプライマーはSC20断片特異的なD14S543である。

[0333]

- (B) W23断片保持検討のため、各個体より調製したDNAについて(実施例68-(4)) と同様な方法でPCR解析を行った。使用したプライマーはW23断片特異的なD2S133 1 (Tomizukaら,Nature Genetics,1997,前記)である。
- (C) ヒトμ鎖発現確認のため、3~6週令の各個体より採血し(実施例68-(4))に示した方法でELISA解析を行った。

[0334]

(D) ヒトκ鎖発現確認のため、3~6週令の各個体より採血し(実施例20)に示した方法でELISA解析を行った。

これらの解析により189匹中20匹が4種全ての解析で陽性であり、ダブルTc個体であると判定された。すなわち、SC20断片、W23断片はマウス個体において同時に保持され、かつ同時に機能発現することが確認された。

[0335]

(3) ダブルTc/KOマウスの解析

20個体のダブルTcマウスのDNAについて(実施例49)及び(実施例58)と同様にサザン解析を行い、マウス重鎖、κ鎖遺伝子欠損の状態を解析した。その結果、6個体が抗体重鎖欠損ホモかつκ鎖欠損ホモであり、ダブルTc/KOマウスと判定された。

2個体のダブルTc/KOマウスHKD 5 (9週令)、HK190(6週令)より (実施例85-(1)) と同様な方法で調製した末梢血有核細胞についてフローサイトメトリーによる解析を (実施例85-(1)) と同様に行った。その結果、両個体においてB220陽性かつhμ陽性であるBリンパ球細胞の存在が確認された。

[0336]

3個体のダブルTc/KOマウスHK77 (17週令)、HKD4 (6週令)、HKD5 (6週令) )より採血し、血清中ヒトμ鎖濃度、ヒトγ鎖濃度を(実施例14)と同様にELISA 法により測定した。その結果この3個体のヒトμ鎖血清中濃度の平均値、ヒトγ 鎖血清中濃度の平均値はそれぞれ360mg/1、201mg/1であった。ヒトμ鎖濃度、ヒ トγ鎖濃度共に(図54)に示したシングルTc/KOマウスのものとほぼ同等であった 。さらに、これら3個体に加え、HK190 (4週令)、HK192 (4週令) について血清 中ヒトκ鎖濃度を(実施例20)と同様に、マウスλ鎖濃度を以下に示す方法で検出 した。マウスλ鎖濃度を(実施例14)に従いELISA法で検出した。PBSで希釈した 抗マウス免疫グロブリンλ鎖抗体 (Caltag、M33600) を96穴マイクロタイタープ レートにコーティングし、牛胎児血清 (FBS) を加えたPBSで希釈した血清試料を 加え、次いでペルオキシダーゼ標識抗マウス免疫グロブリンλ鎖抗体( Caltag 、M33607) を加えてインキュベートした。プレートを洗浄し、ペルオキシダーゼ 基質としてTMBZ (住友ベークライト、ML-1120T) の添加により酵素活性を450nm の吸光度で評価し、精製された濃度既知のα鎖を持つIgG(シグマ、M6034)をFB Sを添加したPBSで段階的に希釈したものと比較し血清中のマウス免疫グロブリン λ鎖濃度を求めた。測定結果をもとにまず各個体において全軽鎖濃度(ヒトκ鎖 濃度+マウスλ鎖濃度)に対するヒトκ鎖濃度の百分率を求めた。次に5個体に ついてその平均値を算出した結果、60%であった。すなわち、これらダブルTc/KO マウス血清中においては、完全なヒト抗体分子 (ヒトμ鎖/κ鎖あるいはヒトγ 鎖/ $\kappa$ 鎖) がハイブリッド抗体分子 (ヒト $\mu$ 鎖/マウス $\lambda$ 鎖あるいはヒト $\gamma$ 鎖/マ ウスλ鎖)よりも優位に発現していることが示された。

[0337]

ر**هٔ این نظار**ان بر بر

ダブルTc/KOマウスHKD5(6週令)より採血し、(実施例85-(1))と同様に血清 中hγサブクラス濃度をELISA法により測定した。その結果は、ヒトγ1鎖:141mg /l、ヒトγ2鎖:61mg/l、ヒトγ3鎖:119mg/l 、ヒトγ4鎖:8.3mg/lであり、4 種全てのヒトィ鎖サブクラスが検出された。

2個体のダブルTc/KOマウスHK77 (20週令)、HKD5 (10週令) について、PBSに0 .25mg/mlの濃度で溶解したヒト血清アルブミン (HSA, シグマ, A3782) 0.5mlを0 .5mlのアジュバント (TiterMaxGold, Cytex corporation, G-1) と混合しその0. 1mlを皮下免疫した。免疫0日目、8日目、15日目のこれらのマウスより採血し、 血清中の抗HSA-ヒトγ鎖抗体価を(実施例21)と同様に、また抗HSA-ヒトκ鎖 抗体価を(実施例23)と同様にELISA法により測定した。その結果を(図56)、(図57)に示す。HSAで免疫したダブルTc/KOマウスの両個体の免疫後15日目血 情において抗HSAーヒトγ鎖抗体価及び抗HSAーヒトκ鎖抗体価の有意な上昇が観 察された。すなわち、ダブルTc/KOマウスにおいては免疫したヒト由来蛋白質に 対する抗原特異的な完全ヒト抗体(この場合ヒトγ鎖とκ鎖からなる)が産生さ れることが示された。

[0338]

# 【発明の効果】

本発明により、単一または複数の外来染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物が提供された。本発明のキメラ非ヒト動物を利用して、生物学的に活性な物質を製造することができる

本発明により、単一または複数の外来染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現する分化多能性を持つ細胞が提供された。該細胞を利用して、骨髄移植等による遺伝病治療を行うことができる。

[0339]

本発明により、少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞が提供された。破壊された内因性遺伝子と同じまたは相同の遺伝子を含む単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させる受容細胞として本発明の細胞を利用することにより、単一または複数の外来染色体あるいはその断片を保持し、該外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現する機能細胞あるいはキメラ非ヒト動物を作製することができる。かかるキメラ非ヒト動物またはその子孫の個体、組織または細胞において、単一または複数の外来染色体あるいはその断片上の遺伝子を発現させることにより、その産物としての生物学的に活性な物質を製造することができる。

[0340]

【配列表】

SEQUENCE LISTING

# <110> KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA

<120> NON-HUMAN ANIMALS RETAINING HUMAN CHROMOSOMES WHICH CAN BE PASSED

ON TO PROGENIES

<130> P98-0472

<140>

<141>

<160> 8

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 1

tggaaggtgg ataacgccct

20

<210> 2

<211> 22

<212> DNA

ttggatcact ttggacccag

20

⟨210⟩ 5

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 5

ctctcctgca gggccagtca

20

<210> 6

**<211> 22** 

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 6

tgctgatggt gagagtgaac tc

22

<210> 7

C. A. A. C	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 9	
tggtggctga aagctaagaa	20
<210> 10	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
	•
<400> 10	
ccagaagaat ggtgtcatta	20
	·
<210> 11	
<211> 20	
<212> DNA	
(212) Artificial Sequence	
<220>	
(223) Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 11	
tccaggttct gcagagcaag	20

⟨211⟩ 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 7 agtcagggca ttagcagtgc <210> 8 ⟨211⟩ 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 8 gctgctgatg gtgagagtga <210> 9 ⟨211⟩ 20 <212> DNA

<220>

<212> Artificial Sequence

20

<210> 12	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 12	•
tgtagttgga ggccatgtcc	20
<210> 13	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 13	
ccccacccat gatccagtac	20
<210> 14	
<211> 20	

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<210> 17

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 17

ggctatgggg acctgggctg

20

<210> 18

<211> 22

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

**<400> 18** 

cagagacaca ggcacgtaga ag

22

<210> 19

<211> 20

**<400> 21** 

caaaaagtcc aaccctatca

20

<210> 22

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 22

gccctcagaa gacgaagcag

20

<210> 23

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 23

tcgttcctgt cgaggatgaa

```
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
(223) Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 19
                                                                      20
ttaagggtca cccagagact
 <210> 20
 <211> 20
 <212> DNA
 <212> Artificial Sequence
  <220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer
  <400> 20
                                                                       20
  tgtagttgga ggccatgtcc
   ⟨210⟩ 21
   <211> 20
   <212> DNA
   <212> Artificial Sequence
```

(223) Description of Artificial Sequence: Primer

<210> 24 <211> 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 24 20 tcactccgaa gctgcctttc <210> 25 <211> 21 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 25 21 atgtacagga tgcaactcct g <210> 26 <211> 20 <212> DNA

<212> Artificial Sequence

19 | 10 = 001 (

```
<220> -
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 26
tcatctgtaa atccagcagt
<210> 27
<211> 20
```

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 27

gatcccatcg cagctaccgc

20

20

<210> 28

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 28

ttcgccgagt agtcgcacgg

<220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 14 gccctcagaa gacgaagcag 20 <210> 15 **<211> 22** <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer **<400> 15** gagagttgca gaaggggtga ct 22 <210> 16 <211> 22 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 16

<212> Artificial Sequence	
<220>	
<pre>&lt;223&gt; Description of Artificial Sequence: Primer</pre>	
<400> 2	
tcattctcct ccaacattag ca	22
<210> 3	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
(223) Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 3	·
gcaatcggtc tgccggaaga	20
<210> 4	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<210> 29	
<211> 22	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 29	
gatgaactag tccaggtgag tt	22
<210> 30	
<211> 22	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 30	
ccttttggct tctactcctt ca	22

<210> 31

<211> 20

<212> DNA

(DID) MI CILICIAL DOGACIO	<212>	Artificial	Sequence
---------------------------	-------	------------	----------

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 31

atagagggta cccactctgg

20

<210> 32

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 32

aaccaggtag gttgatatgg

20

<210> 33

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 33	
aagttcctgt gatgtcaagc	20
<210> 34	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
(223) Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 34	
tcatgagcag attaaacccg	20
<210> 35	
<211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 35	

<210> 36

tgtgaaggag gaccaggtgt

```
<211> 20
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 36
tgtaggggtt gacagtgaca
<210> 37
<211> 20
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 37
ctgagagatg cctctggtgc
<210> 38
<211> 20
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
```

<220>

20

# 特平10-236169

<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 38	
ggcggttagt ggggtcttca	20
<210> 39	
<210×39 <211> 20	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 39	0.0
ggtgtcgtgg aactcaggcg	20
<210> 40	
<211≻ 20	•
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 40	
ctggtgcagg acggtgagga	20

```
<210> 41
<211> 20
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
 <400> 41
 gcatcctgac cgtgtccgaa
 <210> 42
 <211> 20
 <212> DNA
 <212> Artificial Sequence
  <220>
  <223> Description of Artificial Sequence: Primer
  <400> 42
  gggtcagtag caggtgccag
   <210> 43
   <211> 20
   <212> DNA
```

<212> Artificial Sequence

```
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 43
                                                                     20
agtgagataa gcagtggatg
<210> 44
<211> 20
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 44
                                                                     20
gttgtgctac tcccatcact
<210> 45
<211> 21
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 45
```

<210> 46

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 46

ggagacgagg gggaaaaggg

20

<210> 47

<211> 27

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 47

atggactgga cctggaggrt cytctkc

27

<210> 48

<211> 27

<212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 48 27 atggagyttg ggctgasctg gstttyt <210> 49 <211> 27 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 49 atgrammwac tktgkwbcwy sctyctg 27 <210> 50 <211> 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400>	50
cagage	zca:

cagaggcagt tccagatttc

20

<210> 51

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 51

tgggatagaa gttattcagc

20

<210> 52

<211> 27

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 52

atggacatgr rrdycchvgy kcasctt

<210> 53 <211> 28 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 53 28 ccaagcttca ggagaaagtg atggagtc <210> 54 <211> 28 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 54 28 ccaagcttag gcagccaacg gccacgct <210> 55 <211> 28 <212> DNA <212> Artificial Sequence

```
<220>
```

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 55

ccaagcttca gaggcagttc cagatttc

28

<210> 56

<211> 28

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 56

gggaattcgg gtagaagtca ctgatcag

28

<210> 57

<211> 28

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 57

gggaattcgg gtagaagtca cttatgag

```
<210> 58
<211> 28
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 58
                                                                      28
gggaattcgg gtagaagtca cttacgag
<210> 59
<211> 60
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Probe
<400> 59
accttcatcg tcctcttcct cctgagcctc ttctacagca ccaccgtcac cctgttcaag
                                                                     60
```

⟨210⟩ 60

<211> 60

<212> DNA

```
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Probe
<400> 60
tgatgctgca ccaactgtat ccatcttccc accatccagt gagcagttaa catctggagg
                                                                      60
⟨210⟩ 61
<211> 22
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 61
ctggggtgag ccggatgttt tg
                                                                      22
⟨210⟩ 62
<211> 22
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
```

<212> Artificial Sequence

<400> 62	
ccaacccagc tcagcccagt tc	22
<210> 63	
<211> 36	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<223> Description of Artificial Sequence: Primer	
<400> 63	
aattcccgcg ggtcgacgga tccctcgagg gtacca	36
<210> 64	
<211> 36	
<212> DNA	
<212> Artificial Sequence	
<220>	
<pre>&lt;223&gt; Description of Artificial Sequence: Primer</pre>	
<400> 64	

<210> 65

gggcgcccag ctgcctaggg agctcccatg gttcga

36

```
<211> 33
```

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 65

tcgaactagt aggagaagtg aacttgagga ggc

33

<210> 66

<211> 31

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 66

tcgaactagt gattcagtga tgctgtgcag g

31

<210> 67

**<211> 22** 

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220>

```
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 67
gagagttgca gaaggggtga ct
                                                                       22
<210> 68
<211> 22
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400> 68
ggagaccacc aaaccctcca aa
                                                                      22
<210> 69
<211> 24
<212> DNA
<212> Artificial Sequence
<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Primer
<400>-69-
gagctgcaag aactcttcct cacg
```

24

<210> 70 <211> 28 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 70 28 atgactctaa ggcaggaaca tctgtacc <210> 71 <211> 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 71 20 ctgcgtgtgt aatcgtgtcc <210> 72

<211> 20

<212> DNA

<212> Artificial Sequence

<220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 72 20 tctgctgtga gtgaacctgc **<210> 73** <211> 20 <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer <400> 73 20 aggaggcacc ttggataagc <210> 74 **<211> 22** <212> DNA <212> Artificial Sequence <220> <223> Description of Artificial Sequence: Primer

<400> 74

tcactctgac ccacgataca gc

[0341]

【配列表フリーテキスト】

配列番号1~58および61~74は、プライマーの塩基配列を示す。

[0342]

配列番号59および60は、プローブの塩基配列を示す。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、ヒト2番染色体(断片)を保持するA9細胞の解析(PCR解析)の結果が示されている。

【図2】

図2は、E14耐性株においてヒト22番染色体(断片)が保持されていることが 示されている(PCR解析)。

【図3】

図3は、22番染色体導入ES細胞由来キメラマウスにおいてヒトL1配列が保持されていることを示す電気泳動写真である(サザン解析)。

【図4】

図4は、ヒト22番染色体導入キメラマウス臓器におけるヒト染色体の保持の様子を示す電気泳動写真である(PCR解析)。

【図5】

図5は、ヒト22番染色体導入キメラマウスにおけるヒト遺伝子発現(RT-PCR)の結果を示す電気泳動写真である。

【図6】

図6は、ヒト22番染色体導入キメラマウス臓器におけるヒト遺伝子発現(RT-P CR)の結果を示す電気泳動写真である。

【図7】

図7は、E14耐性株においてヒト4番染色体(断片)が保持されていることが示されている(PCR解析)。

【図8】

図8は、ヒト4番染色体導入E14細胞株におけるヒトL1配列の検出(サザン解析)の結果を示す電気泳動写真である。

【図9】

図9は、ヒト4番染色体導入ES細胞由来キメラマウスにおいてヒトL1配列が保持されていることを示す電気泳動写真である(サザン解析)。

【図10】

図10は、TT2耐性株においてヒト14番染色体(断片)が保持されていることが 示されている(PCR解析)。

【図11】

図11は、ヒト14番染色体導入ES細胞由来キメラマウス臓器におけるヒト染色体の保持の様子を示す電気泳動写真である(PCR解析)。

【図12】

図12は、尻尾由来繊維芽細胞G418耐性テストの結果が示されている。

【図13】

図13は、ヒト血清アルブミン免疫キメラマウス血清中のヒト抗体IgM濃度 (ELI SA) が示されている。

【図14】

図14は、ヒト血清アルブミン免疫キメラマウス血清中のヒト抗体IgG濃度 (ELI SA) が示されている。

【図15】

図15は、ヒトIgM産生ハイブリドーマクローンH4B7の解析(ELISA)の結果が示されている。

【図16】

図16は、ヒト2番染色体部分断片及び14番染色体部分断片を保持するマウスES 細胞株 (TT2細胞株PG15) のFISH解析の結果を示す染色体の形態の写真である。

【図-1-7-}--

図17は、ヒト血清アルブミン免疫キメラマウス血清中の抗ヒト血清アルブミンヒトIgG抗体価の増加が示されている。

## 【図18】

図18は、ヒト血清アルブミン免疫キメラマウス血清中の抗ヒト血清アルブミンヒトIg κ 抗体価の増加が示されている。

【図19】

図19は、ヒト22番染色体導入TT2細胞株におけるヒトL1配列の検出(サザン解析)の結果を示す電気泳動写真である。

【図20】

図20は、ヒト血清アルブミン免疫キメラマウス血清中の抗ヒト血清アルブミンヒトIg λ 抗体価の増加が示されている。

【図21】

図21は、ヒト2番染色体部分断片導入キメラマウスの子孫においてヒト2番染 色体部分断片が保持されていることが示されている写真である(PCR解析)。

【図22】

図22は、ヒト14番染色体導入キメラマウス脾臓において細胞表面にヒトμ鎖が 発現している細胞の存在を示している(フローサイトメトリー解析)。

【図23】

図23は、pLoxP-STneo プラスミドDNA の構造を示している。

【図24】

図24は、マウス抗体重鎖CμのゲノムDNAの構造を示している。

【図25】

図25は、マウス抗体軽鎖κのゲノムDNAの構造を示している。

【図26】

図26は、マウス抗体重鎖Cμターゲッティングベクターと形質転換体TT2F細胞ゲノムDNAのサザンブロットに使用するプローブと相同組換え体で検出されるDNA断片について示している。

【図27】

図27は、マウス抗体軽鎖 κ ターゲッティングベクターと形質転換体TT2F細胞ゲ ノムDNA のサザンブロットに使用するプローブと相同組換え体で検出されるDNA 断片について示している。 【図28】

図28は、マウス抗体重鎖相同組換え体及び相同組換え体由来高濃度G418耐性株のサザン解析の結果を示す電気泳動写真である。

【図29】

図29は、マウス抗体軽鎖相同組換え体のサザン解析の結果を示す電気泳動写真 である。

【図30】

図30は、pLoxP-PGKPuro プラスミドDNA の構造を示している。

【図31】

図31は、マウス抗体軽鎖 κターゲッティングベクターと形質転換体TT2F細胞ゲノムDNA のサザンブロットに使用するプローブと相同組換え体で検出されるべきDNA断片について示している。

【図32】

図32は、マウス抗体軽鎖相同組換え体由来高濃度G418耐性株のサザン解析の結果を示す電気泳動写真である。

【図33】

図33は、HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒトIgH抗体価の増加を示している。

【図34】

図34は、ヒト14番染色体断片及び、ヒト2番染色体断片を保持する抗体重鎖、 抗体軽鎖欠損マウスES細胞のFISH解析の結果を示す写真である。

【図35】

図35は、HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒトIg抗体価の増加を示している

【図36】

図36は、ヒト14番染色体断片を含むマウスA9細胞のFISH解析(ヒトセントロメア配列プローブ)の結果を示す写真である。

【図37】

図37は、ヒト14番染色体断片を含むマウスA9細胞のFISH解析(ヒト染色体特異

的プローブ)の結果を示す写真である。

【図38】

図38は、ヒト染色体断片(14番: SC20、2番: W23)のマウスES細胞における安 定性テストの結果を示している。

【図39】

図39は、ヒト14番染色体断片のマウス個体における安定性解析の結果を示している。

【図40】

図40は、ヒト22番染色体(断片)を保持するG418耐性雑種細胞のPCR解析の結果を示している。

【図41】

図41は、断片化ヒト22番染色体を保持するA9細胞のFISH解析の結果を示す写真である。

【図42】

図42は、交配により確立された完全なヒト抗体を産生するマウス系統の解析結果を示している。

【図43】

図43は、ヒト2番染色体断片W23を保持するマウス血清中のヒト抗体 κ鎖濃度 測定の結果を示している。

【図44】

図44は、血清マウスκ鎖、λ鎖濃度測定の結果を示している。

【図45】

図45は、pBS-TEL/LIFPuro の構造を示す。

【図46】

図46は、DT40細胞株におけるヒト22番染色体の保持を示す。

【図47】

図47は、LIF遺伝子座における相同組み換え体の同定を示す。

【図48】

図48は、DT40/#22neo細胞株におけるヒト22番染色体の断片化を示す。

【図49】

図49は、全長及び断片化ヒト22番染色体を保有するDT40細胞株を示す写真である。

【図50】

図50は、TNF- $\alpha$ 免疫キメラマウス血清中の抗TNF- $\alpha$ ヒトIg  $\gamma$  抗体価の増加を示す。

【図51】

図51は、キメラマウスにおけるアシアロGM1に対する応答を示す。

【図52】

図52は、キメラマウスにおけるGM2に対する応答を示す。

【図53】

図53は、シングルTc/KOマウス末梢血有核細胞のFACS解析の結果を示す。

【図54】

図54は、シングルTc/KOマウス血清中ヒトIg濃度の測定結果を示す。

【図55】

図55は、シングルTc/KOマウス血清中ヒトIgィサブクラス濃度の測定結果を示す。

【図56】

図56は、HSA免疫したダブルTc/KOマウス血清中の抗HSAヒトIgγ抗体価の上昇を示す。

【図57】

図57は、HSA免疫したダブルTc/KOマウス血清中の抗HSAヒトIg κ 抗体価の上昇を示す。


## 【書類名】 図面

## 【図1】

			٠		ut	ロセル配合体	会会体										
		0.5	D-5 B-24 C8他	砂の		0.5	0-8	0-14	E-21	1.23	Ę.		N24II	0	W.23	Υ.68	7.
	2207	×	×	×	×	×	•	•	•	•	×		×	×	×	×	3
多点在	2177	×	×	×	×	×	•	•	•	•	•		: <b>×</b>	•	: >	< >	•
มาส	Vk1.2	•	•	•	×	×	•	•	•	•	•	<b>:</b> >	< ◀	>	<	< >	
道伝子	Vk3-2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	< ■	•	< ■	•	< •	
マーカー	ర	•	•	•	×	×	•	•	•	•	•	<b>&gt;</b> ×	•	>	•	>	•
	\$156	×	×	×	×	×	•	•	•	•	•	×	<b>)</b> ×	< >	<b>)</b> >	< >	
	\$159	×	×	×	×	. <b>x</b>	•	•	•	•	•	: ×	<b>×</b>	· >	<b>( &gt;</b>	< >	
	杂合体	刹立	が立	新阳		初办	Aik	400	华原	和印度			13.1		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,	1
							!		-				#17/E				>


ヒト2帯染色体(断片)を保持するA9細胞のPCR解析

【図2】



E14耐性株におけるヒト22番染色体(断片)の保持(PCR解析)

【図3】




22番染色体導入ES細胞由来キメラマウスにおけるヒトL1配列の保持 (サザン解析) 【図4】

bc 2 メ ò Sp Th I SM $\mathbf{\omega}$ 

DIA1: ヒト-チトクローム b5 レダクターゼ

B: 試 に: 研 SM: 連 Sp: で Th: で Sp: の To: 不 Sp: の To: で Sp: の To: の Sp: の


ウス臓器におけるヒト染色体の保持 (PCR解析) ヒト22番染色体導入キメラマ



MB:ヒト-ミオグロビン DIA1 :ヒト-チトクローム b5 レダクターゼ

22番染色体導入キメラマウスにおけるヒト遺伝子発現






DIA1: ヒト-チトクローム b5 レダクターゼ


MB: ヒト-ミギグロビン

22番染色体導入キメラマウス臓器におけるヒト遺伝子発現





4番染色体導入ES細胞由来キメラマウスにおけるヒトL1配列の保持 (サザン解析)

[図8]



ヒト4番染色体導入E14細胞株におけるヒトL1配列の検出 (サザン解析)






E14耐性株におけるヒト4番染色体 (断片) の保持 (PCR解析)

4

【図10】



TT2耐性株におけるヒト14番染色体(断片)の保持(PCR解析)


BXQII-FS5∑


gM — B K Sp H L Th pc nc M

lgM:ヒト-免疫グロブリンμ鎖


ヒト14番染色体導入キメラマウス臓器におけるヒト染色体の保持 (PCH解析)

【図13】







【図12】



尻尾由来繊維芽細胞G418耐性テスト


【図15】






【図14】

ヒト血清アルブミン免疫やメラマウス血清中のヒト抗 体IgG濃度 (ELISA)




【図16】





【図17】


## HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒ NgG抗体価



【図18】










【図20】


HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒトlg λ 抗体価




【図21】











【図26】


pBluescript マウス抗体重銀C uターゲッティングペクターと形質転換体TT2F粗胞ゲノムDNA のサギングロットに使用するグローグと格回数核え体で被出されるくきDNA断円 SII B. N. SII N, X RI 相同組換之体で検出されるDNA 非相同組換えで検出されるDNA 2 LoxP-STneo R < probe







ヒト染色体導入キメウマウスひ脳組胎の解析








【図30】








### 【図31】

マウス抗体軽鎖 κターゲッティングベクターと形質転換体TT2P細胞ゲノムDNAのサザ ンプロットに使用するプローブと相同組換え体で検出されるべきDNA断片




Kp: Kpnl, B: BamHI, Bg2:Bg12, RI: EcoRI, RV: EcoRV, N: Not, Sl: Sall, Sca: Scal, Sfi: Sfil, Sm: Smal, X: Xhol, (X):ラムダベクター由来のXhol切断部位、dK:Kpnl切断部位を消失, dX:Xhol切断部位を消失, (Sm/Sl):Sall平滑化後Smal切断部位と結合, (Sl/RV):Sall平滑化後EcoRV切断部位と結合

点線部分:pBluescript SKII(+) またはpUC18プラスミ FDNA


(D:LoxP配列

【図33】 HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒトIgH抗体価の増加




717 20010

【図35】 HSA免疫キメラマウス血清中の抗HSAヒトIg抗体価の増加





# 【図34】





【図37】






(%)率替界本百葉るわま习聞眠すら了了

[図39]

	烈		類加	遜	肝臓	鑩	中	- E			精巢			
							-		第1減		第2诫	a>⊀	精子	
	+	ı	+	1	+	1	<del></del>	1	+	1	+		+	ı
16-5 (F1)	30 (100%)	- 0	11 (21%)	42	30 (97%)	-	1 (3%)	30	15 (100%)	0	15 (94%)	1	11 (32%)	23
17-8 (F1)	30 (100%)	0	12 (30%)	28	30 (100%)	0	21 (43%)	28	16 (100%)	0	9 (23%)	7	14 (34%)	27
17-23 (F1)	41 (95%)	2	7 (17%)	34	31 (97%)	Н	5 (17%)	25	15 (100%)	0	13 (81%)	က	13 (52%)	12


マウス個体におけるSC20断片の保持

# 【図40】



ヒト22番染色体(断片)を保持するG418耐性雑種細胞のPCR解析

【図41】




	HK23	HK28	HK29
抗体重鎖ノックアウト 抗体軽鎖ノックアウト	サポート クテロ	野生型 or ヘテロ 野生型	野生型 or ヘテロ ヘテロ
W23断片 SC20断片	++	++	++
血清中ヒトμ鎖 (mg/l)	100	5.9	14
血 油 油 油 は が (mg/l)	8.6	8.4	25
	\$	0.13	検出限界以下


 $*抗体重鎖ノックアウトはマウス<math>\mu$ 鎖発現の有無で判定しているのでヘテロと野生型の区別は不能 \*抗体軽鎖ノックアウトはサザン解析にて判定

交配による完全なヒト抗体を産生するマウス系統の確立






W23断片を保持するマウス血清中のヒト抗体 κ 鎖濃度




出証特平11-3064057

【図45】




【図46】




DT40細胞株におけるヒト22番染色体の保持

# 【図47】




LIF遺伝子座における相同組み換え体 の同定


DT40/#22neo細胞株におけるヒト22番染色体の断片化



[図49]




全長及び断片化ヒト22番染色体を保有するDT40細胞株




TNF-  $\alpha$  免疫キメラマウス血清中の抗TNF-  $\alpha$  ヒト $Ig\gamma$  抗体価の増加

【図51】




キメラマウスにおけるアシアロGM1に対する応答


【図52】




キメラマウスにおけるGM2に対する応答


【図53】






シングルTc/KOマウス血清中FFIgァサブクラス濃度の測定





HSA免疫したダブルTc/KOマウス血清中の抗HSAヒトIgγ 抗体価の上昇

【図57】



HSA免疫したダブルTc/KOマウス血清中の抗HSAヒトIg κ 抗体価の上昇

## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 外来染色体またはその断片を保持し、該染色体またはその断片上の遺伝子を発現するキメラ非ヒト動物およびその子孫、並びに前記のキメラ非ヒト動物の作製法を提供する。

【解決手段】 単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含むミクロセルを作製し、該ミクロセルとの融合により、分化多能性を保持する細胞へ前記単一または複数の外来染色体あるいはその断片を移入させることを特徴とする、キメラ非ヒト動物の作製法。前記の方法により作製することができるキメラ非ヒト動物およびその子孫。前記動物に由来する組織および細胞;前記動物の個体、組織および細胞の利用方法。単一または複数の外来染色体あるいはその断片を含む分化多能性を保持する細胞、その作製法および利用法。少なくとも2種の内因性遺伝子が破壊されている分化多能性を保持する細胞。および相同組換えにより、前記の細胞を作製する方法。

#### 【選択図】 なし



# 出願人履歴情報

識別番号

[000253503]

1. 変更年月日 1995年 6月14日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区新川二丁目10番1号

氏 名 麒麟麦酒株式会社

THIS PACE BLANK DEPTO